

Södra Turkiet 2-9 juni 2001

Mikael Malmaeus, Mats Waern & Fredrik Friberg



Att göra södra Turkietrutten första veckan i juni gick bättre än vi förväntat. Vi såg mer än vad vi trodde och värmen både med avseende på fåglar och värme. Vi såg många av Turkiets speciella arter, trots att mycket tid spenderades åt njutskådning och detaljstudier: Krushuvad pelikan (1 plats, totalt 3 ex), kopparand (1,7), visselhöna (1;2), blek dvärguv (1,1), citronärsla (1, 1), kaspisk snöhöna (1, 10-15), kaukasisk järnsparv (1,1), vitstrupig näktergal (4, många), östlig sammethätta (3, 6), bergsångare (1, 2), rosenstare (1, ca 3), blek stensparv (på vissa ställen flera häckande par) och gulstrupig stensparv (4, många). De missar som var svårast att komma över var lammgam och persisk stenskvätta.

Resrutt:

2/6 Antalya (ankom kl. 23.00)-Akseki (natt 1)-3/6 Konya-Nidge-Sultanträskan (4/6; natt 2)-Demirkazik (5/6 natt 3)-Adana-Gazi Antep (natt 4; 6/6)-Birecik (natt 5; 7/6)-Halfeti-Gaziantep-Adana-Silifke (natt 6; 8/6)-Ermenek-Hadim (natt 7; 9/6)-Bozkir-Seydisehir-Akseki-Antalya.

Oavsett när på året man har tänkt att besöka dessa platser, den klassiska ”enveckas-turkrudden”, är Gosneyguiden och Magnus Hellströms rapport (se Club 300) förträffliga. Denna rapport är inte lika detaljerad vad det gäller vägbeskrivningar och andra praktiska tips, men den ger i alla fall en bild av vad man kan se en vecka tidigt i juni.

Bil:

Ford Orion med AC på Budget, ca 4200 kr. Vi ansåg att AC:n var värd sina extra hundralappar per skalle. Det kan bli rejält varmt i juni, något som vi emellertid aldrig led av (kanske p g a AC:n?).

Inkvartering

2/6 Försökte sova i bilen en timme vid Akseki new site. Ett ostört och bra ställe att sova i bilen.

3/6 Ovaciftlik (Sultan) hos grabbarna som gör båtturer, ca 60 kr/pers.

4/6 Safak Pension (se Hellström). Vacker utsikt, harmoniskt. Ett givet alternativ! Ca 100 kr/pers inkl. middag. Dyr öl, ta med egen.

5/6 I bilen 20 km V om Durnalik vid vägkanten

6/6 Birecik (samma ställe som Hellström), 40 kr/pers.

7/6 Hotell i hamnen Silifke, 30 kr/pers.

8/6 ”Enda större stället i Hadim”, ca 40 kr/pers



Artlista

Skäggdopping *Podiceps cristatus*. 10-tals bland annat flera kullar vid Beysehir Lake 3/6, och ett 50-tal individer i Nigdesjön samma dag. 2 ex vid Akgöl 8/6.

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*. 10 ex Nigdesjön 3/6.

Medelhavslira *Puffinus yelkouan*. 1 ex av den östliga rasen *yelkouan* vid ett kort stopp längs kustvägen mellan Mersin och Silifke 7/6, närmare bestämt vid Ayas.

Krushuvad pelikan *Pelecanus crispus*. 3 ex Nigdesjön 3/6.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*. 1 ex Antalya 9/6.

Dvärgskarv *Phalacrocorax pygmeus*. Uppskattningsvis 300 individer vid Sultanträskan 4/6, och ca 15 ex vid Akgöl 8/6.

Dvärgrördrom *Ixobrychus minutus*. Sedd vid Sultanträskan 4/6 (upp till 5 ex), och vid ett smärre vasshav ca 2 km söder om Seydisehir på vägens västra sida 9/6 (4-6 ex). De allra flesta sågs flyga, antalet individer något svårbedömt. I stort alla fåglar sågs flyga korta sträckor tätt över vassen för att snabbt dimpa ned i vasshavet, på typiskt dvärgrördromssätt. En sågs dock sitta på ett vasstrå.

Natthäger *Nycticorax nycticorax*. En grupp om 5 ex vid Sultanträskan 4/6.

Rallhäger *Ardeola ralloides*. Spridda exemplar vid Sultanträskan 4/6, totalt 20-30 individer.

Silkeshäger *Egretta garzetta*. 2 ex vid Nigdesjön 3/6, i runda slängar 200 ex vid Sultanträskan 4/6, 2 ex i Birecik 6/6 samt ca 10 ex vid Akgöl 8/6. Dessutom enstaka ex sedda längs Medelhavskusten.

Ägretthäger *Egretta alba*. Ca 10 ex Sultanträskan 4/6.

Gråhäger *Ardea cinerea*. 8 ex vid Nigdesjön 3/6 och 10-tals vid Sultanträskan 4/6.

Purpurhäger *Ardea purpurea*. Ett 30-tal vid Sultanträskan den 4/6. Ca 5 ex vid Akgöl den 8/6. Kännbart mindre och mer slankvingad i flykten jämfört med gråhäger.

Vit stork *Ciconia ciconia*. Noterad vid Beysehir Lake (häckar inne i Beysehir) 3/6 och ett 20-tal vid Nigdesjön samma dag. Ett 20-tal vid Sultanträskan den 4/6. Dessutom 1-2 ex på ca 5 platser längs vägen.

Eremitibis *Geronticus eremita*. Sammanlagt sågs ett 10-tal fåglar i Birecik den 6/6, överflygande och vid Ibiscentret i stadens norra del. Vid sistnämnda lokal sågs 2 unga individer och en gammal på en bohylla.

Skedstork *Platalea leucorodia*. 6 ex vid Sultanträskan 4/6.

Flamingo *Phoenicopterus ruber*. Ca 70 ex vid "saltstappen" norr om Sultanträskan den 4/6 och ca 25 ex vid Akgöl den 8/6.

Rostand *Tadorna ferruginea*. 8 individer sågs i Nigdesjön den 3/6. Noterad den 4/6 vid Sultanträskan, och den 8/6 ca 15 individer vid Akgöl.

Gräsand *Anas platyrhynchos*. Ett 30-tal individer vid Akgöl den 8/6.

Skedand *Anas clypeata*. 1 par vid Nigdesjön den 3/6.

Bläsand *Anas penelope*. Ett par vid Akgöl den 8/6.

Årta *Anas querquedula*. En hane vid Nigdesjön den 3/6, 2 ex vid Sultanträskan den 4/6 och den 8/6 sågs 6 ex vid Akgöl.

Marmorand *Marmaronetta angustirostris*. 6-8 ex vid Akgöl 8/6.

Rödhuwad dykand *Netta rufina*. Ett 20-tal vid Nigdesjön den 3/6, 50-100 ex vid Sultanträskan den 4/6 och 6 ex vid Akgöl den 8/6.

Brunand *Aythya ferina*. 10-20 ex vid Nigdesjön den 3/6 och ett 20-tal vid Sultanträskan den 4/6.

Vitögd dykand *Aythya nyroca*. 5 ex vid Sultanträskan den 4/6 och 1 ex vid Akgöl den 8/6.

Kopparand *Oxyura leucocephala*. 7 hannar vid Nigdesjön den 3/6.

Smutsgam *Neophron percnopterus*. 2 adulta fåglar norr om Sultanträskan den 4/6, 1 ad Birecik den 6/6, 1 ad nära Halfeti den 7/6. Ca 25 fåglar befolkade en klippformation någonstans mellan Silifke och Hadim den 8/6, samma dag sågs ytterligare en smutsgam längs samma vägsträcka.

Kungsörn *Aquila chrysaetos*. 2-3 ex sågs vid Demirkazik den 4/6, och ungefär lika många i samma område den 5/6. Vid hemkomst fick vi höra att ett par häckade i ravinen Demirkazik.

Ormörn *Circaetus gallicus*. En äldre sågs kretsas över Akseki New Site den 3/6.

Dvärgörn *Hieraaetus pennatus*. En individ av ljus fas sågs längs vägen mellan Beysehir och Nigde den 3/6. Positionsljusen sågs tydligt på långt håll - även på ljus morf.

Brunglada *Milvus migrans*. En individ sågs längs vägen mellan Beysehir och Nigde den 3/6.

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*. En hona sågs vid Nigdesjön den 3/6, ett 10-tal vid Sultanträskan den 4/6 och ca 5 ex vid Akgöl den 8/6.

Örnvråk *Buteo rufinus*. Noterad nästan dagligen med flera ex på flertalet besökta lokaler och längs vägarna. En mycket intressant individ sågs några mil nordväst om Eregli. Tyvärr sågs den på ca 1,5 km som närmast. Fågeln var av det mörkare slaget men var mer tecknad som en ornvårk än en typisk mörk örnvråk. Som tur var sågs den tillsammans med en normalt tecknad örnvråk och var lika stor, långvingad samt kretsade med typiskt örnvråks-V-ställda vingar. Av ca 100 tidigare studerade örnvråkar har aldrig en liknande setts.

Bivråk *Pernis apivorus*. En grupp med 4 sträckande fåglar sågs mellan Halfeti och Birecik den 7/6. Sträckande bivråkar så sent som 6/6 på så sydliga breddgrader var förvånande.

Tornfalk *Falco tinnunculus*. Allmän.

Rödfalk *Falco naumanni*. Den 3/6 såg vi vår enda säkert bestämda rödfalk, längs vägen mellan Beysehir och Nigde. Många tornfalkar lämnades dock utan närmare granskning.

Lärkfalk *Falco subbuteo*. 2 ex vid Sultanträskan den 4/6 och 2 ex vid Birecik den 7/6. Lärkfalkarna vid Birecik bestämdes på håll till pilgrimsfalk!? En bestämningsfälla som åtminstone jag (Mats) trodde var svår att gå i. Fältbestämning av bekanta arter kan ibland bli knepigt i främmande land!

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*. 2 ex sågs från bilen nära Adana 7/6, 2 ex vid Akgöl den 8/6 och samma dag sågs en pilgrimsfalk på samma plats som ca 25 smutsgamar noterades (se under denna). Vidare sågs pilgrimsfalk på två ställen längs vägen mellan Hadim och Akseki den 9/6.

Kaspisk snöhöna *Tetraogallus caspius*. Vid Demirkazik den 5/6 hördes ca 4 ropande hannar, och 10-15 fåglar sågs (bl a en grupp om ca 8 st). Ropen började strax före kl 6 på morgonen och höll på i full skala fram till kl 9, därefter spridda rop till kl 13. Fåglarna höll till på de absolut högsta topparna och var därmed svåråtkomliga. Endast när de framträdde i silhuett mot himlen var de någorlunda enkla att upptäcka.

Svart frankolin *Francolinus francolinus*. En frankolin ropade flitigt på eftermiddagen den 6/6 några km norr om Birecik, på västra sidan av Eufrat. Dagen efter hördes den spela på samma plats. Den 8/6 hördes en spelande fågel vid Akgöl vid 8-tiden på morgonen.

Berghöna *Alectoris chukar*. Noterad vid Demirkazik den 5/6 (3+1 ex), vid Durnalik den 6/6 och mellan Silifke och Hadim den 8/6 (1+1 ex, varav en fågel höll till i en bergsby och var extremt tam).

Visselhöna *Ammoperdix griseogularis*. Noterad i wadin bakom ibiscentret i Birecik den 6/6. Ett par sågs samtidigt som en spelande hanne hördes.

Vaktel *Coturnix coturnix*. En spelande på en lokal ca 1 mil norr om Akseki den 3/6, och ett ex stöttes norr om Birecik den 7/6.

Vattenrall *Rallus aquaticus* 1 hörd Sultanträskan 4/6.

Sothöna *Fulica atra*. Noterad den 3/6 i Beysehir Lake och i Nigdesjön, den 4/6 i Sultanträskan samt den 8/6 vid Akgöl.

Purpurhöna *Porphyrio porphyrio*. Ett ex vid Akgöl den 8/6, i områdets sydvästra del.

Trana *Grus grus*. Hördes vid Sultanträskan den 4/6.

Styllöpare *Himantopus himantopus*. Noterad vid Sultanträskan den 4/6.

Storspov *Numenius arquata*. 2 ex vid Akgöl den 8/6.

Tjockfot *Burhinus oedicnemus*. 1 ex vid Akgöl den 8/6.

Rödvingad vadarsvala *Glareola pratincola*. 2+2 ex (ev. samma 2 exemplar) sågs flyga över Sultanträskan den 4/6. Den 7/6 sågs 2 ex flyga över betalvägen Adana.

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*. 1 ex vid Eufrat/Birecik den 6/6.

Svartbent strandpipare *Charadrius alexandrinus*. 5-10 ex på saltslätterna vid Sultanträskan den 4/6. Även noterad den 8/6 vid Akgöl.

Tofsvipa *Vanellus vanellus*. Noterad vid Nigdesjön den 3/6, och vid Sultanträskan den 4/6.

Sporrvipa *Vanellus spinosus*. 3 ex vid Sultanträskan den 4/6, och den 8/6 sågs ett 10-tal vid Akgöl.

Skogssnäppa *Tringa ochropus*. 1 ex vid Sultanträskan den 4/6.

Rödbena *Tringa totanus*. Noterad vid Sultanträskan den 4/6.

Brushane *Philomachus pugnax*. Ett 10-tal vid Sultanträskan den 4/6.

Skrattmåsar *Larus ridibundus*. Noterad vid Nigdesjön den 3/6 och vid Sultanträskan den 4/6 (fåtaligt).

Gulfotad trut *Larus cachinnans*. 7 ex sågs vid Akgöl den 8/6, och vid kusten nära Antalya sågs en fågel den 9/6. Förvånansvärt få individer sågs, och dessa sågs endast på håll i flykten. Samtliga var adulta med tydligt mörkare ovansidor och med mycket svart på handen, troligen *michahellis*.

Småtärna *Sterna albifrons*. Noterad vid Akgöl den 8/6.

Sandtärna *Sterna nilotica*. 4 ex sågs vid Akgöl den 4/6.

Fisktärna *Sterna hirundo*. 1 ex vid Akgöl den 8/6.

Skäggtärna *Chlidonias hybridus*. Ett 100-tal över Nigdesjön den 3/6, och 10-20 ex över Sultanträskan den 4/6. Lätet kort, skarpt och genomträngande och till karaktären som ett mellanting av kornknarr och kentsk tärna.

Tamduva *Columba livia*. Ett antal sågs vid Demirkazik den 5/6.

Ringduva *Colimba palumbus*. 3 ex längs vägen mellan Silifke och Hadim den 8/6.

Turkduva *Streptopelia decaocto*. Karaktärsfågel i många städer och byar. Insprängda i flockarna fanns enstaka turturduvor.

Turturduva *Streptopelia turtur*. Noterades i små antal nästan dagligen. Av observationerna var andelen hörda relativt hög (med tanke på att av de som sågs var många bilobsar).

Palmduva *Streptopelia senegalensis*. En individ sågs vid Birecik, väster om Euftrat den 6/6.

Gök *Cuculus canorus*. Noterad vid Akseki New Site den 3/6 och vid Demirkazik den 4/6 och 5/6.

Kattuggla *Strix aluco*. Hördes vid Akseki New Site den 3/6.

Minervauggla *Athene noctua*. Sågs vid Nigdesjön den 3/6, vid Sultanträskan den 4/6 och senare samma dag vid Demirkazik, mellan Birecik och Halfeti den 7/6 samt den 9/6 mellan Hadim och Akseki.

Dvärguv *Otus scops*. Hördes vid Akseki New Site den 3/6 och vid Safak Pension i Demirkazik den 5/6.

Blek dvärguv* *Otus brucei*. Vid det klassiska Tea Park i Birecik sågs en fågel den 6/6. En del dvärguvar i denna park kan enligt L. Svensson dock vara hybrider mellan blek och vanlig dvärguv.

Nattskärra *Caprimulgus europaeus*. Hördes vid Akseki New Site den 3/6 och vid byn Demirkazik 5/6.

Tornseglare *Apus apus*. Noterad här och var, bl a stora antal vid Nigdesjön den 3/6.

Blek tornseglare *Apus pallidus*. Vid Nigde sågs enstaka ljusa seglare som kan ha varit bleka tornseglare.

Alpseglare *Apus melba*. Noterades vid Demirkazik den 4/6 och den 5/6 (10-tal), samt den 8/6 mellan Silifke och Hadim (ca 5 ex).

Stubbstjärtseglare *Apus affinis*. Ca 5 ex vid Birecik den 6/6.

Härfågel *Upupa epops*. Noterad nästan dagligen, exempelvis åtminstone två revirhävdande par vid Akseki New Site den 3/6.

Blåkråka *Coracias garrulus*. Noterad mellan V Sultanträskan den 4/6 (troligen häckande). Mer allmän runt Birecik och Halfeti (6/6 och 7/6; flera par tycktes häcka i sandbrinkar). Även noterad mellan Silifke och Hadim den 8/6 (ca 3 ex).

Biätare *Merops apiaster*. Förekomsten påfallande lik blåkråkan. Dock något större antal runt Birecik (10-15 ex).

Gråfiskare *Ceryle rudis*. 3 ex vid Birecik den 7/6, vid dammarna runt sandtagen väster om Euftrat, några km norr om stora vägen.

Gröngöling *Picus viridis*. 1 ropande vid Akseki New Site den 3/6. Noterad även den 8/6, längs vägen mellan Silifke och Hadim.

Balkanspett *Dendrocopos syriacus*. Noterad nästan dagligen; nära Sultanträskan den 4/6, 2 ex Birecik den 6/6, 2 ex mellan Birecik och Halfeti den 7/6, runt 5 ex mellan Silifke och Hadim

den 8/6 samt flera gånger mellan Hadim och Akseki den 9/6, bl a en nyss flygg kull på Akseki Graveyard.

Mellanspett *Dendrocopos medius*. 2-4 ex vid Akseki New Site den 3/6, samma dag även 1 ex på en lokal ca 1 mil norr om Akseki. Dessutom noterad den 8/6 mellan Silifke och Hadim, på en trevlig plats ca 2 km öster om Camlica Gökceseki.

Mindre hackspett *Dendrocopos minor*. Noterad vid Akseki New Site den 3/6.

Göktyta *Jynx torquilla*

En ropande den 9/6 i odlingar V Hadim. Enligt utbredningskartorna häckar inte arten i Turkiet.

Tofslärka *Galerida cristata*. Allmän.

Trädlärka *Lullula arborea*. Flera sjungande vid Akseki New Site den 3/6, 1 sjungande vid Demirkazik den 4/6, ca 5 individer noterade mellan Hadim och Akseki den 9/6. Gosney är skeptisk till rapporterade trädlärkor vid Akseki. Vi hade dock flera sjungande samt minst två matande par.

Korttålaräka *Calandrella brachydactyla*. 5-10 ex sågs den 7/6 på en god lärklokal mellan Birecik och Halfeti som vi gärna rekommenderar - platsen brukar beskrivas av Gosney som bra för ökenlöpare. 5-10 ex vid Akgöl den 8/6 och en trolig korttålaräka hördes samma dag mellan Silifke och Hadim. Den 9/6 noterades 5-10 ex mellan Hadim och Akseki. En individ vid Halfeti använde en dvärglärkelik sång medan alla andra (Göksu mfl) använde den typiskt korta, stötiga och accelererande sången.

Dvärglärka *Calandrella rufescens*. Ca 10 ex den 3/6 på stäppen Ö Konya, vanlig vid Sultanträskan (4/6), samt en individ vid Demirkazik den 5/6. Svårdefinierad snabb sång med stor variation, avslöjade sig dock ofta med invävda locklåten - lite grötiga rullningar. Företrädd av rasen *aharonii* på den turkiska högplatån som är relativt stor, grå och med kraftig näbb.

Kalanderlärka *Melanocorypha calandra*. Ca 10 ex den 3/6 Konja-Eregli, ett tiotal vid Sultanträskan den 4/6, ett trettiotal på en lokal mellan Birecik och Halfeti den 7/6 (se korttålaräka), samt 5-10 ex mellan Hadim och Akseki den 9/6. Trots de adultas slitna dräkt var de vita vingbakkanterna tydliga.

Asiatisk kalanderlärka *Melanocorypha bimaçulata*. Vid Durnalik den 6/6 två ex, och den 7/6 sågs ett tiotal på en lokal mellan Birecik och Halfeti (se korttålaräka). Lockar mycket likt korttålaräka.

Berglärka *Eremophila alpestris*. Vanlig vid Demirkazik den 5/6, särskilt på högre höjd. Rasen *penicillata*.

Backsvala *Riparia riparia*. Stora antal vid sandtagen på Eufrats västbank strax norr om Birecik den 6/6 och 7/6. Även noterad den 8/6 mellan Silifke och Hadim.

Klippsvala *Ptyonoprogne rupestris*. Enstaka individer i Demirkazik-området den 4/6 och 5/6. Något 10-tal sågs mellan Silifke och Hadim den 8/6, även noterad mellan Hadim och Akseki den 9/6.

Ladusvala *Hirundo rustica*. Noterad vid Sultanträskan den 4/6 och vid Birecik den 6/6 och 7/6.

Rostgumpsvala *Hirundo daurica*. 5-10 fåglar i Halfeti den 7/6, och den 8/6 sågs 2 ex mellan Silifke och Hadim, samt enstaka bilobsar.

Hussvala *Delichon urbica*. Sågs vid Demirkazik den 4/6 och 5/6, mellan Birecik och Halfeti 7/6 och mellan Silifke och Hadim den 8/6.

Vattenpiplärka *Anthus spinoletta*. Ca 2 ex sågs vid Demirkazik den 5/6. Dessa befann sig där ravinen når högplatån, i platåns norra del. Rasen *coutellii*: Den vanligtvis mer tydligt (jfr *spinoletta*) streckade hjässan och ryggen var inte lika påtagligt som nybyggade fåglar brukar uppvisa under tidig vår. Den varmt orangerosa undersidan var emellertid tydlig (*spinoletta rosa*).

Sädesärta *Motacilla alba*. Förvånandsvårt fåtalig under hela resan

Gulärta *Motacilla flava*. Gulärter av rasen *feldegg* noterades vid Beysehir lake den 3/6 och vid Nigdesjön samma dag, ett 20-tal hannar vid Sultanträskan den 4/6 och ca 5 ex vid Akgöl den 8/6. Flera hannar hade diffusa (mycket) grå stänk i nedre delen av nacken. Alla yttrade lockläte med r-ljud, ingen hördes locka som typiska *flava/thunbergi*.

Citronärta *Motacilla citreola*. En hanne sågs vid Sultanträskan den 4/6.

Forsärta *Motacilla cinerea*. Noterad vid Demirkazik den 5/6.

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*. Noterad den 9/6 mellan Hadim och Akseki.

Levantbulbyl *Pycnonotus xanthopygos*. Allmän, men fåtalig i de sydöstra delarna av vår resrut, fr.o.m Durnalik.

Svartkronad järnsparv *Prunella ocularis*. 1-2 ex sågs på högplatån i Demirkazik den 5/6. Sångstrofen bestod av två till tre ljusa och klara rullande drillar med instoppade ljusa toner av lite varierande tonläge.

Sydnäktergal *Luscinia megarhynchos*. Ca 3 sjungande runt Safak Pension i Demirkazik den 4/6, en sjungande ca 2 km öster om Camlica Gökceseki den 8/6, och ca 5 sjungande mellan Hadim och Akseki den 9/6.

Trädnektergal *Cerotrachus galactotes*. Ganska lättobserverad i fruktodlingarna runt Birecik och Halfeti, där några fåglar sågs den 6/6 och 7/6. Sången en lite vemodig blandning av klangfulla trasttoner och korta skarpa läten. Delar av strofen förde tankarna till hämplingsång.

Vitstrupig näktergal *Irania gutturalis*. 3 hannar och en hona observerade vid Durnalik den 6/6, en hanne sågs nära Isikli den 7/6, en hanne och en hona sågs på en plats mellan Hadim och Akseki den 9/6.

Rödöstjört *Phoenicurus phoenicurus*. Flera sjungande hannar noterade vid Akseki New Site den 3/6. Fåglarna var av rasen *samamiscus* och sången förbryllade oss till en början, innan dagens ljus gick upp för oss.

Svart röstjört *Phoenicurus ochruros*. Noterad vid Demirkazik den 4/6 och 5/6(3-4 ex), 1 par mellan Silifke och Hadim den 8/6 och 2 ex mellan Hadim och Akseki den 9/6. I Turkiet är arten representerad av rasen *ochruros*. Vi såg endast två utfärgade hanar, båda var läckert sotsvarta långt ned på buken och kändes mörkare ovan än vår svenska med relativt diffusa vingpaneler. Till skillnad från avbildningen av *ochruros* i "Fågelguiden" var båda ljusgrå på nedre delen av buken, inte rötttonade (det lär dock variera mycket inom populationen).

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*. Fåtalig, men allmän men på högre altituder.

Isabellastenskvätta *Oenanthe isabellina*. Mycket allmän i slättlandskap. 100-tals ex sågs mellan Beysehir och Nigde den 3/6, talrik vid Sultanträskan den 4/6, även noterad vid Demirkazik samma dag. Ca 2 ex noterade mellan Hadim och Akseki den 9/6. En honfärgad individ (diffust ögonbrynstreck och otydlig tygel) sågs och hördes sjunga. Det är nog inte så lätt att könsbestämma dessa ändå, för inte sjunger väl honorna (jfr tex vanlig stenskvätta)?

Medelhavsstenskvätta *Oenanthe hispanica*. Mycket allmän.

Finstenskvätta *Oenanthe finschii*. Noterad vid Demirkazik den 4/6 (1 hane) och 5/6 (3-4 hannar), vid Durnalik den 6/6 (1 2K hane), mellan Halfeti och Birecik den 7/6, samt 3 hannar mellan Silifke och Hadim den 8/6 (varav 1 2K).

Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquata*. 2 hannar och 1 hona vid Demirkazik den 4/6, och en hona vid Durnalik den 6/6. Båda hannarna studerades noggrant och var av rasen *rubicola*. Båda uppvisade emellertid vita övergumpar med diffus grå streckning (i flykten kan de se rent vita ut) och mörka centra på övre stjärtäckarna. Ett utseende som troligtvis snarare är regel än undantag inom stora delar av *rubicolapopulationen*.

Blåtrast *Monticola solitarius*. Noterad vid Durnalik den 6/6 (1 par), 1 hane nära Isikli den 7/6, 7-8 ex mellan Silifke och Hadim den 8/6, samt 1 ex mellan Hadim och Akseki den 9/6.

Stentrast *Monticola saxatilis*. 1 hane på högplatån vid Demirkazik den 5/6.

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*. Vanlig vid Akseki New Site (3/6), 2 ex mellan Silifke och Hadim den 8/6, ganska vanlig mellan Hadim och Akseki den 9/6.

Koltrast *Turdus merula*. Noterad vid Akseki New Site den 3/6, mellan Silifke och Hadim den 8/6 samt mellan Hadim och Akseki den 9/6.

Ringtrast *Turdus torquatus*. En hane av rasen *amicorum* vid Demirkazik den 5/6. *Amicorum*: en helt svart buk utan ljusa bräm (kanter) på bukfydrarna och ljusare större täckare, tertialer och pennor vilket gav den ett ännu mer kontrastrikt utseende jämfört med *torquatus*.

Höksångare *Sylvia nisoria*. Noterad vid Durnalik den 6/6.

Mästersångare *Sylvia hortensis*. 4-6 individer (flera sjungande) den 3/6 på en lokal ca 1 mil norr om Akseki. Vid Durnalik den 6/6 noterades ca 4 ex, och den 9/6 sågs 2 ex mellan Hadim och Akseki samt 2 ex vid Akseki graveyard.

Ärtsångare *Sylvia curruca*. Relativt allmän. De studerade fåglarerna på Demirkazik var mörkare på ovansidan och sjöng aningens annorlunda jämfört med våra svenska - *althea*?

Östlig sammetshatta *Sylvia mystacea*. 6-7 ex noterade på olika ställen runt Birecik den 6/6 och ca 3 ex i samma områden den 7/6. Sjöng mycket likt sammetshatta, skillnad kanske hade märkts om vi hade sammetshattans sång mera färskt i minnet?

Svarthakad sångare *Sylvia rueppelli*. Runt 10 sjungande hannar på en kort vägsträcka mellan Silifke och Hadim den 8/6, närmare bestämt ca 2 km öster om Camlica Gökceseki.

Törnsångare *Sylvia communis*. Noterad vid Demirkazik den 4/6 och 5/6, mellan Silifke och Hadim den 8/6, samt mellan Hadim och Akseki den 9/6. Ska var företrädd av rasen *icterops* i Turkiet. Jämfört med *icterops* ringmärkta i Israel var de vi såg här mer lika nominatrasen?

Streckad prinia *Prinia gracilis*. Noterad vid Birecik den 6/6 och vid Akgöl 8/6.

Cettisångare *Cettia cetti*. Hörd vid Safak Pension vid Demirkazik den 4/6, och mellan Hadim och Akseki den 9/6.

Kaveldunsångare *Acrocephalus melanopogon*. Vid Sultanträskan den 4/6 sågs upp till 5 ex.

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus*. 1 rörsångare hörd vid Beysehir Lake den 3/6, noterad vid Sultanträskan den 4/6 och på vägen mellan Hadim och Akseki den 9/6. Sången möjligen förbisedd p g a likhet med eksångare.

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*. Allmän i vassbestånd vid sjöar, vägkanter och diken.

Olivsångare *Hippolais olivetorum*. 1 fågel vid Durnalik den 6/6 och 1-2 sjöng vid Akseki graveyard den 9/6.

Orientsångare *Hippolais languida*. Vid Durnalik den 6/6 sågs 3-4 säkert bestämda orientångare. Vidare sågs obestämda *Hippolais*-sångare med orientångarkarakterer vid Durnalik (3-4 ex), mellan Sultanträskan och Demirkazik den 4/6 (2 par), och vid Akgöl den 8/6. Bestämning av ek kontra orient var svårare än förväntat trots relativt stor erfarenhet av såväl ringmärkta som fältstuderade eksångare från Israel.

Eksångare *Hippolais pallida*. Allmän.

Lövsångare *Phylloscopus trochilus*. Noterad vid Akseki New Site den 3/6.

Bergsångare *Phylloscopus bonelli orientalis*. Noterad vid Akseki New Site den 3/6 och på vägen mellan Hadim och Akseki den 9/6. Sången upplevdes som väl skild från *bonelli*. Jämförelse: De är uppbyggda på samma sätt - en rak rullande räcka som börjar och slutar tvärt. *Bonelli* är mer bubblande och fylliga stavelser med en röst påminnande om grönsångare.

Hos *orientalis* fanns inga spår av grönsångarröst och de känns hårdare och mera klanglösa, samt kanske lägre i tonen.

obestämd kungsfågel *Regulus sp.* Inte ovanlig vid Akseki New Site den 3/6, dock visade det sig i efterhand att ingen av oss tagit sig tid att artbestämma dem i tron att endast brandkronad förekom. Ytterligare en obestämd kungsfågel noterad mellan Hadim och Akseki den 9/6.

Grå flugsnappare *Muscicapa striata*. Noterad mellan Silifke och Hadim den 8/6.

Talgoxe *Parus major*. Allmän här och där.

Svartmes *Parus ater*. Noterad vid Akseki New Site den 3/6, och 5-10 sjungande mellan Hadim och Akseki den 9/6.

Blåmes *Parus caeruleus*. Ca 5 ex mellan Silifke och Hadim den 8/6.

Balkanmes *Parus lugubris*. Allmän, noterad bl a vid Akseki New Site den 3/6, vid Durnalik den 6/6 och på åtskilliga spontana stopp längs vägarna.

Stjärtmes *Aegithalos caudatus*. Noterad vid Akseki New Site den 3/6 och mellan Silifke och Hadim den 8/6 (2 ex). Rasen *tephronotus* finns avbildad i Fågelguiden.

Krüpers nötväcka *Sitta krueperi*. Allmän i tallskogsbeklädda sluttningar, främst runt Akseki. Ffa uppmärksammas på lätena.

Klippnötväcka *Sitta neumayer*. Noterad i en sluttning nära Sultanträskan den 4/6 (2 par), vid Demirkazik den 4/6, vid Durnalik den 6/6, mellan Silifke och Hadim den 8/6 (ca 10 ex) samt mellan Hadim och Akseki den 9/6 (4-5 ex).

Östlig klippnötväcka *Sitta tephronota*. 6-7 ex vid Durnalik den 6/6, och 1 ex sågs strax söder om Halfeti den 7/6.

Murkrypare *Tichodroma muraria*. Noterad vid Demirkazik den 4/6 (observerad i ett klippstup inom synhåll från fotbollsplanen där stigen upp mot högplatån startar) och 5/6 (vid högplatån).

Törnskata *Lanius collurio*. Lite här och där, aldrig allmän.

Rödhuvas törnskata *Lanius senator*. En 2K hanne vid Durnalik den 6/6. 6-7 ex sågs längs vägen mellan Halfeti och Birecik den 7/6.

Masktörnskata *Lanius nubicus*. 2 par vid Akseki New Site den 3/6, 1 ex vid borgen i Toprakkale den 7/6, 5-7 ex mellan Silifke och Hadim den 8/6 samt ett 10-tal mellan Hadim och Akseki den 9/6. Häckar i träd!

Svartpannad törnskata *Lanius minor*. 2 individer sågs vid Beysehir Lake den 3/6, och mellan Hadim och Akseki den 9/6 sågs 2 ex.

Skata *Pica pica*. Noterad vid ett flertal tillfällen.

Nötskrika *Garrulus glandarius*. Noterad vid ett flertal tillfällen.

Alpkråka *Pyrrhocorax pyrrhocorax*. Fåtalig men lättobserverad vid Demirkazik, den 4/6 och 5/6.

Alpkaja *Pyrrhocorax graculus*. Relativt talrik vid Demirkazik, den 4/6 och 5/6.

Råka *Corvus frugilegus*. Flera stycken mellan Beysehir och Nigde den 3/6.

Grå kråka *Corvus corone*. Relativt allmän.

Korp *Corvus corax*. 10-15 korpar sågs mellan Silifke och Hadim den 8/6.

Stare *Sturnus vulgaris*. 5 starar mellan Halfeti och Birecik den 7/6.

Rosenstare *Sturnus roseus*. Sågs överflygande några gånger vid Sultanträskan den 4/6, torde ha rört sig om 2-3 individer.

Sommargylling *Oriolus oriolus*. 1 hörd i närheten av Sultanträskan den 4/6, och mellan Hadim och Akseki den 9/6 hördes 4-5 stycken.

Gråsparv *Passer domesticus*. Allmän.

Spansk sparv *Passer hispaniolensis*. Ca 15 ex vid Durnalik den 6/6.

Pilfink *Passer montanus*. Noterad vid Safak Pension vid Demirkazik den 4/6.

Tamarisksparv *Passer moabiticus*. Sågs vid Birecik den 6/6, dels några stycken tillsammans med gråsparvar vid västra flodstranden några km norr om Birecik, dels satt ett antal hannar och sjöng i granplantagen precis bakom ibis-centret.

Stensparv *Petronia petronia*. Några ex sågs längs vägen mellan Sultanträskan och Demirkazik den 4/6 och några sågs vid Demirkazik samma dag och dagen efter, 3-4 ex sågs nära Isikli den 7/6, och den 9/6 såg vi 5-10 ex mellan Hadim och Akseki.

Blek stensparv *Carpospiza brachydactyla*. Vanlig vid Durnalik (6/6, ca 10 sjungande hannar, minst 2 konstaterade häckningar). Sången svårlokaliserad men mycket karakteristisk, insektsliknande. Den första gången vi hörde sången var vi inte säkra på om det kom från en insekt (syrsa eller dylikt) eller en fågel.

Gulstrupig stensparv *Gymnoris xanthocollis*. Verkade rätt vanlig i fruktodlingarna mellan Birecik och Halfeti: 1 hane sågs den 6/6 och 6 individer den 7/6 ca 3 km norr om Birecik - om man fortsätter vägen norrut förbi ibiscentret, precis där en stor kraftledning korsar vägen. Vidare en sjungande hane i Halfeti strax intill moskén som numera ligger halft under vatten till följd av ett dambygge, samt en sjungande hane någonstans mitt emellan Birecik och Halfeti. Vi gjorde inte mer än ett fåtal stopp, men fick ändå se oss mätta på denna fågel. Sången kan lätt smälta in bland gråsparvsläten men bryter av med sin taktfasta och mer distinkta karaktär.

Snöfink *Montifringilla nivalis*. Allmän vid Demirkazik den 4/6 och 5/6, ca 3 ex sågs mellan Silifke och Hadim den 8/6.

Bofink *Fringilla coelebs*. Lokalt allmän. Hannarna kontrasterande undersidor med ett djupt nästan vinrött bröst och en mycket ljus buk.

Hämpling *Carduelis cannabina*. Vanlig vid Durnalik den 6/6.

Steglits *Carduelis carduelis*. Relativt allmän.

Grönfink *Carduelis chloris*. Lokalt allmän.

Gulhämpling *Serinus serinus*. Allmän i skogsmark på hög höjd.

Rödpannad gulhämpling *Serinus pusillus*. Sågs vid Demirkazik: 3-4 ex sågs i ravinen den 4/6, och ett tiotal på högplatån den 5/6.

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra*. Noterad vid Akseki New Site den 3/6, och 3 ex sågs mellan Silifke och Hadim den 8/6.

Bergsökenfink *Rhodopechys sanguinea*. 3-4 ex vid Demirkazik, på hög höjd, den 5/6.

Ökenfink *Rhodospiza obsoleta*. 5-6 ex vid Durnalik den 6/6, och 5-10 ex mellan Halfeti och Birecik den 7/6.

Sävspurv *Emberiza schoeniclus*. Noterad vid Sultanträskan den 4/6.

Ortolansparv *Emberiza hortulana*. Allmän på lite högre altituder, t ex runt Akseki och Demirkazik. Att skilja rostspurv och ortolan var svårare än förväntat, i synnerhet som ortolansparvarna inte alltid sjöng som de "brukar".

Rostspurv *Emberiza caesia*. Sjungande fåglar noterades vid Akseki New Site den 3/6, mellan Sultanträskan och Demirkazik den 4/6, vid Durnalik den 6/6. Vanlig mellan Silifke och Hadim (den 8/6), enstaka noterades mellan Hadim och Akseki den 9/6.

Gulgrå spurv *Emberiza cineracea*. Vanlig vid Durnalik (6/6, ca 10 sjungande hannar, 1 konstaterad häckning), även noterad nära Isikli den 7/6. Sången inte helt olik svarhuvad spurv i strukturen, men kortare och inte lika klangfull. Rösten lite åt rost- och ortolansparv (ska enligt Fågelguiden vara mest lik bergortolan men ingen av hos hade hört den).

Svarhuvad spurv *Emberiza melanocephala*. Mycket allmän. Sågs och hördes i de flesta biotoper. Sjöng även flitigt under alla dygnets ljusa timmar.

Klippsparv *Emberiza cia*. Noterad vid Demirkazik den 4/6 och 5/6.

Kornspurv *Miliaria calandra*. Lokalt allmän.

Reseberättelse

(2/6) och 3/6

Vi tog flygstolar på en charterflight med Fritidsresor till Antalya för ca 2500 kr. Anlände vid 23.00 och rullade från därifrån vid 01.00 kom till Akseki vid 03.30. Mottogs av spelande nattskärria, dvärguv, kattuggla och sjungande trädlärkor. Försökte sova en timme i bilen, men redan efter en halvtimme började det att sjunga. Vad f-n är det som sjunger? Där satt vi som frågetecken och gissade i mörkret. Efteråt förstod vi att det var rödstjärt av rasen samamiscus och medelhavsstenskvättas som hållit låda. Det var ingen idé att somna...Krupers nötväcka, bofink, gulhämpling, talgoxe, balkanmes dominerade i området. För övrigt sågs masktörnskata, stjärtmes, medelhavsstenskvättas, balkanspett, mellanspett, rostsparv, trädlärka, ormörn, ob. kungsfågel, mindre korsnäbb, bergsångare. Öster om Konya öppnar sig ett jordbruks- och stäpplandskap med gott om isabellastenskvättor, dvärglärkor och kalenderlärkor. Isabellastenskvättor hade redan flygga ungar. Nigdesumpen var mycket trevlig med bl.a en skäggtärnekoloni, kopparänder, krushuvad pelikan och roständer.

4/6

Sultanträskan. Tog grusvägen (som var bra trots att "sultanguiderna" hävdade att den var svårframkomlig) norrut från Senirkoy till det höga fågeltornet (se Hellström). Runt tornet häckade feldeggärlor i en koncentration vi inte sett någon av de svenska raserna göra. Gott om dvärglärkor, isabellastenskvättor, dvärgskarvar, rödhuvade dykänder och trastsångare. Enstaka dvärgrördromar, kaveldunsångare, vitögda dykänder, skäggtärnor och rödvingade vadarsvalor, liksom en citronärta ("tung" art så här långt västerut). Ensamma rosenstarrar (även det en besökare från öster) passerade vid tre tillfällen.

Vi fortsatte vår väg runt Sultanträsket. Smutsgam liksom häckande häckande biätare och blåkråka observerades längs vägen, som ingenstans var dålig (jfr andra reserapporter). Från den traditionella platsen för ökenpipare såg vi ingen ökenpipare, men däremot kunde vi skönja en större vattenyta med mycket flamingo ca 1 mil norr om Sultanträskan, mitt ute på saltstappen. I den branta uppforsbacken (från Sultanträskan sett) längs stora vägen, högst någon mil söderut, hittade vi dessutom några mycket skumma sångare, troligen oriensångare, vilket så fall är anmärkningsvärt långt österut (se vidare artlista). Fortsatte söderut mot Demirkazik.

5/6

Demirkazek. Kaspisk snöhöna, svartkronad järnsparv (endast ett exemplar, hane, uppe vid hönsen), myrkrypare (ovanför "hotellanläggningen) och rödpannad gulhämpling (lite överallt), men ingen lammgam.

Under eftermiddagen fortsätter vi österut.

6/6

Durnalik. I den frodiga dalen (se Gosney) sågs bl a vitstrupig näktergal, oriensångare, olivsångare, mästersonångare, balkanmes, klippnötväcka och östlig klippnötväcka. Ju närmare vi kom "bergstopparna" uppåt dalen desto fler gulgrå sparvar sågs. Det är helt klart värt att ta den relativt långa promenaden till bergen! I det buskfria områdena dominerade blekstenssparv och gulgrå sparv. Bakom det större berget sågs bl a asiatisk kalenderlärka, rödhuvad törnskata, och ökenfink. Det skulle ha varit spännande att tillbringa gryningstimmarna här! Eftermiddag till Birecik. Grusgropen som skulle hysa grön biätare var fylld med singel. I fortsättningen på vägen fanns emellertid hyfsade biätarebiotoper. Endast vanliga sågs dock.

Här även enorma backsvalekolonier, östliga sammetshattor, blåkråkor, svart frankolin, tamarisksparv, gråfiskare, stubbstjärtseglare, smutsgam m m. Vid det berömda caféet sågs en dvärguv, troligen blek. Tyvärr stack den innan vi hann granska den i detalj. (Lars Svensson har nämnt att åtminstone vissa av de bleka dvärguvarna i Birecik kan vara hybrider.) Visselhöna, tamriskparv, östlig sammetshatta sågs i wadin vid ibiscentrat.

I skymningen avslutar vi med skådning strax norr om Birecik, på jakt efter gulstrupig stensparv. Fina observationer på trädnäktergal, med den gulstrupiga strupiga låter vänta på sig tills en hane sveper förbi motorhuven på vägen tillbaka till hotellet.

7/6

Färden går norrut längs Euftrat till Halfeti. Vi stannar där vi kvällen före sett en gulstrupig stensparv flyga förbi. Stensparvarna är nu fyra till antalet, men är tidvis mycket svårsedda inne i fruktodlingarna.

Snabbt vidare för att utnyttja morgonen vid Halfeti. Vid vår ankomst visar sig byn vara till hälften översvämmad. Till vår häpnad ser vi att till och med Halfetis moské ligger under vatten. Bara taket och minareten sticker upp ovanför vattenytan. Vi kör tillbaka samma väg som vi kom, mot Birecik. Eftersom vi har gott om tid bestämmer vi oss för att stanna vid några av de mest torra områdena längs vägen. Gosney skriver att det finns möjlighet att se ökenlöpare, som vi tyvärr missar. Vi har dock resans bästa lärkstudier, med korttållärkor, dvärglärkor, kalenderlärkor och asiatiska kalenderlärkor. Till vår förvåning drar tre bivråkar över våra huvuden (undrar just om det rör sig om sena vårflyttare???)

Vid lunchtid bestämmer vi oss för att lämna Halfeti-Birecik för att skåda oss tillbaka västerut mot Adana. Ett kort stopp vid på landet utanför Isilki (ej beskriven som fågelokal) ger vitstrupig näktergal och sjungande gulgrå sparv. Vilken landsbygd! Vid tretiden når vi den gamla borgen vid Toprakkale, som har gjort sig känd som observationsplats för sträckande rovfågel. Vi ser endast örnråk, och ”annat vanligt”: masktörnskata, eksångare, svarthuvad sparv och medelhavsstenskvätta. Resten av dagen blir transportsträcka till Tasuco.

8/6

Morgonen tillbringas vid södra stranden av Akgöl. Med vissa svårigheter hittar vi igenom ”sommarestugeområdena” och sanddynorna, fram till fågeltornet (se Gosney). Här ser vi 15 dvärgskarvar, några purpurhägrar, rödhuvade dykänder och marmoränder, en vitögd dykand och en purpurhöna. En svart frankolin spelar i dynlandskapet. Från vassen tjattrar prinior.

Vi struntar i platser för smyrnakungsfiskare och olivsångare, och ger oss istället upp i bergen. Efter nästan en veckas ”stake-out-skådning” är denna väg mot Antalya något helt oföreglömligt. Vi har ingen aning om vad vi ”ska eller bör” se, men stannar på platser där det ser bra ut. Och bra ser det ut! Otroligt vackert. Vägen ringar sig längs bergskammarna, genom små slitna byar och över oländiga bergspass. Vegetationen är omväxlande. Allt ifrån torr jordbruksbygd till tallskogar och bördiga lövskogsdungar. Långt nere i dalarna skymtar ofta floder med medelhavsblått vatten. I buskiga partier är svarthakad sångare en av de vanligaste fåglarna. I tallskogarna finns tutande krypers nötväckor, spanande masktörnskator. I bördigare partier sjunger sommargyllingar. Övernattning i Hadim.


9/6

Transportsträcka mot Antalya, men några stopp hinner vi med. I en vassrygge söder om Seydisehir är dvärgrördrom vanlig. Flera ses flyga över vassen. I bergen nära Akseki hittar

Mats en sjungande bergsångare. Vi stannar även vid kyrkogården i Akseki. Här sjunger olivsångare. Nu har det blivit så varmt att man inte kan göra annat än att bada. Snabbt slingrar vi oss ned mot Medelhavet och närmaste playa.

Resan avslutas med ett stopp vid Antalyas utkanter, intill Medelhavet. Inte en trut ser vi, det som var syftet med stoppet, men väl en flock delfiner.

Några kommentarer om de platser vi besökte



Lokälhänvisningar på kartan och i texten:

1. Akseki
2. Eregli
3. Nidge-sumpen
4. Sultanträskan
5. Demirkazik
6. Durnalik
7. Birecik
8. Halfeti
9. Tasuco
10. Bergsvägen Silifke-Ermenek-Hadim-Bozkir-Seydisehir
11. Sugla Gölü

Akseki (1)

Av de beskrivna lokalerna besökte vi ”Akseki New Site” och ”Akseki Kyrkogården”. New Site består av en större glänta med enstaka lövträd, omgiven av gles granskog som täcker en stor del av denna bergskedja. I de här skogarna är krypers nötväcka karaktärsfågel, och det



ska mycket till för att man ska missa arten. Vårt besök vid New Site blev en av resans stora upplevelser.

Typisk natur för krypers nötväcka.

I mörkret före gryningen hördes en kör bestående av nattskärria, kattuggla, dubbeltrastar och trädlärka, liksom mer svårbestämda rödstjärtar, krypers nötväckor och medelhavstenskvättor. Senare observerade vi även masktörnskator, rostsparv, mellanspettar, balkanspettar, mindre hackspett och bergsångare.

Det speciella med ”Kyrkogården” är att den inte betas och har rikligt med undervegetation. Vi besökte aldrig ”The 7,9 km layby” och missade därför vitryggig hackspett.

Intressant nog hade vi Aksekis alla speciella arter på andra platser i bergen. Akseki är ett bra exempel på givande bergsvegetation, men det går nästan lika bra att stanna slumpmässigt där det ser ”bra ut”.

Bergsångare hördes (och sågs) även sjunga nära Geris, strax söder om Akseki.

Eregli-träskan (2), Sugla Gölu (11) och Sultanträskan (4)

Bedrövligt tycks turkarna behandla sina våtmarker. Eregli som tidigare ansetts vara ett av VPs mest värdefulla våtmarksområden är numera nästan torrlagt. Från vägen mellan Konya och Eregli kunde vi inte se något vatten. Beträktad på håll tycktes Eregli Akgöl vara uttorkad.

Minst lika illa är det med Sugla Gölu som i verkligheten numera är åkrar. På vår karta från 1997 anges det finnas ca 50 km² sjö och någon kvadratmil träsk. Verkligen deprimerande!

Även för Sultanträskan är lokalbefolkningen orolig. Här har vattennivån sjunkit markant de senaste åren. Någon långvarig torka anses det inte vara frågan om, utan främst överutnyttjande för bevattning.

”Nidge-sumpen” (3)

Söder om Nigde ligger en mindre våtmark, i skådarkretsar kallad ”Nidgesumpen” (eg. Akkaya Brj.). Våtmarken är en bra drive-in-lokal, som anses som relativt säker för kopparand och krushuvad pelikan (vi såg båda).

Kör från Bor (strax sv Nidge) mot Nidge. Strax efter en stormarknad på vänster sida tar Du till höger mot det universitetsområde som håller på att byggas. Härifrån har Du bra utsikt över träsket och en stor skäggtärne-koloni.

Demirkazik (5)

I mörkret kan man bli något osäker om vägen upp till högplatån med snöhönsen. Enklarest är att följa vägen, och att hålla vänster. Vårt besök visar att det inte är nödvändigt att vara ute extremt tidigt på morgonen. Spelet nådde sin kulmen ca klockan sju, men visslingar hördes regelbundet under hela förmiddagen tills vår avfärd ca kl. 13.00. Härlig storspovsstämning!

Det verkar vara lönsamt att ”tuba” längs bergsryggarna. På detta vis hittade vi flera visslande tuppar med omkringsmygande höns.



Tuba ordentligt längs bergsryggarna!

Durnalik (6)

Durnalik är en uppodlad dalgång med en helt ny artsammansättning, jämfört med liknande medelhavsnatur bara några tiotalet mil västerut. Här finns asiatiska arter som blek stensparv, persisk stenskvätta, vitstrupig näktergal, gulgrå sparv, ökenfink, oriensångare och östlig klippnötväcka.



*"Roadrunner" vid
Durnalik*

Vi såg "allt" utom den persiska stenskvättan. Troligen är persisk stenskvätta enklare att se tidigare under året (slutet av mars-maj).



Durnalik. Här börjar Asien på allvar.

Birecik (7)

Några aktuella kommentarer till det som tidigare beskrivits. Strax nordväst om bron över Eufrat har det funnits ett klassiskt sandtag för grön biätare. Det var vid vårt besök igengrävt.

Tamarisksparv och östlig sammethätta tycks finnas lite överallt. Vi hade dem exempelvis vid WWF-centrat och vid de stora dammarna på andra sidan floden (vilka backsvalekolonier!).

Halfeti (8)

Byn Halfeti, som tidigare beskrevs som en skönhet, är sedan något år tillbaka delvis under vatten. Orsaken är en anlagd kraftverksdamm strax söder om byn. Fortfarande finns arter som gulstrupig stensparv och östlig klippnötväcka i området, men om tidsschemat är tufft skulle man kunna strunta i Halfeti. Alla arter som finns här kan ses på andra platser. Längs vägen mellan Birecik (7) och Halfeti finns dock ett par fina områden för lärkor.

Östlig klippnötväcka:
Titta längs vägkanten
när vägen börjar ta sig
ned för sluttningen
mot byn!



*Halfeti – en by som nu
till stor del är
översvämmad.*

Gulstrupig stensparv: Sjöng vid vårt besök intill den översvämmade moskén. (I Moskén finns häckande rostgumpsvåla (år 2001).) Den finns även i fruktodlingar på flera platser mellan Halfeti och Birecik.

Tasuco och Göksu-deltat (9)


Tasuco tycks vara en stor turistort för turkarna själva. I hamnen hittar vi ett lägenhetshotell som kostade mindre ca 30 svenska kr per person och natt, och det med ganska bra standard.

Vi besökte aldrig lokalen med häckande smyrnakungsfiskare.

Bergsvägen Silifke-Ermenek-Hadim-Bozkir-Seydisehir (10)

Mycket vacker. Från vägkanten hade vi, förutom en vidunderlig utsikt, massor av svarthakade sångare (bitvis flera på varje stopp), snöfink, mellanspett och flera balkanspettar. Ett särskilt bra tips är intill vägen ca en mil öster om Ermenek. Stanna vid en källa och ett lönnliknande

träd på norra sidan av vägen. Söder om vägen finns en sluttning med jordbruksbruksmark och vinodlingar. Enbart på denna plats fanns tre sjungande svarthakade sångare, en mellanspett, balkanspettar, ett par häckande rostsparv, alpsglare och flera blåtrastar.



Dessutom observerade vi både grå flugsnappare och revirhävande göktyta, trots att de enligt utbredningskartorna inte ska häcka här.

Taurusbergen, med riklig förekomst av svarthakad sångare.