

SUMATRA & VÄSTJAVA

30 augusti – 17 september 2007



**Karl-Martin Axelsson
Gebbe Björkman
Tommy Ek
Lars Gezelius**

**Bengt Grandin
Gert Johansson
Lars Nilsson
Göran Pettersson (rapportförfattare)**



Under nästan tre veckor besökte vi södra och västra Sumatra samt västra Java. På Sumatra koncentrerade vi oss på låglandsskogen **Way Kambas National Park** några timmar från Bandar Lampung på sydligaste Sumatra. Vi hade förväntat oss något mera fåglar här än vad vi såg. De flesta arterna hittades men fågelsången var begränsad. En månad tidigare hade varit mera optimalt. Området är känt för goda förekomst av *ugglor*, *Frogmouths* och *nattskärror*. Vi ägnade två kvällar åt s.k. nattlys och var mycket nöjda med vårt resultat, 3 arter *ugglor*, 2 arter *Frogmouths* samt 2 arter *nattskärror*. Way Kambas är också en av de bästa platserna för den mycket sällsynta *White-winged Duck*. Lokalerna var dock torrlagda efter en regnfattig sommar, vid vårt besök. Med lite tur ser man *tiger* och för att se *Sumatran Rhinoceros* krävs mycket stor tur. Vi såg tigerspår vid ett par tillfällen.

Mest skådartid lade vi i **Kerinci Sebalat National Park** som ligger centralt i Barisan Range, ca fem timmars transport från Padang på västkusten. Här skådade vi dels på sluttningarna av Gunung Kerinci (3.800 m.ö.h.), dels längs Tapan Road som ligger under 1.000 m.ö.h. Området hyser de flesta av Sumatras endemer och man har hygglig chans att stöta på de flesta av dem. Bl.a. *Schneider's Pitta* som återupptäcktes här efter 40 års frånvaro, ropade rätt så flitigt under vårt besök. Vi fick dock aldrig se någon individ. Skogsavverkningen har tagit hårt på faunan i Barisan Range och Kerinci Sebalat NP utgör inget undantag. Fåglar och däggdjur är undanträngda till de högre skogsklädda bergssluttningarna som fortfarande är orörda. De verkade som skogarna längs Tapan Road var mindre uthuggna än vid Gunung Kerinci. Tiger och trädleopard finns i området och bägge ses relativt regelbunden. Vår lokalguide hade sett tiger veckan innan vår ankomst.

På Java gjorde vi ett kort eftermiddagsbesök på ön **Pulau Rambut** som hyser en större häger- och skarvkoloni. Milky Stork häckar med några få par men de lämnar kolonin under augusti månad, efter häckningen. Vi hann även med några morgontimmar vid **Muara Angke** i utkanten av Jakarta. Ett minst sagt urbant område men hyser fortfarande bra arter som t.ex. *Sunda Teal* och *Sunda Coucal*. **Cerug Gendang Waterall** nära Carita på västkusten fick också ett kortare besök (en eftermiddag och morgon). Här fann vi några Javaendemer som är svårare på andra håll. Vi ägnade resten av tiden åt **Gunung Gede – Pangrango National Park** som är en av Indonesiens bästa fågellokaler. Här är skogsklädda sluttningar med ett rikt fågelliv. Första dagen gav nästan samtliga Javas endemer som finns just här. Området är ett populärt utflyktsmål bland lokalbefolkningen så man får tänka efter vilka veckodagar som passar bäst för att man ska få vara så ostörd som möjligt. **Cibodas Botanical Garden** är också värt ett besök. Vi avslutade skådningen i **Bogor Botanical Garden**, en av världens äldsta parkanläggningar. Här såg vi bl.a. *Grey-cheeked Pigeon*, *Blue-eared Kingfisher* och *Olive-backed Tailorbird*.

OMSLAG: Gunung Kerinci, Kerinci - Sebalat National Park, Sumatra. Foto: Göran Pettersson

DENNA SIDA: *Little Cormorant*. Foto: Bengt Grandin



Purpur- och ägretthägrar i hägerkolonin på Pulau Rambut.

Foto: Bengt Grandin

RESRUTT och KORTLOGG

30 augusti

Avresa från Kastrup respektive Arlanda.

31 augusti

Vi sammanstrålade på Bangkok flygplats och fortsatte därifrån med morgonflyget till Jakarta. Framme efter ca 3 timmars flygning. Smidig visumansökan på flygplatsen och därifrån transport till vårt hotell i centrala Jakarta. Innan lunch körde vi ca 1 ½ timme genom myllrande trafik och på smala landsvägar till **Tanjung Pasir**. En mycket lokal och god lunch på sea food-restaurang innan vi äntrade vår båt för vidare transport ut till **Pulau Rambut**. Skådning där till 17-tiden.

Åter på hotellet vid 20-tiden och första gemensamma middagen åts på hotellet.

1 september

Frukost 05.00 och iväg 05.30 till flygplatsen. Vi kryssade *Javan Munia* och *Bar-winged Prinia* vid avgångsgaten. Planet till **Bandar Lampung** på södra Sumatra avgick 08.30. Vi landade enligt tidtabell kl 09.00 och åkte direkt till **Way Kambas NP**. Framme innan lunch. Lunch på lodgen och sedan iväg in till själva nationalparken. Skådade längs vägen utanför och vid Head Quarter (HQ). På kvällen ett bra nattlys som gav tre *ugglearter* samt *Gould's Frogmouth*.

2 september

Frukost 05:00 och iväg 05:30. Heldag i **Way Kambas NP**. Längre promenad till stora ängsmarker fram till lunch. Några av oss hörde förmodligen en irriterad *tiger* på nära håll! Längre siesta vid HQ fram till 15-tiden. Skådade längs vägen ur parken fram till kl 18.30. Middag kl 20.00.

3 september

Frukost 04.50 och iväg 05.15. Heldag i **Way Kambas NP**. Under förmiddagen båttur på floden Way Kambas fram till biflödet Kali Biru. Såg bl.a. färskas tigerspår. Efter lunch siesta i värmen vid HQ till kl 15.00. Skådade längs vägen ur parken fram till kl 20.00. Bil nr 1 såg två *Sun Bear* som passerade över vägen framför kylaren på bilen! Nattlys även idag som gav bl.a. *Bonaparte's Nightjar* och *Sunda Frogmouth*.



Way Kambas River. På väg mot mynningen i Malackasundet.

Foto: Göran Pettersson

4 september

Frukost kl 04.50 och iväg kl 05.15. Gick vägen in i parken 06.00 – 07.15. Därefter båtfärd på floden Way Kambas ända ut till havet och fiskeläget **Kaula Kambas**. En av resans finaste upplevelser. Fiskeläget ligger verkligen isolerat, långt från allmänna vägar. Mycket båttrafik sågs på håll i Malackasundet. Sjökapten Bengt berättade om episoder från sina seglatser genom sundet. Tillbaka vid HQ kl 16.30. Gick vägen ur parken till kl 18.00.

5 september

Lämnade lodgen 06.20 och framme vid flygplatsen vid **Bandar Lampung** kl 08.10. Planet tillbaka till **Jakarta** avgick planenligt kl 10.05. Längre väntan på flygplatsen i Jakarta innan planet till Padang avgick enligt tidtabell kl 15.45. Framme i **Padang** kl 17.15. Efter visst palaver med vårt bagage, som hade kommit med ett tidigare plan och var undanstuvat i ett kontor på andra våningen, kom vi iväg kl 18.05. Några mil utanför Padang åt vi på en vägkrog och fick nu för första gången stifta bekantskap med *Padang Food*. Massor med små tallrikar med ett 15-tal rätter kom in på bordet. De rätter vi tömde kom in på nytt och de som vi inte åt upp åkte ut (förhoppningsvis till ett kylskåp). Man betalar för det man äter upp. Smidigt och gott! På slingrande vägar körde vi sedan i mörkret till **Keresek Tua** som vi nådde kl 01.15. Några av oss blev faktiskt åksjuka på de krokiga vägarna. Några längre friskluftpåbuds återställde dessbättre åkhumöret. Vi tog in på ett *Losemen*, d.v.s. vi bodde hemma hos en familj som upplät en del av sitt hus för övernattande gäster.

6 september

Frukost kl 05.00 och iväg kl 05.30. Vi tillbringade hela dagen fram till kl 18.00 i **Kerinci Sebalat NP**. Fina skogar där de övre regionerna på berget är orörda. Dock syntes många spår efter illegal avverkning. Hela dalen upp till de övre sluttningarna är avverkade och uppodlade. Vi hörde dagligdags maskinmotorsågar och även under våra nattlys skedde avverkning. Tät undervegetation gör skådningen rätt så avancerad. Under hela vår vistelse i Kerinci Sebalat NP hade vi med oss den sympatiska Mr Subandi som lokal fågelguide. Nattlys kl 20.30 – 22.00 som gav bl.a. *Rajah Scops Owl* och *Short-tailed Frogmouth*.



På väg mot Gunung Kerinci och Kerinci Sebalat NP.

Foto: Bengt Grandin

7 september

Frukost kl 05.00. **Kerinci Sebalat NP** 06.00 – 14.30. Tungt regn från kl 11.45. Regnet startade precis när vi nådde gläntan där Sumatran Cochoa hade setts några dagar innan. Efter en timmes väntan på att regnet skulle upphöra gick och halkade vi stigen tillbaka till bilen. Tommy berättade intressant om regnskogens karaktäristika. Regnvattnet på sluttningarna sökte sig till de lägre partierna, t.ex. vår stig. Det var blött! Regnet upphörde när vi nådde våra bilar. P.g.a. regnet hann vi med ett besök vid **W-Letter Waterfall** kl 16.30 – 18.00.

8 september

Frukost 05.00 och iväg 05.50. Regn på morgonen vilket fick några att stanna kvar på vårt logi. Vi övriga åkte till **W-Letter Waterfall** kl 06.00 – 10.00. Regnet upphörde och vi fortsatte nu till **Sungai Penuh** söderut i dalen. Framme där kl 12.30. Efter lunch på trevlig Padang Food restaurang körde vi **Tapan Road**. Skådning där kl 16.00 – 17.30. Några regnskurar begränsade skådningen. Middag på lunchrestaurangen.

9 september

Frukost 04.30 och iväg 05.10. **Tapan Road** hela dagen kl 06.20 – 17.25. Gick ca 7,2 km med start från mellannivån. Fin skådning i fantastiskt fin och varierad skogsmiljö. Middag på gårdagens restaurang.

10 september

Frukost kl 04.30 och iväg 05.00. Skådning längs övre delen av **Tapan Road** kl 06.00 – 12.00. Nedre delen av Tapan Road kl 13.15 – 15.30. Vi bröt tidigare än beräknat p.g.a. kraftigt regn. Flera *bulbyl*arter hittades på nedre delen. På vägen tillbaka ser Bengt en *Lesser Mouse-Deer* hoppa över vägen. Middag på gårdagens restaurang. Vi som druckit kaffe alla kvällar fick varsitt kvartskilo stort kaffepaket från den lokala produktionen av restaurangpersonalen. Kul!

11 september

Iväg kl 04.35. Transport till Padang under förmiddagen. Flera kortare skådarstopp längs vägen. Framme i **Padang** kl 13.45 och en sista Padang Food lunch på universitetsrestaurangen. Kortare skådarstopp vid våtmarkerna utanför flygplatsområdet.



I väntan på Sunda Teal. Muara Angke.

Foto: Göran Pettersson

Flyget till **Jakarta** avgick enligt tidtabell kl 16.20 och landade kl 18.05. Checkade in på samma hotell som i början på resan. Längre middag med diverse lokala inslag på tallrikarna. Så också i glasen. Gott och trevligt!

12 september

Frukost kl 06.00. Skådade i den minst sagt urbana lokalen **Muara Angke** kl 08.00 – 09.40. Lars N gjorde resans klipp då han envist väntade ut en eventuell *Sunda Coucal*. Den sågs sedan bra av alla. Även några *Sunda Teal* räknades in. Två viktiga arter för lokalen och resan. Transport till **Carita** kl 10.00 – 15.40. Skådade längs stigen till **Curug Gendang Waterfall**. Var kvar till mörkret och hörde 2 *Javan Frogmouth*. Sömnig personal serverade god middag på hotell. Vi var nog de enda gästerna.

13 september

Frukost kl 05.15 och iväg 05.35. Skådade längs stigen till **Curug Gendang Waterfall** kl 06.00 – 09.45. Transport till Cibodas kl 10.35 – 16.30 med välsmakande lunchstopp på restaurang som under visst hysch-hysch serverade oss otrogna hundar (vår resa inföll under Ramadan). Skådade i **Cibodas botanical garden** kl 17.00 – 18.00.

14 september

Frukost kl 05.00 och iväg 05.30. Skådning i **Gunung Gede – Pangrango NP** kl 05.45 – 19.30. Kanondag där Göran klämde in en tredjedel av sina reselifers (på en dag)! Nästintill samtliga tillgängliga endemer sågs och hördes. Vi åt lunch vid Cibeureum Waterfall och vände på eftermiddagen en halvtimmes promenad ovanför vattenfallet. I mörkret på tillbakavägen hördes bl.a. *Javan Frogmouth*. Enklare middag vid vårt logi.



Bogor Botanical Garden.

Foto: Göran Pettersson

15 september

Frukost kl 04.30 och iväg 05.00. **Gunung Gede – Pangrango NP** kl 05.20 – 15.00. Vi vände lite nedanför Air Panas. Avslutade dagen med skådning i **Cibodas botanical garden** kl 15.30 – 17.00. Enklare middag vid vårt logi.

16 september

Frukost kl 06.30. **Cibodas botanical garden** kl 07.15 – 09.30 där vi äntligen hittade *Olive-backed Tailorbird*. Körde till **Bogor** kl 10.45 – 12.15. Välsmakande lunch på resans flottaste hotell med bl.a. suveränt god oxsvanssoppa. Enligt lokalguiden en lokal specialitet. Avslutande Javaskådning i **Bogor botanical garden** kl 14.00 – 17.30 där den sista målarten hängdes in – *Grey-cheeked Pigeon*. Avslutningsmiddag på hotellet.

17 september

Under förmiddagen transport till **Jakarta Airport** och eftermiddagsflyg till Bangkok och vidare till Sverige. Genomfartsleden i Jakarta var en enda lång bilkö.

Sammanfattningsvis var vi eniga om att Sumatra och Java var ett stort plustecken att resa och skåda i. Välfungerande, bra mat, trevliga människor och spännande skådning. Fortsättning lär följa. Indonesien är stort.

Artlistan slutade på cirka 290 arter, inklusive ungefär 80 % av Sumatra- och Javaendemerna

ARTLISTA FÅGLAR

Uppgifterna om respektive arts hotbild kommer från *Threatened birds of the world*, BirdLife International (2000).

Allmänt gäller för de flesta arterna som är hotade i Sydostasien att den största nedgången för respektive art har skett i Indonesien där man beräknar att all primär låglandsskog är avverkad år 2010!

1. **Little Black Cormorant** *Phalacrocorax sulcirostris*
Flera hundra sågs i kolonin på Pulau Rambut 31/8.
2. **Little Cormorant** *Phalacrocorax niger*
2 ex nära Jakarta airport 31/8 samt 30 ex längs vägen Jakarta – Jakarta airport 17/9.
3. **(Oriental) Darter** *Anhinga melanogaster melanogaster* (Ormhalsfågel)
15 ex Pulau Rambut 31/8, 2 ex Way Kambas River 4/9, 12 ex Muara Angke 12/9 samt 1 ex längs vägen Jakarta – Jakarta airport 17/9.
Darter klassas av BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species". Arten är vida spridd i Syd- och Sydostasien och Indonesiens ö-värld. Det övergripande hotet mot arten är habitatförlust, störningar (vid boplatser och födosöksområden), jakt och föroreningar.
4. **Christmas Island Frigatebird** *Fregata andrewsi*
40 ex Pulau Rambut 31/8.
Christmas Island Frigatebird klassas som "Critical Threatened species" av BirdLife International. Arten häckar endast på Christmas Island där 2/3 av bona finns i en koloni. Populationen minskar sedan 1940-talet. Idag uppgår antalet fåglar till ca 3 200 individer. P.g.a. en introducerad myrart tror man att populationen kommer att minska med 80 % de kommande 30 åren. Myran är introducerad och man befärar att den kan predera på fågelungar.
5. **Lesser Frigatebird** *Fregata ariel ariel*
3 ex Pulau Rambut 31/8.
6. **Grey heron** *Ardea cinerea jouyi* (Gråhäger)
75 ex Pulau Rambut 31/8 samt 1 ex Muara Angke 12/9.
7. **Great-billed Heron** *Ardea sumatrana sumatrana*
1 ex mellan Tanjung Pasir och Pulau Rambut 31/8.
8. **Purple heron** *Ardea purpurea manilensis* (Purpurhäger)
100+ Pulau Rambut 31/8, 1 ex Way Kambas River 3/9 och 5 ex 4/9 samt 1 ex Muara Angke 12/9.
9. **Great Egret** *Ardea alba modesta* (Ägretthäger)
100+ Pulau Rambut 31/8, 1 ex Way Kambas 4/9 samt 1 ex Muara Angke 12/9.
10. **Little Egret** *Egretta garzetta nigriceps* (Silkeshäger)
Mycket allmän Pulau Rambut 31/8 samt 10 ex längs vägen 12/9.
11. **Javan Pond Heron** *Ardeola speciosa speciosa*
1 ex Jakarta 1/9, 1-5 ex Way Kambas 2-4/9, samt 3 ex Muara Angke 12/9 och 2 ex längs vägen 17/9.
12. **Cattle Egret** *Bubulcus ibis coromandus* (Kohäger)
20 ex Jakarta 31/8, 40 ex längs vägen 8/9 samt noterad längs vägen 12/9.
13. **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax nycticorax* (Natthäger)
Allmän Pulau Rambut 31/8 och en mindre koloni i Bogor Botanical Garden 16/9.



Natthäger. Bogor Botanical Garden.

Foto: Bengt Grandin

14. **Cinnamon Bittern** *Ixobrychus cinnamomeus*
1 ex Padang Airport 11/9 samt 1 ex Muara Angke 12/9.

15. **Black Bittern** *Dupetor flavicollis flavicollis*
1 ex Way Kambas 4/9.
16. **Milky Stork** *Mycteria cinerea*
1 ex Way Kambas 2/9 och 1 ex Way Kambas River 4/9.
Milky Stork klassas av BirdLife International som "Vulnerable Threatened Species". Arten finns i Kambodja, Malaysia samt på Sumatra och Java. Huvudparten av världspopulationens 6 100 fåglarna finns på Sumatra (ca 5 000 ex). Arten minskar långsamt idag men man tror att minskningen skall öka i fart. I huvudsak p.g.a. att de kustnära skogarna, där arten häckar, avverkas och marken används istället till storskaliga fiskodlingar och risplantage.
17. **Wolly-necked Stork** *Ciconia episcopus neglecta* (Ullhalsstork)
1 ex Bogor Botanical Garden 16/9.
18. **Lesser Adjutant** *Leptoptilos Javanicus*
1 ex Way Kambas 2/9, 4 ex 3/9 samt 1 ex 4/9.
Lesser Adjutant klassas av BirdLife International som "Vulnerable Threatened species". Den minskande världspopulationen uppgår till ca 5 000 fåglar. Störst antal hittar man i Indien (ca 1 200 ex) och Indonesien (ca 2 000 ex med huvuddelen på Sumatra). Arten finns också i mindre antal i flera länder i Sydostasien och på Borneo. De viktigaste faktorerna till artens nedgång ligger i habitatförlust, jakt (bl.a. på ägg och ungar) samt, i Indien, minskat antal öppna soptippar som är viktiga födosöksplatser för arten.
19. **Black-headed Ibis** *Threskiornis melanocephalus* (Orientibis)
2 ex Pulau Rambut 31/8.
Black-headed Ibis klassas av BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species". Arten är vida spridd i Syd- och Sydostasien (dock ej på Malackahalvön). Medan populationen i Östasien uppgår till blott färre än 100 fåglar är Syd- och Sydostasiens populationer i storleken 10 000 – 25 000 fåglar vardera. En allmän minskning har skett av arten till följd av utdikningar, störningar, jakt, föroreningar och omställning av våtmarker till jordbruksmark.
20. **Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus* (Bronsibis)
100+ Pulau Rambut 31/8.
21. **Lesser Whistling Duck** *Dendrocygna javanica* (Orientvisseland)
14 ex Padang Airport 11/9.
22. **Sunda Teal** *Anas gibberifrons*
3 ex Muara Angke 12/9.
23. **Oriental Honey-Buzzard** *Pernis ptilorhynchus* (Tofsbivråk)
1 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9 samt 3 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.
24. **Black-shouldered Kite** *Elanus caeruleus hypoleucus* (Svartvingad glada)
2 ex Kerinci Sebalat NP 7/9 samt 2 ex längs vägen 8/9.
25. **Brahminy Kite** *Haliastur indus intermedius* (Braminglada)
1-4 ex Way Kambas 2-4/9 samt 1 ex Padang Airport 11/9.
26. **White-bellied Sea Eagle** *Haliaeetus leucogaster*
1 ex Pulau Rambut 31/8 samt 5 ex Way Kambas River 4/9.



White-bellied Sea Eagle. Way Kambas River.

Foto : Bengt Grandin

27. **Grey-headed Fish Eagle** *Ichthyophaga humilis humilis*
2 ex Way Kambas 2/9 samt 1 ex 3/9.
Grey-headed Fish Eagle klassas av BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species". Artens utbredning täcker Syd- och Sydostasien men populationerna minskar till följd av p.g.a. minskande livsmiljö för arten. Grey-headed Fish Eagle är bunden till skogsvåtmarker.

28. **Crested Serpent Eagle** *Spilornis cheela* (Orienthjälmsörn)
1 ex Way Kambas 1/9 och 1 ex 4/9, 2 ex Tapan Road, Kerinci Sebalat NP 10/9, 1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9, 1-2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 13-14/9 samt 2 ex Cibodas Botanical garden 16/9.
S. c. batu noterades på södra Sumatra och *S. c. bido* noterades på Java.
29. **Crested Goshawk** *Accipiter trivirgatus*
2 ex Sungai Penuh 8/9 samt 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14-15/9.
Rasen *trivirgatus* är endemisk för Sumatra och rasen *javanicus* är endemisk för Java.
30. **Black Eagle** *Ictinaetus malayensis malayensis* (Svartörn)
1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9, 2 ex längs vägen 11/9 samt 1 ex Cibodas Botanical garden 16/9.
31. **Rufous-bellied Eagle** *Aquila kienerii formosus*
1 ad Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 samt 2 ad 10/9.



Rufous-bellied Eagle. Tapan Road, Kerinci Sebalat NP. Foto: Bengt Grandin

32. **Changeable Hawk Eagle** *Spizaetus cirrhatus limnaeetus*
3 ex Way Kambas River 4/9 samt 1 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9.
33. **Blyth's Hawk Eagle** *Spizaetus alboniger*
1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 2 ex 10/9.
34. **Javan Hawk Eagle** *Spizaetus bartelsi*
1 ad + 1 subad + 1 juv Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
Javan Hawk Eagle som är endemisk för västra Java klassas av BirdLife International som "Endangered Threatened Species". Populationen uppgår till färre än 1 000 fåglar. Nedhuggning av primär regnskog, artens naturliga miljö, för att bana väg för ny jordbruksmark tillsammans med infångade av fåglar för försäljning är idag huvudorsakerna till artens sällsynthet. Sedan Javan Hawk Eagle utsågs till "national bird" har handeln med arten ökat. Ca 30-40 fåglar per år upptäcks på den illegala fågelmarknaden. Mörkertalet vet man inget om.
35. **Wallace's Hawk Eagle** *Spizaetus nanus nanus*
1 ad Way Kambas 3/9.
Wallace's Hawk Eagle klassas av BirdLife International som "Vulnerable Threatened Species". Arten som är bunden till städsegröna låglandsskogar i Sydostasien minskar i antal p.g.a avverkning av dessa skogar. Populationen uppskattas till 2 500 – 10 000 individer.
36. **Black-thighed Falconet** *Microhierax fringillarius*
4 ex Way Kambas 2/9, 1 ex 3/9 samt hela 10 ex Way Kambas River 4/9.
37. **Spotted Kestrel** *Falco moluccensis microbalus*
2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
38. **Chestnut-bellied Partridge** *Arborophila javanica*
3 ropande Gunung Gede – Pangrango NP 14/9, 7 ex varav några sedda 15/9 samt 1 ropande 16/9.
Endemisk för Java.
39. **Red Junglefowl** *Gallus gallus bankiva*
1-8 ex Way Kambas 2-4/9.
Rasen *bankiva* är endemisk för södra Sumatra, Java och Bali.
40. **Salvadori's Pheasant** *Lophura inornata inornata*
1 ♂ + 1 pull Kerinci Sebalat NP 7/9.
Arten är endemisk för Sumatra och populationen uppgår till 2 500 – 10 000 fåglar. I Kerinci Sebalat NP är omfattande jakt på arten huvudorsak till minskning. Detta i kombination med nedhuggning av skog för att skapa jordbruksmark gör att arten klassas som "Vulnerable Threatened Species" av BirdLife International.

41. **Crested Fireback** *Lophura igninta macartneyi*
12 ex Way Kambas 2/9, 3 ex 3/9 samt 2 ex 4/9.
Rasen *macartneyi* är endemisk för sydöstra Sumatra. Crested Fireback klassas av BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species". Arten förekommer från Thailand genom Malaysia samt på Borneo och Sumatra och förekommer här i låglandsskogar. Crested Fireback är lokalt vanlig men hotas av skogsavverkningar.
42. **Bronze-tailed (Sumatran) Peacock-Pheasant** *Polyplectron chalcuroides*
1 ex ropande Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9 och 1 ex ropande 10/9.
Endemisk för Sumatra.
43. **White-breasted Waterhen** *Amaurornis phoenicurus phoenicurus* (Vattenhöna)
1 ex Way Kambas 2/9, 1 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 7/9 samt 10 ex Muara Angke 12/9 och 3 ex Bogor Botanical Garden 16/9.
44. **Common Moorhen** *Gallinula chloropus orientalis* (Rörhöna)
5 ex Muara Angke 12/9.
45. **Whimbrel** *Numenius phaeopus variegatus* (Småspov)
5 ex Puala Rambut 31/8 samt 1 ex Jakarta 1/9.
46. **Common Greenshank** *Tringa nebularia* (Gluttsnäppa)
3 ex Way Kambas 2/9.
47. **Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos* (Drillsnäppa)
1 ex Pulau Rambut 31/8 samt 5 ex Way Kambas 4/9.
48. **Whiskered Tern** *Chlidonias hybrida javanicus* (Skäggtärna)
1 ad Pulau Rambut 31/8 samt 2 ad Way Kambas River 4/9.
49. **Lesser Crested Tern** *Thalasseus bengalensis torresii* (Iltärna)
30 ex Pulau Rambut 31/8 och 1 ex vid kusten utanför mynningen av Way Kambas river 4/9.
50. **Spotted Dove** *Streptopelia chinensis tigrina* (Pärhalsduva)
1 ex längs vägen 8/9, 10 ex Muara Angke och 4 ex Carita Beach 12/9, 5 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9 samt 1 ex Cibodas 15/9 och noterad Bogor Botanical garden 16/9.
51. **Barred Cuckoo Dove** *Macropygia unchall unchall*
2 ex Tapan Road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 15 ex 10/9.
52. **Little Cuckoo Dove** *Macropygia ruficeps sumatrana*
3-10 ex Kerinci Sebalat NP 6-7/9 och 3-10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8-10/9.
Rasen *sumatrana* är endemisk för Sumatra.
53. **Emerald Dove** *Chalcophaps indica indica* (Smaragdduva)
1 ex Pulau Rambut 31/8, 1 ex Way Kambas 2/9 och 4 ex 3/9 samt 1 ex ropande Cerug Gendang Waterfall 13/9.
Arten är ovanlig på Java.
54. **Peaceful Dove** *Geopelia striata*
10 ex Jakarta 31/8 och 1 ex Way Kambas 1/9.
55. **Little Green Pigeon** *Treron olax*
40 ex Way Kambas River 4/9 och 1 ex ropade Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9.
56. **Cinnamon-headed Pigeon** *Treron fulvicollis fulvicollis*
3 ex Way Kambas 2/9, 1 ex 3/9 samt 20 ex Way Kambas River 4/9.
Cinnamon-headed Pigeon klassas av BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species". Arten som förekommer i låglandsskogar från Södra Burma ned till Borneo och Sumatra samt på småöarna i den regionen minskar p.g.a. skogsavverkning. Way Kambas är känd som den lokalen där man har bäst möjligheter att se arten.
57. **Grey-cheeked Pigeon** *Treron griseicauda griseicauda*
16 ex Bogor Botanical Garden 16/9.
Rasen *griseicauda* är endemisk för Java och Bali.
58. **Sumatran (Green-spectacled) Green Pigeon** *Treron oxyurus*
4 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 6 ex 7/9.
Sumatran (Green-spectacled) Green Pigeon klassas av BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species" och är endemisk för Sumatra och Java. Arten förekommer i skogar på 300 – 1 800 meters höjd på Sumatra och på 600 – 3 000 meters höjd på Java. Skogar på lägre höjd avverkas hårt i området och detta gör att arten numera är svårfunnen.
59. **Pink-headed Fruit-Dove** *Ptilinopus porphyreus*
1 ♂ Kerinci Sebalat NP 6/9.
Endemisk för Sumatra, Java och Bali.

60. **Black-naped Fruit-Dove** *Ptilinopus melanospilus melanauchen*
3 ex ropande Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 1 ex ropande 15/9 samt 10 ex Bogor Botanical Garden 16/9.
61. **Green Imperial Pigeon** *Ducula aenea aenea*
Tämligen allmän till allmän i Way Kambas 1-4/9.
62. **Mountain Imperial Pigeon** *Ducula badia badia*
2 ex Kerinci Sebalat NP 7/9 samt 1 ex ropade Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.
63. **Pied Imperial Pigeon** *Ducula bicolor bicolor*
40 ex Pulau Rambut 31/8.



Pied Imperial Pigeon. Pulau Rambut.

Foto: Bengt Grandin

64. **Blue-rumped Parrot** *Psittinus cyanurus cyanurus*
1-10 ex Way Kambas 1-4/9.
65. **Blue-crowned Hanging Parrot** *Loriculus galgulus*
6 ex Way Kambas 2/9 och 10 ex 3/9 samt 30 ex Way Kambas River 4/9.
66. **Yellow-throated Hanging Parrot** *Loriculus pusillus*
2 ex Cibodas Botanical garden 16/9.
Yellow-throated Hanging Parrot klassas av BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species" och är endemisk för Java och Bali. Arten som lever i låglands-, sump- och bergsskogar upp till 2 000 meters höjd minskar långsamt. På Bali klarar arten uppenbarligen hård uthuggning av skogen hyggligt om man sparar höga träd. På Java är dock minskningen mera omfattande.
67. **Indian Cuckoo** *Cuculus micropterus concretus* (Indisk gök)
1 juv Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och samma individ 15/9.
Fågeln matades av en Sunda Warbler.
68. **Sunda Cuckoo** *Cuculus lepidus*
3 ex ropande Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 2 ex ropade 15/9.
Arten är nyligen splittad från *Oriental Cuckoo*.
69. **Banded Bay Cuckoo** *Cacomantis sonneratii*
1-7 ex Way Kambas 1-4/9 samt 1 ex Muara Angke 12/9.
De flesta observationerna utgjordes av ropande fåglar. På Sumatra uppträder rasen *schlegeli* och på Java förekommer rasen *musicus*. *C. s. musicus* är endemisk för Java.
70. **Plaintive Cuckoo** *Cacomantis merulinus lanceolatus*
1 ex ropade Cerug Gendang Waterfall 13/9 och 1 ex ropade Gunung Gede – Pangrango NP 14-16/9.
71. **Brush (Rusty-breasted) Cuckoo** *Cacomantis variolosus sepulchralis*
1 ex ropade Way Kambas 2/9 samt 1 ex ropade Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
72. **Asian Koel** *Eudynamis scolopacea* (Koelgök)
1 ex ropade Pulau Rambut 31/8.
73. **Black-bellied Malkoha** *Phaenicophaeus diardi diardi*
3 ex Way Kambas 2-3/9 samt 3 ex Way Kambas River 4/9.
74. **Chestnut-bellied Malkoha** *Phaenicophaeus sumatranus*
1 ex Way Kambas River 4/9.
75. **Green-billed Malkoha** *Phaenicophaeus tristis elongatus*
7 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 samt 3 ex 10/9.
Rasen *elongatus* är endemisk för Sumatra.

76. **Chestnut-breasted Malkoha** *Phaenicophaeus curvirostris*
1 ex Way Kambas 3/9 samt 2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.
På Sumatra träffar man på rasen *singularis* och på västra och centrala Java förekommer nominatrasen *curvirostris* som är endemisk där.
77. **Sunda Coucal** *Centropus nigrorufus*
1 ex Muara Angke 12/9.
Endemisk för Java.
BirdLife International uppskattar beståndet av denna hotade art till 2 500-10 000 individer. Största hotet mot arten utgörs av habitatförlust och försämrade livsmiljöer. I stor utsträckning omvandlas mangrove och "swamps" till fiskodlingar, jordbruksland samt att områden även tas i bruk för bebyggelse (av industri och bostäder). Förekomsten är nu fragmenterad och p.g.a. omfattande fångst av arten finns risk för lokal utrotning. Därför klassas arten av BirdLife International som "Vulnerable Threatened Species".



Sunda Coucal. Muara Angke.

Foto: Bengt Grandin

78. **Short-toed Coucal** *Centropus rectunguis*
1 ex sågs mycket bra längs Way Kambas River 4/9.
Short-toed Coucal klassas av BirdLife International som "Vulnerable Threatened Species". Som många andra hotade arter som förekommer i Sydostasiens låglandsskogar minskar Short-toed Coucal till följd av avverkning och fragmentering av skogarna. Populationen, som minskar kraftigt, uppgår till ca 10 000 fåglar.
79. **Barn Owl** *Tyto alba javanica* (Tornuggla)
2 ex på morgonen vid hotellet i Sungai Penuh 11/9.
80. **Oriental Bay Owl** *Phodilus badius badius*
1 ex ropade Way Kambas 1/9 och 1 ex ropade 3/9.
81. **Reddish Scops Owl** *Otus rufescens rufescens*
4 ex ropade Way Kambas 1/9 och 3 ex ropade 3/9.
Reddish Scops Owl klassas av BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species". Som många andra arter i Sydostasien som är bundna till låglandsskog hotas Reddish Scops Owl av det hårda avverkningstrycket på skogarna där.
82. **Mountain Scops Owl** *Otus spilocephalus vanderwateri*
2 ex ropade Kerinci Sebalat NP 6/9.
Rasen *vanderwateri* är endemisk för Sumatra.
83. **Rajah Scops Owl** *Otus brookii solokensis*
3 ex ropade Kerinci Sebalat NP 6/9.
Rasen *solokensis* är endemisk för bergsregnskogarna på Sumatra.
84. **Barred Eagle Owl** *Bubo sumatranus sumatranus*
1 ex ropade Kerinci Sebalat NP 6/9 och 2 ex ropade 7/9.
85. **Brown Wood Owl** *Strix leptogrammica myrtha* (Vitbrynad uggla)
2 ex ropade Way Kambas 1/9.
Rasen *myrtha* är endemisk för Sumatra.
86. **Collared Owlet** *Glaucidium brodiei peritum* (Kragsparvuggla)
1 ex ropade Kerinci Sebalat NP 7/10 samt 4 ex ropade Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.
Rasen *peritum* är endemisk för Sumatra.
87. **Javan Owlet** *Glaucidium castanopterum*
2 ex ropade Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 1 ex ropade 15/9.
Endemisk för Java och Bali.

88. **Gould's Frogmouth** *Batrachostomus stellatus*
1 ex ropade Way Kambas 1/9. Fågeln sågs flyga i ficklampsskenet vid ett tillfälle.
Gould's Frogmouth klassas av BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species".
Arten finns från södra Thailand ner till Borneo och Sumatra. Arten är som mest hotad på de indonesiska Sundaöarna där avverkningstrycket på skogarna är som hårdast. I Malaysia och Thailand klarar sig arten bättre där den uppenbarligen anpassat sig till sekundärskog.
89. **Short-tailed Frogmouth** *Batrachostomus poliolophus poliolophus*
1 ex ropade Kerinci Sebalat NP 6/9.
Short-tailed Frogmouth är endemisk för Sumatra och Borneo och rasen *poliolophus* är endemisk för Sumatra. Short-tailed Frogmouth klassas av BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species" då utbredningen är dåligt känd. Arten är känd från endast några få platser. Hastigheten på skogsavverkningarna i artens utbredningsområde torde vara ett hot för populationen.
90. **Javan Frogmouth** *Batrachostomus javensis javensis*
2 ex ropade Cerug Gendang Waterfall 12/9 samt 1 ex ropade Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
Rasen *javensis* är endemisk för västra och centrala Java.
91. **Sunda Frogmouth** *Batrachostomus cornutus cornutus*
1 ex ropade Way Kambas 3/9.
92. **Large-tailed Nightjar** *Caprimulgus macrourus bimaculatus*
1 ex ropade Way Kambas 1/9.
93. **Bonaparte's (Sunda) Nightjar** *Caprimulgus concretus*
1 ex ropade Way Kambas 3/9.
Bonaparte's Nightjar klassas av BirdLife International som "Vulnerable Threatened Species". Arten som antas vara helt bunden till låglandsskog minskar katastrofalt kraftigt Populationen uppgår idag till ca 10 000 fåglar. På Sumatra minskade artens livsmiljö med 30 % mellan 1985-1997 och idag återstår inte mycket av primär låglandsskog på Sumatra.
94. **Waterfall Swift** *Hydrochous gigas*
100 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 7/9 och 140 ex 8/9 samt 2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.
Waterfall Swift klassas av BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species". Arten är uppenbarligen fåtalig. Tidigare fanns arten på Gunung Gede – Pangrango NP men är nu försvunnen därifrån. Waterfall Swift häckar i anknytning till vattenfall. Fynden från Borneo och Malaysia är inte tillfredsställande belagda så artens kända utbredning är på Sumatra och västra Java.
95. **Glossy Swiftlet** *Collocalia esculenta cyanoptila*
Noterad som tämligen allmän Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8-10/9 samt längs vägen till Padang 11/9.
Arten bestämd på utbredning.
96. **Cave Swiftlet** *Collocalia linchi linchi*
8 observationsdagar. Noterad i varierande antal på Java och Way Kambas, Sumatra. Ofta i hyggliga antal.
Arten bestämd på utbredningen.
Glossy/Cave Swiftlet *Collocalia esculenta/linchi*
5 ex Way Kambas 3/9.
97. **Edible-nest Swiftlet** *Aerodramus fuciphagus fuciphagus*
15 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
Arten bestämd på utbredning och storleksjämförelse med *Cave Swiftlet*.
Black-nest/Edible-nest Swiftlet *Aerodramus maximus/fuciphagus*
Noterad i Way Kambas 1-4/9, Kerinci Sebalat NP 6/9 samt längs Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9 och längs vägen till Padang 11/9.
98. **Silver-rumped Needletail** *Rhaphidura leucopygialis*
4 ex Way Kambas 3/9.
99. **Asian Palm-Swift** *Cypsiurus balasiensis infumatus*
2 ex Way Kambas 3/9 och 5 ex Way Kambas River 4/9.
100. **House Swift** *Apus nipalensis subfurcatus*
5 ex vid en bro längs vägen till Bandar lampung 5/9.
101. **Whiskered Treeswift** *Hemiprocne comata comata*
10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 5 ex 10/9 samt 1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.
102. **Javan Trogon** *Harpactes reinwardtii*
3 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.
Arten är endemisk för västra Java.



Javan Trogon. Gunung Gede – Pangrango NP.

Foto: Bengt Grandin

103. **Sumatran Trogon** *Harpactes mackloti*
2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 1 ex 10/9.
Arten är endemisk i Barisan range, Sumatra.
104. **Red-naped Trogon** *Harpactes kasumba kasumba*
2 ex Way Kambas 2/9.
Red-naped Trogon klassas av BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species".
Utbredningen löper från södra Thailand till Borneo och Sumatra. Då arten är bunden till
låglandsregnskog är hotet stort för framtiden. Dessbättre finns uppgifter om att arten klarar sig hyggligt
på malaysiska delen av Borneo när skogen gallrats och inte slutavverkats.
105. **Scarlet-rumped Trogon** *Harpactes duvaucelii*
2 ex Way Kambas 2/9.
Scarlet-rumped Trogon är av BirdLife International klassad som "Lower Risk/Near Threatened
species". Arten påträffas fortfarande allmänt i primär och gallrad låglandsskog (även sumpskogar) upp
till 1 065 meters höjd. Förutsatt att krontaksträden inte är kraftigt uthuggna och artens förmåga att klara
sig i föryngrings-skogar och på sluttningar gör att det inte föreligger något direkt hot mot arten på
Malackahalvön. I Indonesien där trycket på skogarna är hårdare är framtiden dock mera oviss.
106. **Blue-eared Kingfisher** *Alcedo meninting*
5 ex Way Kambas 3/9 och 10 ex Way Kambas River 4/9 samt 3 ex Bogor Botanical Garden 16/9.
På Sumatra ser man rasen *rufigastra* och på Java förekommer nominatrasen *meninting*.



Blue-eared Kingfisher.

Foto: Bengt Grandin

107. **Small Blue Kingfisher** *Alcedo coerulescens*
10 ex Way Kambas River 4/9 samt 1 ex Muara Angke 12/9.
108. **Banded Kingfisher** *Lacedo pulchella pulchella*
1 ex ropade Way Kambas 3/9.

109. **Stork-billed Kingfisher** *Halcyon capensis cyanopteryx*
1-5 ex Way Kambas 1-4/9.
110. **White-throated Kingfisher** *Halcyon smyrnensis* (Smyrnakungsfiskare)
3 ex Way Kambas river 4/9, noterad under transporterna den 5/9, 2 ex Kerinci Sebalat NP 6-7/9 samt 5 ex längs vägen 8/9.
111. **Collared Kingfisher** *Todiramphus chloris*
2 ex Pulau Rambut 31/8, 1 ex Way Kambas river 4/9, 1 ex längs vägen 8/9 1 ex Cerug Gendang Waterfall och 1 ex längs vägen 13/9 samt 2 ex Cibodas Botanical garden 15/9 och 5 ex Bogor Botanical Garden 16/9.
På Java ser man rasen *palmeri* och på södra Sumatra finns rasen *laubmannianus*.
112. **Sacred Kingfisher** *Actenoides sanctus*
1 ex Pulau Rambut 31/8 samt 1 ex Muara Angke 12/9.
113. **Blue-throated Bee-eater** *Merops viridis viridis*
5 ex Way Kambas river 4/9.
114. **Chestnut-headed Bee-eater** *Merops leschenaultia*
1 ex Way Kambas 3/9.
115. **Dollarbird** *Eurystomus orientalis*
1 ex Way Kambas 3/9 och 2 ex 4/9.
116. **Black Hornbill** *Anthraceros malayanus*
1 ex ropade Way Kambas 1/9 och 2 ex ropade 3/9 samt 3 ex Way Kambas river 4/9.
Black Hornbill är av BirdLife International klassad som "Lower Risk/Near Threatened species". Arten påträffas i primär (även gallrad) låglands- och sumpskog upp till vanligtvis 500 meters höjd. Största hotet mot artens existens finns på Sundaöarna där hastigheten på skogsavverkningen utgör ett allvarligt hot mot artens framtid. Arten är mera tolerant för sekundärskog än övriga Hornbills men är samtidigt påverkad av minskningen av slättlandshabitat. Detta har gjort att arten minskat inom hela sitt utbredningsområde.
117. **Rhinoceros Hornbill** *Buceros rhinoceros rhinoceros*
4 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och ytterligare 4 ex 10/9.
Rhinoceros Hornbill är av BirdLife International klassad som "Lower Risk/Near Threatened species". Arten påträffas i låglands-, bergs- och sumpskogar upp till 1 400 meters höjd. Största hotet mot arten finns på Sundaöarna där hastigheten på skogsavverkningen utgör ett allvarligt hot mot artens framtid. Det övergripande hotet mot arten är avskogning och fragmentering av artens biotoper. Skogsavverkning med syfte att plantera oljepalmer har orsakat nedgång av beståndet i hela utbredningsområdet.
118. **Great Hornbill** *Buceros bicornis*
1 ex Way Kambas river 4/9.
Great Hornbill är av BirdLife International klassad som "Lower Risk/Near Threatened species". Arten som förekommer i städsegröna skogar upp till 1 560 meters höjd finns från västra och sydvästra Kina (rar), indiska halvön och Sydostasien till Sumatra. Tätheten i förekomsten av Great Hornbill sammanfaller med hur mycket stora träd det finns i artens närhet. Arten är därför vanligast i opåverkade skogar och som mest hotad i områden med högt avverkningstryck.
119. **Helmeted Hornbill** *Buceros vigil*
1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.
Helmeted Hornbill är av BirdLife International klassad som "Lower Risk/Near Threatened species". Arten påträffas i städsegröna skogar och lövfällande skogar upp till 1 500 meters höjd. Helmeted Hornbill påverkas i mindre utsträckning av selektiv avverkning och förekommer även på högre höjder där skogsavverkningen ännu inte är så omfattande som i låglandet. Ett annat hot mot arten är jakt där syftet är att komma över den enorma kask som pryder näbbasen (f f a hannens).
120. **Wreathed Hornbill** *Aceros undulatus*
8 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 4 ex 10/9.
121. **Brown Barbet** *Calorhamphus fuliginosus hayii*
2-8 ex Way Kambas 2-4/9.
122. **Fire-tufted Barbet** *Psilopogon pyrolophus*
10 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 5 ex 7/9, 12 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9 samt noterad utan bokförda antal 9-10/9 samt 5 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.
I litteraturen anges inte arten från Java. Fåglarna på Gunung Gede – Pangrango NP har okänt ursprung men arten är observerad där vid flera tillfällen under de senaste åren.
123. **Brown-throated Barbet** *Megalaima corvina*
10 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 6 ex 15/9.
De flesta observationerna utgörs av ropande fåglar. Arten är endemisk för västra Javas bergsskogar.

124. **Red-crowned Barbet** *Megalaima rafflesii*
5-6 ex Way Kambas 1-4/9. De flesta observationerna avser ropande fåglar.
Red-crowned Barbet är av BirdLife International klassad som "Lower Risk/Near Threatened species". Utbredning går från södra Burma till Borneo och Sumatra där den finns i städsegrön låglandsskog upp till 800 meters höjd. Avskogning och påföljande fragmentering av utbredningen är ett allvarligt hot mot artens framtid.
125. **Red-throated Barbet** *Megalaima mystacophanos mystacophanos*
1 ex ropade Way Kambas 2/9.
126. **Black-banded (Javan) Barbet** *Megalaima javensis*
1 ex Muara Angke 12/9 samt 3 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.
Black-banded Barbet som är endemisk på Java och Bali klassas av BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species". Arten finns i gles städsegrön låglandsskog upp till 1 500 meters höjd. Den extrema skogsavverkningen på Java och Bali är ett stort hot mot arten. Dessbättre är avverkningen inte lika omfattande på högre höjder varför hotet är mindre där.
127. **Black-browed Barbet** *Megalaima oorti oorti*
5 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 3 ex 7/9 samt 2-4 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8-10/9.
128. **Flame-fronted (Orange-fronted) Barbet** *Megalaima armillaris armillaris*
10 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 5 ex 15/9.
De flesta observationerna utgörs av ropande fåglar. Arten är endemisk på Java och Bali. Nominatformen *armillaris* är endemisk för Java.
129. **Blue-eared Barbet** *Megalaima australis duvaucelii*
1-3 ex Way Kambas 1-4/9.
130. **Coppersmith Barbet** *Megalaima haemacephala rosea*
10 ex Bogor Botanical Garden 16/9.
Rasen *rosea* är endemisk för Java och Bali.



Skådning på Tapan Road.

Foto: Bengt Grandin

131. **Speckled Piculet** *Picumnus innominatus malayorum*
1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.
132. **Brown-capped (Sunda) Woodpecker** *Dendrocopos moluccensis moluccensis*
2 ex Way Kambas 2/9, 5 ex Muara Angke 12/9, 2 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9 och 4 ex 13/9 samt 1 ex Jakarta airport.
133. **Fulvous-breasted Woodpecker** *Dendrocopos macei analis*
1 ex Muara Angke 12/9, 1 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9 och 1 ex 13/9.
Rasen *analis* är endemisk för södra Sumatra, Java och Bali.
134. **Rufous Woodpecker** *Celeus brachyurus squamigularis*
2 ex Way Kambas 2/9.
135. **White-bellied Woodpecker** *Dryocopus javensis javensis* (Vitbukig spillkråka)
2 ex Way Kambas river 4/9.
136. **Banded Woodpecker** *Picus miniaceus malaccensis*
1 ex Way Kambas 1/9 och 1 ex 4/9.
137. **Lesser Yellownape** *Picus chlorolophus vanheysti*
2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.
Rasen *vanheysti* är endemisk för Sumatras högland.

138. **Crimson-winged Woodpecker** *Picus puniceus puniceus*
1 ex Way Kambas 2/9 samt 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
Nominatformen *puniceus* är endemisk för Java.
139. **Checker-throated Woodpecker** *Picus mentalis humii*
2 ex Way Kambas 3/9 samt 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9.
140. **Maroon Woodpecker** *Blythipicus rubiginosus*
1 ex ropade Kerinci Sebalat NP 6/9.
141. **Buff-necked Woodpecker** *Meiglyptes tukki tukki*
1 ex Way Kambas 3/9.
Buff-necked Woodpecker är av BirdLife International klassad som "Lower Risk/Near Threatened species". Arten påträffas i ädellövskog eller blandskog samt i sumpskogar upp till 1 250 meters höjd från södra Burma och Thailand till Borneo och Sumatra. Största hotet mot artens existens finns på Sundaöarna där hastigheten på skogsavverkningen utgör ett allvarligt hot mot artens framtid. På Malackahalvön är arten fläckvis tämligen allmän och hotbilden mindre.
142. **Black-and-red Broadbill** *Cymbirhynchus macrorhynchus macrorhynchus*
3 ex Way Kambas river 4/9.
143. **Long-tailed Broadbill** *Psarisomus dalhousiae psittacinus*
2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.
144. **Banded Broadbill** *Eurylaimus javanicus*
2 ex ropade Way Kambas 2/9 och 3 ex ropade 3/9, 1 ex sågs bra Cerug Gendang Waterfall 13/9 samt 1 ex ropade Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 1 ex ropade 15/9.
På Sumatra förekommer rasen *harteri* och på Java förekommer rasen *javanicus*.
145. **Black-and-yellow Broadbill** *Eurylaimus ochromalus*
2 ex Way Kambas 1/9 och 1 ex 4/9.
Black-and-yellow Broadbill är av BirdLife International klassad som "Near Threatened species". Arten påträffas i primära och sekundära skogar samt i omgivande plantager upp till 1 200 meters höjd från södra Burma och Thailand till Borneo och Sumatra, Java och Bali. I Thailand och Malaysia påverkas arten i mindre utsträckning av selektiv avverkning och förekommer även på högre höjder där skogsavverkningen ännu inte är så omfattande som i låglandet.



Padang Food i Sungai Penuh.

Foto: Bengt Grandin

146. **Schneider's Pitta** *Pitta schneideri*
2 ex ropade Kerinci Sebalat NP 6/9 och 1 ex ropade Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.
Schneider's Pitta är endemisk för Sumatra och förekommer enbart i Barisan Range. Historiskt har populationen varit hygglig vid Gunung Kerinci men återupptäckten 1988 var första fyndet av arten på 70 år. Enligt BirdLife International uppgår det minskande beståndet av arten till 2 500-10 000 individer. Största hotet mot arten utgörs av habitatförstörelse. Då främst genom att skogarna avverkas (illegalt) för att bereda mark för jordbruk. Arten klassas av BirdLife International som "Vulnerable threatened species".

147. **Banded Pitta** *Pitta guajana*
1-2 ex ropade Way Kambas 1-4/9 samt 5 ex ropade Cerug Gendang Waterfall 13/9.
En av fåglarna i Way Kambas sågs mycket bra. På Sumatra förekommer rasen *irena* och på Java ser man nominatformen *guajana*. *Irena* är den mest spektakulärt färgade av raserna av Banded Pitta.
148. **Black-crowned (Graceful) Pitta** *Pitta venusta*
1 ex ropade Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9.
Black-crowned Pitta är endemisk för Sumatra och förekommer liksom Schneider's Pitta enbart i Barisan Range. Enligt BirdLife International uppgår det minskande beståndet av arten till 2 500-10 000 individer. Största hotet mot arten utgörs av habitatförstörelse. Då främst genom att skogarna avverkas (illegalt) för att bereda mark för jordbruk. Black-crowned Pitta har sin utbredning på lägre höjd än Schneider's Pitta därför är också hotet mot arten större då avverkningsstrycket på skogarna är större på lägre höjd. Arten klassas av BirdLife International som "Vulnerable threatened species".
149. **Barn Swallow** *Hirundo rustica* (Ladusvala)
2-3 ex Way Kambas 1-3/9 och 20 ex Way Kambas river 4/9, noterad vid Kerinci Sebalat NP 6-7/9 samt 3 ex Muara Angke 12/9.
150. **Pacific Swallow** *Hirundo tahitica javanica*
2 ex Pulau Rambut 31/8, 1 ex Way Kambas river 4/9, 8 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 4 ex 10/9, 10 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9, 2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 10 ex 15/9 samt noterad längs vägen 16-17/9.
151. **Grey Wagtail** *Motacilla cinerea cinerea* (Forsärla)
Sedd dagligen i Kerinci Sebalat NP 6-10/9 med 1-10 ex samt 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 1 ex 15/9.
152. **Sunda Cuckooshrike** *Coracina larvata melanocephala*
2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9 och 6 ex 9/9.
Arten är endemisk för Sumatra, Borneo och Java. Rasen *melanocephala* är endemisk för Sumatra.
153. **Javan Cuckooshrike** *Coracina javensis*
1 ♂ + 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 1 ex 15/9.
154. **Bar-bellied Cuckooshrike** *Coracina striata sumatrensis*
3 ex Way Kambas river 4/9.
155. **Pied Triller** *Lalage nigra nigra*
1 par vid mynningen av Way Kambas river 4/9 samt 2 ex Muara Angke 12/9.
156. **Fiery Minivet** *Pericrocotus igneus igneus*
1-6 ex Way Kambas 2-4/9.
Fiery Minivet är av BirdLife International klassad som "Near Threatened species". Arten påträffas i mangrove och ädellövskogar upp till 1 220 meters höjd men i huvudsak under 600 meters höjd, från södra Burma och Thailand till Borneo, Sumatra och Filippinerna (Palawan). Avverkningstrycket på skogarna i låglandet är ett stort hot mot arten. Dessbättre är avverkningen inte lika omfattande på högre höjder varför hotet är mindre där.
157. **Sunda Minivet** *Pericrocotus miniatus*
40 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 80 ex 7/9.
Arten är endemisk för högländerna på Sumatra och Java och uppträder ofta i stora flockar. Den 7/9 såg vi ca 50 ex tillsammans.
158. **Scarlet Minivet** *Pericrocotus flammeus xanthogaster*
2 ex Way Kambas 2/9 och 2 ex 4/9 samt 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.
159. **Grey-chinned Minivet** *Pericrocotus solaris montanus* (Gråstrupig minivett)
6 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 5 ex 7/9 samt 8 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.
160. **Bar-winged Flycatcher-Shrike** *Hemipus picatus intermedius*
8 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.



Black-winged Flycatcher-shrike.

Foto: Bengt Grandin

161. **Black-winged Flycatcher-Shrike** *Hemipus hirundinaceus*
2 ex Way Kambas 2/9 och 9 ex 4/9, 1 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9 och 8 ex 13/9 samt 1 ex längs vägen 13/9 och 2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.
162. **Cream-striped Bulbul** *Pycnonotus leucogrammicus*
3-8 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8-10/9.
Arten är endemisk i bergsskogarna på västra Sumatra.
163. **Spot-necked Bulbul** *Pycnonotus tympanistrigus*
3-20 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8-10/9.
Spot-necked Bulbul som är endemisk för Sumatra klassas BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species". Arten förekommer i bergsskogar mellan 600 – 1 400 meters höjd (huvuddelen av populationen finns under 900 meters höjd). I början av 1990-talet fanns inte många fynd men arten är i dag känd från flera områden. Arten minskar dock till följd av skogsavverkning.
164. **Black-headed Bulbul** *Pycnonotus atriceps hyperemnus*
1 ex Way Kambas 1/9 och 10 ex 2/9.
165. **Grey-bellied Bulbul** *Pycnonotus cyaniventris cyaniventris*
4 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.
Grey-bellied Bulbul är av BirdLife International klassad som "Lower Risk/Near Threatened species". Arten förekommer i låglandsskog och i bergsskogar upp till 1 200 meters höjd från södra Burma/Thailand till Burma och Sumatra. Grey-bellied Bulbul förekommer även i sekundär skog och på högre höjder där skogsavverkningen ännu inte är så omfattande som i låglandet samt i glesa skogsområden. Dessutom förekommer den även i ytterkanterna av skogsområden. Detta sammantaget gör att det inte föreligger något omedelbart hot mot arten.
166. **Sooty-headed Bulbul** *Pycnonotus aurigaster aurigaster*
10 ex Jakarta 31/8 och 5 ex 1/9, noterad med flera ex längs vägen Sungai Penuh – Padang 11/9, noterad med flera ex Muara Angke 12/9, samt noterad med flera ex Bogor Botanical Garden 16/9 och längs vägen 17/9.
Arten är introducerad på Sumatra. Rasen *aurigaster* är endemisk för Java och Bali.



Sooty-headed Bulbul.

Foto: Bengt Grandin

167. **Orange-spotted Bulbul** *Pycnonotus bimaculatus barat*
6 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 5 ex 15/9.
Arten är endemisk för Sumatra, Java och Bali.
168. **Yellow-vented Bulbul** *Pycnonotus goiavier*
2 ex Way Kambas 4/9, 2 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 1 ex 7/9, 4 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9 samt 2 ex Muara Angke 12/9.
På Sumatra förekommer rasen *personatus* och på Java finner man rasen *analisis*.
169. **Cream-vented Bulbul** *Pycnonotus simplex simplex*
3 ex Way Kambas 1/9, 1 ex 2/9 och 1 ex 4/9.
170. **Red-eyed Bulbul** *Pycnonotus brunneus brunneus*
Från enstaka ex till tämligen allmän Way Kambas 1-4/9 samt 4 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.

171. **Ochraceous Bulbul** *Alophoixus ochraceus sumatranus*
6 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.
Rasen *sumatranus* är endemisk för västra Sumatras högländ.
172. **Hairy-backed Bulbul** *Tricholestes criniger*
1 ex Way Kambas 1/9.
173. **Sunda Bulbul** *Ixos virescens*
10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/2 och 2 ex 10/9 samt 4 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
Arten är endemisk i bergsskogarna på västra Sumatra och Java. På Sumatra finner man rasen *sumatranus* och på Java förekommer rasen *virescens*.
174. **Ashy Bulbul** *Hemixos flavala cinereus*
10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.
175. **Blue-winged Leafbird** *Chloropsis cochinchinensis*
2 ex Way Kambas 1/9, 1 ex 2/9 och 8 ex 4/9, 8 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 1 ex 10/9 samt 1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.
På Sumatra ser man rasen *icterocephala* och på Java rasen *nigricollis*.
176. **Golden-fronted Leafbird** *Chloropsis aurifrons media*
3 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 2 ex 10/9.
Rasen *media* är endemisk för Sumatra.
177. **Blue-masked Leafbird** *Chloropsis venusta*
1 ♂ Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 10 ex 10/9.
Blue-masked Leafbird som är endemisk för Sumatra klassas av BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species". Den förekommer i bergsskogar mellan 600 – 1 500 meters höjd. P.g.a. skogsavverkningar finns samma hotbild mot denna art som för många andra skogslevande arter på Sumatra.
178. **Common Iora** *Aegithina tiphia scapularis*
4 ex Muara Angke 12/9, 1 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9 och 8 ex 13/9 samt 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
Rasen *scapularis* är endemisk för Java och Bali.
179. **Green Iora** *Aegithina viridissima viridissima*
1-9 ex Way Kambas 1-4/9.
Green Iora klassas av BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species". Utbredningen löper från södra Burma/Thailand till Borneo och Sumatra. Då arten är bunden till låglandsregnskog är hotet stort för framtiden. Dessbättre finns uppgifter om att arten klarar sig hyggligt i sekundärskog i Thailand och Malaysia.
180. **Javan Whistling Thrush** *Myophonus glaucinus*
5 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 9 ex 15/9.
Arten är endemisk i bergsskogarna på Java och Bali.



Javan Whistling-Thrush.

Foto: Bengt Grandin

181. **Chestnut-winged Whistling Thrush** *Myophonus castaneus*
2 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 4 ex 7/9 samt 2 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9.
Arten är endemisk för Sumatra.

182. **Blue Whistling Thrush** *Myophonus caeruleus dichrorhynchus* (Blå visseltrast)
1 ex Kerinci Sebalat NP 7/9 samt 5 ex under hela dagen 8/9.
183. **Lesser Shortwing** *Brachypteryx leucophrys leucophrys*
5 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 7 ex 7/9, 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 6 ex 10/9, 4 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9, 6 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 12 ex 15/9 samt 2 ex Cibodas Botanical garden 16/9.
Så gott som samtliga observationer avser sjungande fåglar.
184. **White-browed Shortwing** *Brachypteryx montana* (Blå kortvinge)
10 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 16 ex 7/9 samt 2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 4 ex 15/9.
Så gott som samtliga observationer avser sjungande fåglar. I Kerinci Sebalat NP (6-7/9) var skillnaden i höjdbredning mycket påtaglig. White-browed ersatte Lesser när man kom högre upp på skogsslutningarna. I Gunung Gede – Pangrango NP var denna skillnad mindre tydlig. På Sumatra förekommer den endemiska rasen *saturata* och på Java finner man den endemiska nominatformen *montana*.
185. **Hill Prinia** *Prinia atrogularis dysancrita* (Svartstrupig prinia)
1 ex Keresek Tua 8/9, 7-10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8-10/9 samt 3 ex längs vägen 11/9.
Rasen *dysancrita* är endemisk för västra Sumatra.
186. **Bar-winged Prinia** *Prinia familiaris prinia*
1 ex Jakarta Airport 1/9, 15 ex Muara Angke 12/9, 5 ex Cerug Gendang Waterfall och 3 ex Carita Beach 13/9, 2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 6 ex 15/9 samt flera ex Cibodas Botanical garden och i Bogor Botanical Garden 16/9.
Arten är endemisk för Sumatra, Java och Bali.
187. **Yellow-bellied Prinia** *Prinia flaviventris rafflesi*
1 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9.
188. **Javan Tesia** *Tesia superciliaris*
10 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 4 ex 15/9.
Arten är endemisk i bergsskogarna på Java och var där vanligare på lite lägre höjd.
189. **Sunda Bush Warbler** *Cettia vulcania*
2 ex Kerinci Sebalat NP 7/9 och 3 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.
På centrala och södra Sumatra uppträder den endemiska rasen *flaviventris* och på Java nominatformen *vulcania*.
190. **Oriental Reed Warbler** *Acrocephalus orientalis* (Kinesisk trastsångare)
2 ex Muara Angke 12/9.
191. **Clamorous Reed Warbler** *Acrocephalus stentoreus lentecaptus* (Papyrussångare)
3 ex Muara Angke 12/9.
192. **Mountain Tailorbird** *Orthotomus cuculatus cuculatus*
8 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 2 ex 7/9, 5 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 7 ex 15/9 samt 1 ex Cibodas Botanical garden 16/9.
Rasen *cuculatus* är endemisk för Sumatra, Java och Bali.
193. **Dark-necked Tailorbird** *Orthotomus atrogularis atrogularis*
1-4 ex Way Kambas 1-4/9.
194. **Ashy Tailorbird** *Orthotomus ruficeps*
3-10 ex Way Kambas 1-3/9 samt allmän Way Kambas river 4/9, 10 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9 samt 6 ex Muara Angke 12/9 och 2 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.
På Sumatra förekommer rasen *cineraceus* och på Java den endemiska nominatformen *ruficeps*.
195. **Olive-backed Tailorbird** *Orthotomus sepium sepium*
3 ex Cibodas Botanical garden och 2 ex Bogor Botanical garden 16/9.
196. **Eastern crowned Leaf Warbler** *Phylloscopus coronatus* (Östlig kronsångare)
1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.
197. **Mountain Warbler** *Phylloscopus trivirgatus trivirgatus*
3 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 10 ex 7/9, 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9 samt 10 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 15 ex 15/9.
198. **Chestnut-crowned Warbler** *Seicercus castaniceps* (Rödkronad bambusångare)
5 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 3 ex 7/9 samt 3 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 5 ex 10/9.
På västra Sumatra finner man den endemiska rasen *muelleri*.
199. **Sunda Warbler** *Seicercus grammiceps*
3 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 5 ex 7/9, 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 3 ex 10/9 samt 15 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 5 ex 15/9.
1 adult fågel matade 1 juvenil *Indian Cuckoo* i Gunung Gede – Pangrango NP 15/9. På Sumatra ser man rasen *sumatrensis* och på Java förekommer rasen *grammiceps*.

- Arten är endemisk för Sumatra, Java och Bali.
200. **Asian Brown Flycatcher** *Muscicapa dauurica* (Glasögonflugsnappare)
1 ex Way Kambas 3/9 samt 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.
201. **Snowy-browed Flycatcher** *Ficedula hyperythra* (Vitbrynad flugsnappare)
2 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 1 ex 7/9 samt 1 par Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.
På Sumatra förekommer rasen *sumatrana* och på Java finner man rasen *vulcani*.
202. **Little Pied Flycatcher** *Ficedula westermanni* (Nunneflugsnappare)
1 ♂ Kerinci Sebalat NP 6/9, 4 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 6 ex 15/9 samt 8 ex Cibodas Botanical garden 16/9.
På Sumatra förekommer nominatformen *westermanni* och på Java ser man rasen *hasselti*.
203. **Verditer Flycatcher** *Eumyias thalassina thalassoides* (Turkosflugsnappare)
3 ex Gunung Gede – Pangrango NP 9/9.
204. **Indigo Flycatcher** *Eumyias indigo*
1 ex Kerinci Sebalat NP 6/9, 6 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 1 ex 15/9 samt 1 ex Cibodas Botanical garden 16/9.
Arten är endemisk för Sumatra, Java och Borneo. *E. i. ruficrissa* på Sumatra och *E. i. indigo* på Java.
205. **Large Niltava** *Niltava grandis decipiens* (Större niltava)
1 ♂ Kerinci Sebalat NP 6/9.
206. **White-tailed Flycatcher** *Cyornis concretus concretus*
1 ♂ Kerinci Sebalat NP 10/9.
207. **Pale Blue Flycatcher** *Cyornis unicolor harteri*
1 ♂ Kerinci Sebalat NP 10/9.
208. **Mangrove Blue Flycatcher** *Cyornis rufigastra rufigastra*
2 ex sjungande Way Kambas river 4/9.
209. **Grey-headed Canary Flycatcher** *Culicicapa ceylonensis ceylonensis* (Gråhuvad solflugsnappare)
Sedd dagligen i Kerinci Sebalat NP 6-10/9 med 4-10 ex samt 3 ex längs vägen Keresek Tua – Padang 11/9 och 2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
210. **Oriental Magpie Robin** *Copsychus saularis musicus* (Skatnäktergal)
1-2 ex Way Kambas 2-4/9.
211. **White-rumped Shama** *Copsychus malabaricus tricolor*
2 ex Way Kambas 3/9.
212. **Rufous-tailed Shama** *Trichixos pyrropygus*
1 ex sjungande Way Kambas 4/9.
213. **Sunda Robin** *Cinclidium diana diana*
6 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 2 ex 15/9.
Arten är endemisk för Sumatra och Java och rasen *diana* förekommer enbart på Java.
214. **Sunda (Lesser) Forktail** *Enicurus velatus*
2 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9 samt 5 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 3 ex 15/9.
Arten är endemisk för Sumatra och Java. På Sumatra uppträder rasen *S. v. sumatranus* och på Java rasen *S. v. velatus*.



Sunda Forktail.

Foto: Bengt Grandin

215. **White-crowned Forktail** *Enicurus leschenaulti leschenaulti* (Vitkronad klyvstjärt)
1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 2 ex 15/9.
Nominatformen *leschenaulti* är endemisk för Java och Bali.
216. **Javan Cochoa** *Cochoa azurea*
1 ex sjungande Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.
Arten är endemisk i bergen på västra och centrala Java och klassas av BirdLife International som "Vulnerable threatened species". Man finner Javan Cochoa i bergsregnskogar mellan 900 -3 000 meters höjd. Avverkning, uthuggning och fragmentering av skogarna är största hotet mot arten. Populationen uppgår till 2 500 – 10 000 individer.
217. **Rufous-tailed Fantail** *Rhipidura phoenicurus*
12 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 10 ex 15/9.
Arten är endemisk i bergsskogarna på Java.
218. **White-throated Fantail** *Rhipidura albicollis atrata*
4 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 4 ex 7/9 samt 2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 3 ex 10/9.
219. **Pied Fantail** *Rhipidura javanica*
2 ex Way Kambas 2-3/9, 8 ex Muara Angke 12/9 samt 1 ex Cibodas Botanical garden 16/9.
R. j. longicauda uppträder på Sumatra och *R. j. javanica* på Java.
220. **Black-naped Monarch** *Hypothymis azurea prophata*
1 ♂ Way Kambas 2/9, 2 ex 3/9 och 1 par 4/9.
221. **Asian Paradise Flycatcher** *Terpsiphone paradisi australis* (Asiatisk paradisflugsnappare)
2 ex Way Kambas 3/9.
Rasen *australis* är endemisk för södra Sumatra och Java.
222. **Rufous-fronted Laughingthrush** *Garrulax rufifrons rufifrons*
4 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
Arten är endemisk för Java. *G. r. rufifrons* har sin utbredning på västra Java. BirdLife International klassar arten som "Lower Risk/Near Threatened species" p.g.a. fångststrycket. Arten är en populär burfågel. Dessbättre är miljön som arten förekommer i inte hotad.
223. **Black Laughingthrush** *Garrulax lugubris lugubris*
2-6 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8-10/9.
224. **Chestnut-capped Laughingthrush** *Garrulax mitratus mitratus*
5-20 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8-10/9.
Rasen *mitratus* är endemisk för västra Sumatras högland.



Lunchen vägs.

Foto: Bengt Grandin

225. **White-chested Babbler** *Trichastoma rostratum rostratum*
1-5 ex längs Way Kambas river 2-4/9.
White-chested Babbler är av BirdLife International klassad som "Near Threatened species". Arten förekommer i mangrove och nära vatten i låglandsskog upp till 500 meters höjd från södra Burma/Thailand till Borneo och Sumatra. Artens förmåga att anpassa sig även till sekundär skog och igenvuxna plantager gör att det inte föreligger något omedelbart hot mot arten.
226. **Ferruginous Babbler** *Trichastoma bicolor*
1 ex Way Kambas 1/9 och 1 ex 2/9.
227. **Horsfield's Babbler** *Malacocincla sepiaria sepiaria*
4 ex Cerug Gendang Waterfall och 2 ex Carita Beach 13/9 samt 8 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och allmän 15/9.
Rasen *sepiaria* är endemisk för Java och Bali.
228. **Black-capped Babbler** *Pellorneum capistratum capistratum*
1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.
Rasen *capistratum* är endemisk för Java.
229. **Moustached Babbler** *Malacopteron magnirostre magnirostre*
3 ex Way Kambas 3/9 och 1 ex 4/9.
230. **Sooty-capped Babbler** *Malacopteron affine affine*
10 ex Way Kambas 2-3/9 och 1 ex 4/9.
Sooty-capped Babbler är av BirdLife International klassad som "Lower Risk/Near Threatened species". Arten förekommer tämligen allmänt i låglandsskog och sumpskogar upp till 700 meters höjd från södra Thailand till Borneo och Sumatra. Artens förmåga att anpassa sig även till sekundär skog och att den även förekommer i skogskanter gör att det inte föreligger något omedelbart hot mot arten.
231. **Scaly-crowned Babbler** *Malacopteron cinereum cinereum*
1 ex Way Kambas 2/9 och 2 ex 3/9.
232. **Rufous-crowned Babbler** *Malacopteron magnum magnum*
2 ex Way Kambas 3/9.
Rufous-crowned Babbler är av BirdLife International klassad som "Lower Risk/Near Threatened species". Arten förekommer tämligen allmänt i låglandsskog upp till 800 meters höjd från södra Burma/Thailand till Borneo, Sumatra och Filippinerna (Palawan). Artens förmåga att anpassa sig även till sekundär skog gör att det inte föreligger något omedelbart hot mot arten.
233. **Rusty-breasted Wren Babbler** *Napothera rufipectus*
5 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 6 ex 7/9.
Arten är endemisk i bergsskogarna på västra Sumatra.
234. **Eye-browed Wren Babbler** *Napothera epilepidota diluta*
5 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 2 ex 7/9.
Rasen *diluta* är endemisk för norra och västra Sumatra.
235. **Pygmy Wren Babbler** *Pnoepyga pusilla* (Mindre smygtimalia)
10 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 6 ex 7/9, 2 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 7/9, 8 ex hela dagen 8/9, 6 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9 samt 10 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 15 ex 15/9.
Två olika raser på resan; *P. p. lepida* på Sumatra och *P. p. rufa* på Java. I artens nordliga del av utbredningsområdet består sången av två toner. På såväl Sumatra som Java varierade sången från två till tre toner och ibland även fyra toner. Särskilt i Gunung Gede – Pangrango NP hördes många individer sjunga fyra toner.
236. **Rufous-fronted Babbler** *Stachyris rufifrons polioaster*
6 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 2 ex 7/9 samt 2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 1 ex 10/9.
237. **Golden Babbler** *Stachyris chrysaea frigida*
20 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 10 ex 7/9, 25 ex under dagen 8/9 samt 2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9-10/9.
Rasen *frigida* är endemisk för västra Sumatras högländ.
238. **White-breasted Babbler** *Stachyris grammiceps*
1 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9 och 1 ex 13/9.
White-breasted Babbler som är endemisk på västra Java klassas av BirdLife International som "Lower Risk/Near Threatened species". Arten påträffas i låglandsskog och på skogssluttningar upp till 1 400 meters höjd. Utanför Gunung Halimun, där arten är mycket allmän, är förekomsten fragmenterad.
239. **Grey-throated Babbler** *Stachyris nigricaps larvata*
30 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 5 ex 7/9, 15 ex hela dagen 8/9 samt 10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.
Rasen *larvata* är endemisk för Sumatra och Lingga-arkipelagen.

240. **Spot-necked Babbler** *Stachyris striolata striolata*
3 ex längs vägen Kerinci – Padang 11/9.
På västra Sumatras högland finner man rasen *S. s. striolata*.
241. **White-bibbed (Tree-) Babbler** *Stachyris thoracica thoracica*
6 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 14 ex 15/9.
Arten är endemisk för Sumatra och Java.
242. **Chestnut-rumped Babbler** *Stachyris maculata maculata*
1-5 ex Way Kambas 2-4/9.
Chestnut-rumped Babbler är av BirdLife International klassad som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Arten förekommer i ädellövskogar upp till 800 meters höjd från södra Thailand till Borneo och Sumatra. Då arten förekommer i lägre bergsskogar där skogsavverkningarna ännu inte varit omfattande föreligger inte något omedelbart hot mot arten.
243. **Chestnut-winged Babbler** *Stachyris erythroptera pyrrhophaea*
1-2 ex Way Kambas 1-4/9.



Skogen längs Tapan Road.

Foto: Bengt Grandin

244. **Crescent-chested (Tree-) Babbler** *Stachyris melanothorax melanothorax*
2 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9, samt 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 4 ex 15/9.
Arten är endemisk för Java och Bali.
245. **Striped Tit-Babbler** *Macronous gularis gularis*
Från 4 ex till allmän Way Kambas 2-4/9 samt 2 ex sjungande Cerug Gendang Waterfall 13/9 och 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
246. **Grey-cheeked Tit-Babbler** *Macronous flavicollis javanicus*
10 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9 och 15 ex 13/9.
Arten är endemisk för Java och Kangean Islands (Java Sea).
247. **White-browed Shrike-Babbler** *Pteruthius flaviscapis*
4 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 samt 4 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
På Sumatra rasen *cameranoi* och på Java rasen *flaviscapis*.
248. **Chestnut-fronted Shrike-Babbler** *Pteruthius aenobarbus aenobarbus*
4 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 1 ex 15/9.
Rasen *aenobarbus* är endemisk för västra Java.
249. **Javan Fulvetta** *Alcippe pyrrhoptera*
20 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 40 ex 15/9.
Arten är endemisk i skogarna på västra och centrala Java.
250. **Long-tailed Sibia** *Heterophasia picaoides simillima*
8 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 2 ex 7/9 samt 4 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 6 ex 10/9.
Rasen *simillima* är endemisk för västra Sumatra.
251. **Pygmy Tit** *Psaltria exilis*
9 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.
Arten är endemisk i bergsskogarna på västra och centrala Java.

252. **Golden-bellied Gerygone** *Gerygone sulphurea sulphurea*
1 ex Pulau Rambut 31/8, 2 ex Jakarta 1/9, 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 2 ex 10/9 samt 10 ex Muara Angke 12/9.
253. **Great Tit** *Parus major* (Talgoxe)
2 ex sjungande Way Kambas river 4/9, 4 ex Kerinci Sebalat NP 6-7/9, 2 ex Muara Angke 12/9, 3 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9 och 2 ex 13/9, 10 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 25 ex 15/9 samt noterad Cibodas Botanical garden och Bogor Botanical Garden 16/9.
Rasen *ambiguus* på Sumatra är en blek variant på vår form av talgoxe och lever i huvudsak i mangrove. På Java ser man rasen *cinereus*.
254. **Velvet-fronted Nuthatch** *Sitta frontalis velata*
1 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9 och 6 ex 13/9.
Rasen *velata* är endemisk för Java.
255. **Blue Nuthatch** *Sitta azurea*
8 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 4 ex 7/9, 5 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 2 ex 10/9, 8 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 5 ex 15/9 samt 1 ex Cibodas Botanical garden 16/9.
På Sumatra ses rasen *expectata* och på Java rasen *nigriventer* som är endemisk för västra Java.
256. **Ruby-cheeked Sunbird** *Chalcoparia singalensis sumatrana*
4 ex Way Kambas river 4/9 samt 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.
Rasen *sumatrana* är endemisk för Sumatra och Belitung Island.
257. **(Plain-) Brown-throated Sunbird** *Anthreptes malacensis*
1 ex Way Kambas 1/9, 1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9 samt 2 ex Bogor Botanical Garden 16/9.
258. **Purple-throated Sunbird** *Leptocoma sperata brasiliana*
5 ex Way Kambas 3/9 och 6 ex Way Kambas river 4/9.
259. **Olive-backed Sunbird** *Nectarinia jugularis ornatus*
1 ex Way Kambas 2/9 och 3 ex 3/9, 2 ex Muara Angke 12/9 samt 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
260. **White-flanked Sunbird** *Aethopyga eximia*
4 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 8 ex 15/9 samt 10 ex Cibodas Botanical garden 16/9.
Arten är endemisk för Java.
261. **Eastern Crimson Sunbird** *Aethopyga siparaja siparaja*
6 ex Way Kambas 3/9 och 10 ex Way Kambas river 4/9.
262. **Scarlet (Javan) Sunbird** *Aethopyga mystacilis*
1 par Cerug Gendang Waterfall 13/9.
Arten är endemisk för Java.
263. **Temminck's Sunbird** *Aethopyga temminckii*
2 ex Kerinci Sebalat NP 7/9, 2 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9 samt 2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9-10/9.
264. **Spectacled Spiderhunter** *Arachnothera flavigaster*
1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.
265. **Streaky-breasted Spiderhunter** *Arachnothera affinis affinis*
1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.
266. **Orange-bellied Flowerpecker** *Dicaeum trigonostigma melanostigma*
1-2 ex Way Kambas 1-4/9 samt 6 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 3 ex 10/9.
267. **Plain Flowerpecker** *Dicaeum concolor sollicitans*
1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9 samt 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
Rasen *sollicitans* är endemisk för Java och Bali.
268. **Fire-breasted (Buff-bellied) Flowerpecker** *Dicaeum ignipectus beccarii* (Orientblomsterpickare)
1 ♂ W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9 samt 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 3 ex 10/9.
Rasen *beccarii* är endemisk för bergsskogarna på Sumatra.
269. **Blood-breasted Flowerpecker** *Dicaeum sanguinolentum sanguinolentum*
1 par Cerug Gendang Waterfall 13/9, 2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och 4 ex 15/9 samt 10 ex Cibodas Botanical garden 16/9.
270. **Scarlet-headed Flowerpecker** *Dicaeum trochileum trochileum*
1 ♀ Tanjung Pasir 31/8, 1 par Jakarta 1/9 samt 5 ex Muara Angke 12/9 och 1 ex Bogor Botanical Garden 16/9.
271. **Oriental White-eye** *Zosterops palpebrosus* (Indisk glasögonfågel)
Sedd dagligen i Kerinci Sebalat NP 6-10/9 från enstaka fåglar till 30 ex (Tapan road 9/9), noterad längs vägen Kerinci – Padang 11/9, 5 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9 samt noterad i Gunung Gede – Pangrango NP 15/9 och Cibodas Botanical garden 16/9.

- Såväl den gulbukiga rasen *sumatranus* och den gråbukiga rasen *buxtoni* uppträder tillsammans både på Java och Sumatra. Den smala gula buklinjen på *buxtoni* var ibland nästan omöjlig att se. Det föreligger alltså förväxlingsrisk med Mountain White-eye.
272. **Black-capped White-eye** *Zosterops atricapilla atricapilla*
10 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 6 ex 7/9 samt 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.
Arten är endemisk för Sumatra och Borneo
273. **Javan Grey-throated White-eye** *Lophozosterops javanicus frontalis*
Allmän Gunung Gede – Pangrango NP 14-15/9.
Arten är endemisk för Java och *L. j. frontalis* är endemisk för västra Java.
274. **Dark-throated Oriole** *Oriolus xanthonotus xanthonotus*
1 ♂ Way Kambas 4/9.
275. **Black-naped Oriole** *Oriolus chinensis maculatus*
8 ex Pulau Rambut 31/8, 2 ex Muara Angke 12/9, samt 1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9 och 7 ex Bogor Botanical Garden 16/9.
276. **Black-and-crimson Oriole** *Oriolus cruentus consanguineus*
10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 1 ex 10/9.
O. c. consanguineus är endemisk för Sumatra.
277. **Asian Fairy Bluebird** *Irena puella*
1-2 ex Way Kambas 1-4/9, 10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 4 ex 10/9 samt 1 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.
På Sumatra förekommer rasen *crinigera* och på Java den endemiska rasen *turcosa*.
278. **Long-tailed Shrike** *Lanius schach bentet* (Rostgumpad törnskata)
1 ex längs vägen Bandar Lampung – Way Kambas 1/9, 2 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 8 ex 7/9, 8 ex under dagen 8/9 samt 10 ex längs vägen Kerinci – Padang 11/9 och 1 ex Jakarta Airport 17/9.
279. **Rufous-winged Philentoma** *Philentoma pyrhoptera pyrhoptera*
1 ex Way Kambas 4/9.
280. **Ashy Drongo** *Dicrurus leucophaeus* (Grå drongo)
3 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9, 20 ex 9/9 och noterad utan bokförda antal 10/9, 2 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9 samt 2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9 och 1 ex Cibodas Botanical garden 16/9.
På Sumatra kan det röra sig om flera raser medan rasen på Java är nominatformen *leucophaeus*.
281. **Bronzed Drongo** *Dicrurus aeneus malayensis*
2 ex Way Kambas 3/9 samt 8 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9 och 1 ex 9/9.
282. **Lesser Racket-tailed Drongo** *Dicrurus remifer remifer*
4 ex Way Kambas 1/9, 3 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9-10/9 samt 3 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14-15/9.
Nominatformen *remifer* är endemisk för Sumatra och Java.
283. **Sumatran Drongo** *Dicrurus sumatranus*
1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9.
Sumatran Drongo som är endemisk för Sumatra klassas av BirdLife International som ”Lower Risk/Near Threatened species”. Man hittar arten i låglandsskog och på skogssluttningar upp till 800 meters höjd. Det hårda avverkningsstrycket på låglandsskog på Sumatra utgör ett hot för arten.
284. **Greater Racket-tailed Drongo** *Dicrurus paradiseus platurus*
5 ex Way Kambas 2/9 och 3 ex 3/9.
285. **White-breasted Woodswallow** *Artamus leucorhynchus amydrus*
5 ex Pulau Rambut 31/8, 8 ex Way Kambas river 4/9 samt 4 ex Muara Angke 12/9.
286. **Black Magpie** *Platysmurus leucopterus leucopterus*
1 ex sjungande Way Kambas 3/9.
287. **Sumatran Treepie** *Dendrocitta occipitalis*
10 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9, 12 ex 9/9 och tämligen allmän 10/9.
Arten är endemisk för Sumatra.
288. **Racket-tailed Treepie** *Cryspirina temia*
5 ex Muara Angke 12/9.
289. **Slender-billed Crow** *Corvus enca compiler*
Hörd Way Kambas 1/9, 3 ex 2/9 och 3 ex 4/9 samt 5 ex W-Letter Waterfall, Kerinci Sebalat NP 8/9.
290. **Large-billed Crow** *Corvus macrorhynchos macrorhynchos* (Djungelkråka)
Noterad utan bokförda antal Jakarta 31/8 samt 8 ex Way Kambas 1/9.
291. **Hill Myna** *Gracula religiosa religiosa* (Beostare)
4-10 ex Way Kambas 1-4/9.
292. **Javan Myna** *Acridotheres javanicus*

40 ex Pulau Rambut 31/8, 2 ex Kerinci Sebalat NP 7/9, 3 ex längs vägen 8/9 samt 15 ex Muara Angke 12/9.

Arten är endemisk för Java och Bali.

293. **Eurasian Tree Sparrow** *Passer montanus malaccensis* (Pilfink)
11 observationsdagar. Inga bokförda antal under resan men arten sågs i samtliga besökta tätorter.
Västra Indonesien är för oss européer artens bortre utpost.
294. **Javan Munia** *Lonchura leucogastroides*
8 ex Jakarta Airport och 2 ex Way Kambas 1/9 samt 6 ex Muara Angke 12/9 och 5 ex Cerug Gendang Waterfall 13/9.
295. **Scaly-breasted Munia** *Lonchura punctulata* (Fjällig munia)
2 ex Jakarta Airport och 2 ex Way Kambas 1/9.
Scaly-breasted Munia är på Sumatra företrädd med rasen *fretensis* och på Java med rasen *nisoria*.
296. **White-headed Munia** *Lonchura maja maja*
3 ungfåglar vid Padang Airport 11/9.



Sumatran Treepie.

Foto: Bengt Grandin

ARTLISTA DÄGGDJUR

1. **Black Giant Squirrel** *Ratufa bicolor*
1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.
2. **Black-striped (Black-banded) Squirrel** *Callosciurus nigrovittatus*
1 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 2 ex 7/9 samt 1 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
3. **Plantain Squirrel** *Callosciurus notatus*
10 observationsdagar. 1-5 ex Way Kambas 1-4/9, 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9 och allmän 9-10/9, flera vid Cerug Gendang Waterfall 13/9 samt 5 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9 och flera ex 15/9.
4. **Prevost's Squirrel** *Callosciurus prevostii*
1 ex dagligen Way Kambas 1-4/9.
5. **Binturong** *Arctictis binturong*
1 ex Way Kambas 2/9 och 1 ex 4/9.
Tiger *Pantera tigris*
Färska tassavtryck längs Kali Biru river 3/9. Ett dovt läte (morrande) på nära håll som gav gåshud, Way Kambas 1/9, kan ha kommit från en tiger.
6. **Short-tailed Mongoose** *Herpestes brachyurus*
1 ex Way Kambas
7. **Javan Mongoose** *Herpestes javanicus*
2 ex Gunung Gede – Pangrango NP 15/9.
Arten är endemisk för Java.

8. **Sun Bear** *Helarctos malayanus*
2 ex passerade mitt framför första bilen på väg ut ur Way Kambas vid 20-tiden på kvällen 4/9.
9. **Variable Flying Fox** *Pteropus hypomelanus*
Flera 100 ex Puala Rambut 31/8.
10. **Mitred Leaf Monkey** *Presbytis melalophos*
3 ex Kerinci Sebalat NP 6/9 och 7 ex 7/9 samt 2 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 9/9 och 5 ex 10/9.
11. **Javan Langur (Ebony Leaf-Monkey)** *Trachypithecus auratus*
5 ex Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
12. **Silvered Leaf Monkey (Langur)** *Trachypithecus cristatus*
3 ex Way Kambas 1/9, 3 ex 3/9 och 1 ex 4/9.
13. **Long-tailed (Crab-eating) Macaque** *Macaca fascicularis*
15 ex Way Kambas 1/9 och 10 ex 3/9 samt noterad utan bokförda antal 2/9 och 4/9.
14. **Agile Gibbon** *Hylobates agilis*
1 ropande grupp hörd Way Kambas 2/9 och ytterligare 1 grupp hörd 4/9.
15. **Silvery (Javan) Gibbon** *Hylobates moloch*
1 grupp hörd Cerug Gendang Waterfall 12/9 samt 1 ex grupp hörd Gunung Gede – Pangrango NP 14/9.
16. **Siamang** *Hylobates syndactylus*
Många grupper hördes ropa i Way Kambas 2-4/9, 3 grupper hördes Kerinci Sebalat NP 7/9 samt 1 grupp hördes Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9 och 1 grupp hördes längs vägen Keresek Tua – Padang 11/9.
17. **Common Treeshrew** *Tupaia glis*
6 ex Kerinci Sebalat NP 6/9, 1 ex W-Letter Waterfall och 1 ex Tapan road, Kerinci Sebalat NP 8/9 samt 1 ex Cerug Gendang Waterfall 12/9.
18. **Bearded Pig** *Sus barbatus*
15 ex Way Kambas 3/9. Flera "vildsvin" sågs skymta i markerna under vår vistelse i Way Kambas men endast djuren den 3/9 bestämdes. Parkvakterna ansåg att de flesta vildsvin som sågs i Way Kambas var Bearded Pig.
19. **Lesser Mouse-Deer** *Tragulus javanicus*
1 ex passerade framför en av bilarna på väg från Tapan road, Kerinci Sebalat NP 10/9.
20. **Indian Muntjac** *Muntiacus muntjak*
1 ex Way Kambas 2/9.
21. **Sambar** *Cervus unicolor*
1 flock hördes springa iväg på morgonen och ytterligare 1 ex skällde på kvällen Way Kambas 2/9.

DESSUTOM:

1. **Water Monitor Lizard** *Varanus salvator*
2 ex Way Kambas 3/9 och 5 ex 4/9 samt 1 ex Bogor Botanical Garden 16/9.



Water Monitor Lizard.

Foto: Bengt Grandin

2. **Bengal (Clouded) Monitor** *Varanus bengalensis*
4 ex Pulau Rambut 31/8.
3. **Common House Gecko** *Gekko monarchus*
Flera ex vid vårt logi Way Kambas 1-4/9 samt noterad Sungai Penuh 8/9.
4. **Smith's Giant (Forest) Gecko** *Gekko smithi*
2 ex Way Kambas 3/9 och 1 ex 4/9.
5. **Mugger Crocodile** *Crocodylus palustris*
1 ex Way Kambas 4/9.