

ETIOPIEN 15 JANUARI – 5 FEBRUARI 2010



Stockholms Ornitologiska Förening

Deltagare:

Roger Börjesson, Askim
 Björn Christensson, Nacka
 Michael Frost, Sollentuna
 Stig Holmstedt, Gysinge StOFs ledare
 Carl Jyker, Göteborg
 Kjell Sahlberg, Vällingby
 Rickard Stensman, Uppsala
 Ulla-Britt Sundqvist- Stensman, Uppsala
 Robert Thor, Falköping
 Henrik Waldenström, Stockholm

Expeditionsledare och lokal guide: Håkan Pohlstrand, Strängnäs

Chaufför: Brook Kassa, Addis Ababa

Tross: Asfaw, Tesfai och Tigisto, Addis Ababa

Rapporten är författad av Stig Holmstedt.
 Samtliga bilder är tagna av Björn Christensson.

Dagsprogram:

Fredag 15/1	Avresa från Sthlm/Arlanda kl. 20.00.
Lördag 16/1	Ankomst Addis Ababa ca kl. 8.00 på morgonen. Färd till Wendo Genet via Lake Ziway. Hotell
Söndag 17/1	Wendo Genet, Wendo Genet till Lake Bojo, Lake Bojo. Tält
Måndag 18/1	Lake Bojo, Lake Bojo till Nechisar NP. Tält
Tisdag 19/1	Nechisar NP, Lake Chamo (båttur), Lake Chamo till Yabello. Tält
Onsdag 20/1	Heldag kring Yabello. Tält
Torsdag 21/1	Yabello, Yabello till Arero (Bobella Forest), Bobella Forest. Tält
Fredag 22/1	Bobella Forest, Bobella Forest via Liben Plains Negelle. Hotell
Lördag 23/1	Negelle till Harenna Forest. Tält
Söndag 24/1	Harenna Forest, Harenna Forest via Senetti Plains till Sof Omar. Tält
Måndag 25/1	Sof Omar, Sof Omar till Dinsho (Bale NP), Bale NP. Vandrarhem
Tisdag 26/1	Heldag Bale NP. Vandrarhem.
Onsdag 27/1	Bale NP, Bale NP till Lake Abiata, Lake Abiata. Tält

- Torsdag 28/1** Lake Abiata, Lake Abiata via Senkele till Lake Awasa, Lake Awasa. Hotell
- Fredag 29/1** Lake Awasa, Lake Awasa till Awash NP, Awash NP. Tält
- Lördag 30/1** Alledeghi Plain, Bilen Plain, Lubak Lodge, Awash NP. Tält
- Söndag 31/1** Awash NP; Awash NP till Melka Gebdo, Melka Gebdo. Tält
- Måndag 1/2** Melka Gebdo, Melka Gebdo via Ankober till Debre Birhan. Hotell
- Tisdag 2/2** Debre Birhan till Jemma Valley, Jemma Valley. Tält
- Onsdag 3/2** Heldag Jemma Valley. Tält
- Torsdag 4/2** Jemma Valley, Jemma Valley - Debre Zeyt - Addis Ababa (flygplatsen)
- Fredag 5/2** Avresa med flyg strax efter midnatt. Ankomst till Stockholm/ Arlanda kl. 9.00 på morgonen.



Northern White-crowned Shrike

Resedagbok

16/1. Efter start från Arlanda kl. 20 den 15/1 och mellanlandning i Rom anlände vi på morgonen den 16/1 till Addis Ababas moderna flygplats. Här möttes vi av vår expeditionsledare Håkan Pohlstrand och vår chaufför Brook Kassa. En vecka innan resan hade Håkan gett mig rådet att skaffa ett intyg från Etiopiska ambassaden i Stockholm om att vi var fågelskådare och att vi därför hade kameror, videokameror samt tub- och handkikare med oss. Det var nämligen parlamentsval på gång och man var tydligen extra känsliga. Jag hade självfallet skaffat ett sådant intyg, men det hjälpte tyvärr inte. Av någon märklig anledning lade byråkraterna omgående beslag på två HD videokameror som, till skillnad från äldre modeller, inte fick tas in i landet. Trots långa förhandlingar blev kamerorna kvar på flygplatsen och kunde inte hämtas ut förrän när vi tre veckor senare återkom, och då bara mot en oskäligen avgift!

Förutom att två av deltagarna därmed berövades sin fotoutrustning kom episoden att försena oss rejält så att programmet för dagen fick kortas av en del. Innan vi lämnade Addis hann vi se en *Booted Eagle*, några *White-backed Vultures* och ett antal *Large-billed Ravens* uppe i luften samt tre *Tacazze Sunbirds* i några buskar vid flygplatsens parkering.

Vi embarkaderade våra två Toyota Landcruisers och for söderut ner i Rift Valley. Efter en dryg timme stoppade vi för lunch i fält i skuggan av några stora träd i det i övrigt öppna landskapet. Lunchunderhållningen bestod av ytterligare en *Booted Eagle*, resans enda *Long-legged Buzzard* samt ca 25 förbiflygande *Chestnut-bellied Sandgrouses*. Från fordonen samt vid några korta stopp adderades till artlistan bl.a. *Great White och Pink-backed Pelican*, *White Stork*, *Abdim's Stork*, *African Spoonbill*, *Lesser Flamingo*, *African Harrier-Hawk*, *Long-crested Hawk-Eagle*,

Abyssinian Ground-hornbill, fyra arter *Rollers* samt *Wattled Starling*.

Vid den långa piren ut i Lake Ziway gjorde vi ett längre stopp. Tyvärr hade det sjöns vattenstånd var lågt och våtmarkerna som omgav den mycket torra. Vi noterade dock en del fina arter – främst en *Black Heron*, två *Lesser Jacanas* och fyra *African Pygmy-geese* samt bl.a. *Great White Pelicans*, *Darters* och hundratals *Marabou Storks*.



Lesser Jacana

Sent på dagen kom vi till vårt hotell i Wendo Genet och kunde konstatera att det satt ett antal *Silvery-billed Hornbills* i träden runtomkring. De flesta av oss tog ett dopp i bassängerna med vatten från platsens heta källor innan vi intog en välförtjänt middag.

17/1. Tidigt på morgonen hade Håkan skickat ut sina lokala spanare till bäcken nedanför de varma källorna och de kunde snart meddela att vår önskade *Half-collared Kingfisher* var på plats. Snabbt ned dit således och, jovisst satt halvkragen där! En *Rufous-breasted Sparrowhawk* kom susande, dock utan att fånga kungsfiskaren.

Vi körde sedan ett stycke upp för en sluttning där det fanns en del mer ursprunglig skog som var ganska öppen och därmed lättskådad. Den främsta målarten var endemen *Abyssinian Woodpecker* och den fick vi se mycket fint i minst två exemplar. Innan vi, efter ett

alltför kort besök, måste lämna det fina området hann vi också med bl.a. *Brown Snake-Eagle*, *Yellow-fronted Parrot*, *White-cheeked Turaco*, *African Emerald Cuckoo*, *Yellow-fronted Tinkerbird*, *Banded Barbet*, *Grey-headed Woodpecker*, *Black Saw-wing*, *Rüppel's Robin Chat*, *African Mountain Thrush*, *Spotted Creeper*, *Asbyssinian Oriole* och *Red-winged Starling*.

Efter lunchen hittades en *Brown Parisoma* i de höga träden nära restaurangen. Därefter gav vi oss på vägarna igen, mot nordost, och den av Håkan nyupptäckta Lake Bojo. Längs vägen såg vi *Hemprich's Hornbill*, *Red-throated Wryneck*, *Abyssinian Black Wheatear* och *Blue Rock Thrush*.

När vi anlände till sjön hade vår duktiga tross redan slagit upp tätlägret i skogskanten invid strandängen. Ett hundratal människor av den lokala befolkningen stod och tittade nyfiket och kom att göra så under nästan hela det dygn som vi var på denna plats. De hade nog inte sett många vita människor förut – det här var ju knappast ett turistmål och som fågellokal, som sagt, helt nyupptäckt. Den främsta målarten var *Wattled Crane* som Håkan några veckor tidigare hade upptäckt höll till här i imponerande antal utanför häckningstiden (som tillbringas på hög höjd). Två ex sågs tämligen omgående på långt håll, och i skymningen räknades hela 76 fåglar komma in och landa i sjöns sydända. Detta antal måste vara rekordartat för denna ovanliga fågel. Det fanns tranor av ytterligare två arter vid sjön – ca 150 *Common Cranes* och sex *Black Crowned Cranes* – och det kryllade av vadare och annan vattenfågel. Vi noterade 100 *Great White Pelicans*, 40 *Yellow-billed Storks*, 40 *African Spoonbills*, 6 *Spur-winged Geese*, 100 ex. av vardera *White-faced* och *Fulvous Whistling Duck*, ännu en *Lesser Jacana*, en *Pied Avocet*, 100 *Kittlitz's Plovers*, 1000 *Ruffs* samt 20 *Gull-billed*, 100 *White-winged* och 50 *Whiskered Terns*. På strandängarna var *Yellow Wagtails* och *Red-throated Pipits* mycket

allmänna. Resans första *Lanner Falcon* svepte förbi. I strandskogen syntes *Eurasian Wryneck*, *Grey-headed Batis* och ca 20 *Clapperton's Francolins*. I skymningen flög flera *Slender-tailed Nightjars* utefter stranden och under natten spelade ett par *Northern White-faced Owls* nästan rakt över våra tält.



African Spoonbill och Yellow-billed Stork

18/1. Morgonen inleddes med en vandring längs Lake Bojos sydstrand. *Greater Flamingo*, *Knob-billed* och *White-backed Duck*, *Southern Pochard*, *Blue-headed Coucal* samt *African Pygmy Kingfisher* kunde adderas till vår snabbt växande artlista.

Sent på förmiddagen startade vi vår långa färd mot söder och Nechisar. Längs vägen syntes de resnya *Black-crowned Night Heron*, *Wattled Ibis*, *Lappet-faced* och *Rüppel's Vulture*, *Wahlberg's Eagle*, *Bateleur*, *Black-bellied Bustard*, *European Bee-eater*, *Red-fronted* och *Black-billed Barbet*, *Plain-backed Pipit*, *Common Rock Thrush*, *Rattling Cisticola* och *Scarlet-chested Sunbird*.

Ett av resans få missöden inträffade under denna etapp – kylaren på vår bil sprang läck. Vi kunde dock skjutas till högkvarteret för Nechisar National Park där vi fick invänta den andra bilen medan vår bil kördes till en verkstad. Under väntetiden såg vi bl.a. en *Violet-backed Starling*. Den lyste så röd i kvällssolen att vi först inte riktigt fattade vad det var för fågel. Så småningom togs vi till lägret som stod uppställt i mycket högstammig skog invid en liten flod i vilken några i gruppen tog sig ett kvällsdopp.

19/1. Redan vid resans inledning hade Håkan sagt att det inte var någon idé att åka in till Nechisar Plains – vägen dit var alldeles för dålig. Istället tillbringade vi några morgontimmar kring lägret och gjorde sedan en båtfärd på Lake Chamo innan vi fortsatte mot söder och Yabello.

Fågellivet kring lägret var dock en besvikelse. Vi noterade ett par *African Harrier-Hawks* vid bo, fyra *Broad-billed Rollers*, 10 + *Silvery-Cheeked Hornbills*, fem *Scaly-throated Honeyguides* och en *Nubian Woodpecker* och just inget mer.

Desto större upplevelse blev färden på Lake Chamo. Här var huvudmålet de gigantiska krokodilerna som låg på många ställen längs stränderna. Till skillnaden från de i gransjön i norr, Lake Abaya, skulle dessa, enligt Håkan, inte vara så farliga – de tog bara några enstaka fiskare per år.... Förutom *krokodiler* syntes ett flertal *flodhästar*. I viken vid båtläget simmade bl.a. ett 30-tal *Pink-backed Pelicans* men sedan blev det *Great White Pelicans* för hela slanten, uppskattningsvis över 1000 individer. Nya arter för resan blev *Striated* och *Goliath Heron*, *Osprey*, *Senegal Thick-knee*, *Pallas's* och *Lesser Black-backed Gull* samt en sjungande *Common Nightingale*. Tre *Black Herons* sågs också.



Krokodil och Pied Kingfisher

Vid ett kort besök vid en bensinstation hittade vi bl.a. resans första *Bare-faced Go-away-birds*, tre ex., samt en *Double-toothed Barbet*.

Färden fortsatte nu mot söder och ett alltmer intressant fågelliv längs vägen. Nya resarter noterades på löpande band –

Eastern Chanting Goshawk, *Grey Kestrel*, *Pygmy Falcon*, *Vulturine Guineafowl*, *Yellow-necked Spurfowl*, *Buff-crested Bustard*, *Liechtenstein's Sandgrouse*, *D'Arnaud's* och *Red-and-yellow Barbet*, *Rufous Scrub-Robin*, *Mouse-coloured Penduline-Tit*, *Shining Sunbird*, *Rosy-patched Bush-Shrike* samt *Golden-breasted*, *Shelley's* och *Magpie Starling*. Att notera är att observationen av *Rufous Scrub-Robin*, resans enda, gjordes i samma område som där Avifauna såg ett ex. några år tidigare samt att *Vulturine Guineafowls* nästan bara sågs på denna dagsetapp. Antalet var dock rejält – över hundra ex. fördelade på flera flockar. 14 *Magpie Starlings* var också ett bra antal av denna ganska svåra art.

Kring vår lägerplats uppe i juniper-skogen i Yabello spelade minst tre *African Scops Owls*.

20/1. Denna dag, som helt ägnades området söder och öster om Yabello, blev mycket givande. Vi inledde med att leta efter *Stresemann's Bush-Crow* och *White-tailed Swallow*, som inte bara är endemiska för Etiopien utan också har ett synnerligen begränsat utbredningsområde inom landet. Vi fann ganska enkelt minst tio ex. av den förstnämnda arten och med lite större svårighet ett eller möjligen två ex av svalan som snurrade runt kring en liten by en bit från ”stora” vägen. I samma område fanns även *Ethiopian* och *Lesser Striped Swallows* samt *Shelley's Rufous Sparrows* och i närheten *Black-shouldered Kite*, *Foxy Lark*, *White-browed Scrub-Robin*, *African Grey Flycatcher*, *Spotted Palm-Thrush*, *Red-faced Crombec*, *Northern Grey Tit*, *White-crowned Starling* samt *Grey-headed* och *Black-capped Social Weaver*. Längs vägen noterades resans enda *Lesser Spotted Eagle*. Vid lunchstoppet i en dal mellan rätt höga berg söder om Yabello sågs ytterligare en rad fina arter som *Black-throated Barbet*, *Bearded Woodpecker*, *Banded Parisoma*, *Yellow-breasted Apalis*, *Pygmy Batis*, *Marico Sunbird*, *Brubru*, *Pringle's Puffback*,

Bristle-crowned Starling och *Northern Masked Weaver*. Dagen avslutades med *Gabar Goshawk*, *Temminck's Courser* och *Somali Bunting* i låglandet samt *African Olive Pigeon* i höglandet närmare vårt tältläger. På kvällen spelade en *Montane Nightjar* kring lägret.

21/1. Efter att ha lämnat vårt läger gjorde vi först några korta stopp uppe i höghöjdslogen som bl.a. gav *Lemon Dove*, *Black-headed Batis* och *Lesser Blue-eared Starling*. Vid nästa stopp, ett kort stycke norr om staden Yabello, gjorde vi en timslång vandring ute i bushen och fann bl.a. *Northern Brownbul*, *Sulphur-breasted Bush-Shrike* samt ett par av *Little Weaver*. Vi ställde sedan kosan mot öster och Arero och under den färden noterades bl.a. *White-headed Vulture*, *Alpine Swift*, *Bare-eyed Thrush*, *Rufous Chatterer*, *Vitelline Masked Weaver* och *Black-cheeked Waxbill*. Några hade turen att skymta en *Red-naped Bush-Shrike* i ett stort snår. Ytterligare Streseman's Bush-Crows sågs också.



African Scops Owl

Tältlägret slogs upp i Bobella Forest ovanför staden Arero och innan mörkret föll hann vi med några timmars vandring och skådning i den öppna skogen. Målarten var *Prince Ruspoli's Turaco*, en

annan endem med synnerligen begränsat utbredningsområde, och efter hårt arbete, inte minst från Håkans sida, så hittades två exemplar som vi såg ganska bra. I övrigt syntes två *Common Buzzards* samt ett ex. av vardera *Eurasian Sparrowhawk* och *African Hobby*.

På kvällen blev det stor show av *African Scops Owl* alldeles bakom tälten och med hjälp av starka ficklampor fick vi fina obsar och bilder av den näpna ugglan.



Prince Ruspoli Turaco

22/1. I gryningen hördes en *Donaldson-Smith's Nightjar* från lägret. En morgonvandring i Bobellaskogen gav nya och nu rent orgiastiska obsar av hela sju ex. av *Prince Ruspoli Turaco*. En annan mycket fin art var en *Green-backed Twinspot* som dock bara Björn lyckades få se. Vid ett kort stopp längre in i skogen fann vi en praktfull hanne av *Narina Trogon* samt en *White-breasted Cuckoo-Shrike*. Vi letade också på några platser efter *Salvadori's Seedeater*, men fann bara mängder av släktingen *Reichenow's Seedeater*.

Färden fortsatte nu vidare, först mot öster, sedan mot norr. Vyerna söderut, ned mot Kenya, var stundtals vidunderliga. Etappens fågel nr. 1 blev en *Red-naped Bush-Shrike* som nu alla fick se fint i samband med en kortare vandring. I samma område hittades även en hona av *Red-shouldered Cuckoo-Shrike*. Andra nya arter längs vägen var *African Hawk Eagle*, *Mosque Swallow*, *Northern Crombec*, *Hunter's Sunbird*, *Dwarf Raven* och *Straw-*

tailed Whydah. Ytterligare två *White-tailed Swallows* upptäcktes. Ett stopp vid den lilla byn strax norr om bron över Dawa River producerade ca tio ex av *African White-winged Dove*, en art som har sin västligaste kända förekomst just här.

Dagen avslutades med en lång vandring över stäppen på Liben Plains. Målarten var endemen *Sidamo Lark* och den blev en lång vandring och en rafflande kamp mot skymningen innan vi lyckades hänga in den lilla charmiga lärkan. I området fanns det betydligt fler ex. av en annan endem, *Somali Short-toed Lark*, samt en *Flappet Lark* och över 30 *Black-winged Plovers*. Tack vare de fina obsarna av Sidamolärkan blev våra steg lätta vid den långa vandringen tillbaka mot bilarna.

Vi tog in på ett mindre hotell i staden Negelle och åt en frugal middag på en restaurang i närheten.

23/1. Denna dag förflyttade vi oss vidare norrut, till Hareenna Forest, där vi åter tältade. Ett första stopp med en kortare vandring gav bl.a *Grey-headed Kingfisher*, *Black Scimitarbill* och *Mouse-coloured Penduline-Tit*. Vid det andra stoppet, vid en liten flod, hittades sensationellt två hannar och en hona av *Yuba Weaver*, en art som tidigare i stort sett bara varit känd att förekomma längs Yuba River i Somalia. På platsen fanns även en rejäl flock av *Crimson-rumped Waxbills*, ett par *Abyssinian Ground-hornbills* samt en överflygande *Peregrine Falcon*. Av andra rovfåglar såg vi *White-headed Vulture*, *Brown Snake-Eagle* och *Mountain Buzzard* utefter vägen.

Längs vägen in genom Hareenna Forest sågs en *Chestnut-naped Francolin* samt två *Abyssinian Crimsonwings* från den ena bilen. En kvällsvandring gav bl.a. tre ropande *Red-chested Cuckoos*, en dito *African Emerald Cuckoo*, minst fem *Abyssinian Catbirds* samt ett femtiotal *Yellow-bellied Waxbills*.

24/1. Hareenna Forest var litet av en besvikelse och det blev bara två ytterligare

reskryss under vår morgonvandring – *Black Cuckoo-Shrike*, en hanne, samt *Brown Woodland Warbler*.

Desto bättre blev det uppe på höghöjdsplatån (vi var som mest uppe på över 4000 meters höjd) Senetti Plains. Vädet var som vanligt under resan soligt och fint och i stort sett alla förväntade höghöjdsarter kunde hittas – *Wattled Ibis*, *Blue-winged Goose*, *Ruddy Shelduck*, *Wattled Crane* (ett par invid vägen, möjligen häckande), *Thekla Lark*, *Moorland Chat*, *Groundscraper Thrush*, *Red-billed Chough* och *Black-headed Siskin*. Vi kikade noga på över tio örnar utan att hitta någon *Golden Eagle* – de var alla *Steppe Eagle's*, tyvärr. Plåster på rovfågelsåren fick bli ett par *Lanners* som hade fina flyguppvisningar.



Moorland Chat


Fåglarna till trots var dagen höjdpunkt våra sammanlagt fyra *Ethiopian Wolves*, världens mest sällsynta och mest hotade hunddjur. Vid en liten fältforskningsstation träffade vi den unga holländskans Freja som nu var inne på sitt tredje år av studier av vargarna. Hon hade bl.a. att berätta det sorgliga att under en kort tidsperiod så hade en tredjedel av vargarna, ca hundra djur, dött av rabies som de fått av hundar som olagligt invandrade människor haft med sig. Det totala antalet djur överstiger därför idag knappast 300 i hela Etiopien.

(en mindre stam finns i Simien Mountains längre åt norr).

Vi tog oss nu ned från bergen och begav oss österut över stora jordbruksslätter. Trots att vägen skulle var en huvudväg var den ovanligt usel och det tog flera timmar att komma till vår nästa lägerplats i en ravin vid Sof Omar. Längs vägen såg vi oväntat en *Lammergeier*, en art som vi borde ha sett, men missat uppe på Senneti Plains. Här fann vi också ca 30 *White Storks*, resans första *Egyptian Vulture*, en flock om ca 30 *Lesser Kestrels*, ca 20 *Nyanza Swifts* samt några *African Stonechats* och ett tiotal *Northern Red Bishops*.

I Sof Omar, dit vi anlände rätt sent, syntes och hördes en *Pearl-Spotted Owlet* vid tätlägrät och senare på kvällen visslade även en *African Scops Owl* här.

25/1. Morgontimmarna tillbringades i och kring ravinen vid Sof Omar, tyvärr utan kontakt med målarten *Salvadori's Serin*, en av resans få missar. Vi hittade däremot ett bo av *African Hawk Eagle* samt såg *Brown-tailed Rock Chat*, *Grey Wren-Warbler*, *Grey-headed Bush-Shrike* och *Bristle-crowned Starling*. Och så gick ett stort gäng *Hamadryas*, ökenbabianer, över vägen.



Babianträngsel

Vi for nu tillbaka mot väster till Dinsho där vi inkvarterade oss i ett enkelt hus strax innanför gränsen till Bale National Park. Ett tidigare hus på samma plats hade för ett antal år sedan av våda bränts ned av en svensk botanist, varefter ett nytt likadant hus byggts upp med SIDA-pengar.

En av guiderna på platsen tog oss tämligen omgående ut på en vandring i den omgivande höghöjdsskogen (vi befann oss på ca 3000 meters höjd) vid vilken vi fick se ett par *African Wood Owls*, fyra juvenila *Abyssinian Long-eared Owls* samt ett stort antal praktfulla *Mountain Nyalas*. En sen eftermiddagstur längs vägen västerut från Dinsho innebar att flera höghöjdsarter som föredrar öppet landskap kunde adderas till listan – *Chestnut-naped* och *Moorland Francolin*, *Rouget's Rail*, *Spot-breasted Plover*, *Abyssinian Longclaw*, *Red-breasted Wheatear* och *Cinnamon Bracken Warbler*. Vi såg också en *Serval*, flera *Spotted Hyenas* samt ett antal av *Common Warthog*, *Menelik's Bushbuck* och *Bohor Reedbuck*.


26/1. Det blev en smält kylig natt i det uppvärmda gästhuset och på morgonen kunde vi notera att det var frost på gräset utanför. Temperaturen steg dock snabbt under vår morgonvandring i den kringliggande skogen. Alldeles bakom utetoaletten fanns såväl *Abyssinian Ground Thrush* som *Rüppel's Robin Chat* och en bit ner i sluttningen hittade vi målarten *White-backed Black Tit* i minst fem exemplar. Resans enda *Spotted Flycatcher* (= Grå flug.) noterades också.

Vi begav oss nu åter ned till det öppna landskapet väster om Dinsho. På och kring vägen drog stora strömmar av människor, en del med åsnekärror, mot staden – det var marknadsdag. Vi skådade en dryg timme kring en liten bäck där *African Black Duck* var främsta målart. Ett par hängdes snabbt in. Kring bäcken fick vi också se bl.a. *African Snipe*, ett större antal *Red-throated Pipits*, *Tawny-flanked Prinia* (första fyndet på resan av denna i Afrika och Etiopien annars så talrika art!), *Slender-billed Starling* och *Yellow Bishop*.

Före lunch besökte vi den synnerligen brokiga marknaden i Dinsho och vi var då de enda vita bland tusentals försäljare och besökare. En färgstark upplevelse i alla avseenden. Självt köpte jag ett mycket

vackert tyg som passade till bordduk vid högtidligare tillfällen.

På eftermiddagen begav vi oss inåt Bale National Park igen. Främsta målart var *Bale Parisoma* som vi till slut fick se, och därtill mycket fint, efter ett verkligt hästarbete, inte minst av Björn. Tubspaning gav över 30 *Steppe Eagles* och ett par *Peregrine Falcons* som bjöd på hisnande flyguppvisningar.



Rouget's Rail

På kvällen hade Håkan till middagen bjudit in några personer från den närbelägna forskningsstationen, bl.a. Freja som vi tidigare mött uppe i bergen. Hon berättade nu att hon i tre år hade bott åtta månader om året i Etiopien och att hon hade varvat den tiden i tiodagarsperioder mellan Dinsho och fältstationen uppe i bergen. Till den sistnämnda platsen fick hon oftast skjuts, men fick ibland gå ca 18 kilometer från 3000 till 4000 meters höjd. Uppe vid fältstationen var det synnerligen primitivt – det fanns t.ex. inga badmöjligheter utan hon kunde på sin höjd tvätta fötterna. Tyvärr var hennes erfarenhet av de infödda medhjälparna mycket dålig – de gjorde minsta möjliga och försökte alltid smita iväg när möjlighet gavs. Under vandringarna ansattes hon också hårt av tiggare bland de människor som olagligt trängt in i parken

och om hon inte gav något så hände det att de kastade hästspilling på henne! Det var uppenbarligen inte lätt att vara ung självständig kvinna i dessa muslimdominerade områden. Om några månader skulle hon i all fall hem för gott till Oxford University där hon var doktorand. Hon hade offrat mycket för sina vargar, bl.a. sin pojkvän som gett henne ultimatum att välja mellan honom och vargarna. En synnerligen tuff och målmedveten tjej!

27/1. På morgonen sågs en *African Goshawk* mycket fint nära gästhuset och strax väster om Dinsho satt ca 25 *Red-rumped Swallows* på trådarna.

Längs vägen mot öster var det rätt klenk med fågel, men en *Lammergeier*, en *African Wattled Plover*, tre *Black-winged Plovers* samt en *Siberian Stonechat* noterades. Vägen som vi åkte på såg som vanligt kort ut på kartan, men var likaledes som vanligt väldigt tidsödande – delar höll på att byggas om av kineser och det jobbet hade tydligen tagit väldigt lång tid. Kineserna dumpar marknaden med billiga priser, men kvaliteten på arbetet tycks inte vara något vidare. Vår chaufför Brook utgöt sig som vanligt över kineserna och gav därmed uttryck för en växande uppfattning i Afrika att de är en slags nya kolonisatörer. Hur som helst har de snabbt blivit alltmer impopulära – därom finns det många vittnesmål.

Tälten slogs upp i savannen nära Lake Abiata i Rift Valley National Park och något av det första vi fick se var en *Black-chested Snake-Eagle* på bo. En *Slender-tailed Nightjar* kunde ses och fotograferas på närhåll på marken. Vid en kortare vandring på savannen syntes även *Clapperton's Francolin*, *Black Scimitarbill*, *Buff-breasted Warbler* samt två *Greyish Eagle Owls*. Två stenskvättor var misstänkt lika Cyprus Wheatears, men närmare granskning av bilderna efter resan visade att de tyvärr hade en alldeles för lång handpenneprojektion för att kunna tillhöra denna art.



Lesser och Greater Flamingo

28/1. Morgonen tillbringades nere vid sodasjön Lake Abiata, mest känd för att vara den bästa flamingosjön i Etiopien. Och visst fanns det flamingos här – uppskattningsvis 10 000 *Lesser* och 50 *Greater* i de delar vi kunde spana av. Med viss svårighet hittade vi en annan sodasjöspecialitet, en ensam förbiflygande *Cape Teal*, resans första och enda. Ute på sjön låg hundratals *Black-necked Grebes* och *Southern Pochards* samt minst 25 *Northern Phalaropes*. En annan vadare som var ny för resan var *Curlew Sandpiper* som syntes i sju exemplar.

I savannterrängen öster om sjön hittades bl.a. fyra *Kori Bustards*, två par *Chestnut-bellied Sandgrouses* samt två *Southern Grey Shrikes*. En *Golden Jackal* strök förbi.

Efter Abiata for vi söderut och besökte Senkele, ett litet reservat för *Swayne's Hartebeest*. Vi såg ca 60 ex. av dessa djur och därtill sju *Oribis*, en liten gazell. Men huvudskälet att åka hit var inte däggdjuren utan att det här också brukade finnas *African Swallow-tailed Kites*. Och visst fanns de på plats – vi räknade ihop ca tio ex av dessa gracila rovfåglar. I området hittades även en *Pale Flycatcher*.

Nu ställdes kosan mot Lake Awasa där vi sent på eftermiddagen tog in på den norska missionens kursgård. Rent och snyggt som man kunde förvänta sig. Anläggningen låg alldeles ovanför en grund vik som var fylld av papyrus och andra vattenväxter. Här var det också gott om vattenfågel och redan första besöket sent på eftermiddagen gav en av våra målarter *Allen's Gallinule*, jämte t.ex. Dwarf Bittern och Lesser Moorhen en

interafrikansk flyttfågel som nästan bara ses under regntider, d.v.s. när man som fågelskådare inte är på plats. Andra arter i sjökanten var *Black* och *Goliath Heron*, *Saddle-billed Stork*, *African Pygmy-goose*, *Black Crake*, *Purple Swamphen*, *Spotted Redshank* och *African Reed Warbler*. Uppre i kursanläggningens trädgård upptäcktes två *Woodland Kingfishers*.

På kvällen intog vi vår middag på en ganska hyfsad restaurang, men några av oss gjorde misstaget att prova ett inhemskt vin till maten. Det smakade malen bakelit och konkurrerade starkt med systemets gamla skräckmärken Ruby of Crimea och Chevaliers de Rhodes om att vara det sämsta vin jag smakat.



Allen's Gallinule

29/1. Tidigt på morgonen sjöng minst två *White-browed Robin Chats* utanför våra rum. Vi gjorde sedan en kort tur ner till sjökanten där vi såg ungefär samma fåglar som dagen innan plus fem *Pallas's Gulls* samt ett ex. av vardera *Lesser Swamp Warbler* och *European Reed Warbler*.

Därefter gav vi oss ut på den långa färden mot Awash National Park. Vi hann dock med några korta stopp, det första vid bron vid Lake Koka där vi fick se några av de *Red-chested Swallows* som brukar hålla till där. Här fanns även två *Senegal Thicknees*. Längs vägen sågs vidare åtskilliga *flamingos* på flera ställen. Från den ena bilen upptäcktes också en *Western Reef Heron*. Vid ett stort lavafält inte så långt från Awash letade vi *Sombre Rock*

Chat och hittade också minst en fågel efter att ha skärskådat flera *Blackstarts*.

Innan vi körde ned till vårt tältläger vid Awash River gjorde vi en sväng i nationalparken. Det syntes att det hade rått torka länge och det hade uppenbarligen haft en negativ inverkan på fågellivet. Av nya fåglar såg vi bara *White-bellied Bustard*, *Singing Bush Lark*, *Somali Fiscal* (tämmligen allmän) samt *Woodchat Shrike*. Det fanns en del däggdjur – vi räknade ca 20 *Beisa Oryxes*, sex *Soemmering's Gazelles* och åtta *Salt's Dikdiks*.

Vid lägret satt två *Eastern Grey Plantain-eaters* uppe i de höga träden och i skymningen kom minst ett 20-tal *Liechtensteins Sandgrouses* ned till floden för att dricka.

30/1. Tidigt på morgonen startade vi mot Alledoghi Plains som är ett stäppartat jaktreservat ytterligare längre bort längs den stora vägen mot Djibouti. Här brukar gräset normalt vara halvmeterhøgt vid denna tid på året, men p.g.a. torkan fanns det bara ynkliga tussar. Detta hade naturligtvis en negativ inverkan på fågellivet, mest på kvantiteten. De stora mängder lärkor och sparvlärkor som brukar finnas här var som bortblåsta. Vi såg dock ett exemplar av *Black-crowned Sparrow-Lark*, en art som normalt bara finns längre norrut och som jag inte hittat i någon tidigare reserapport. Och de flesta målararter trillade in i alla fall – tre *Arabian Bustards*, åtta *Somali Ostriches*, nio *Black-headed Plovers*, minst tio *African Collared Doves* och flera *Nile Valley Sunbirds*. Dessutom hittade vi två *Tawny Pipits*. Däggdjuren var mycket skygga, men vi såg minst 20 *Beisa Oryxes*, minst tio *Soemmering's Gazelles*, en *Grevy's Zebra* och tre *Golden Jackals*. Längs vägen gick en stor flock om minst 30 *Hamadryas*.

Vi ställde sedan kosan mot Bilen, ett stort papyrusområde omgärdat av torrmarker. På strandängarna fanns stora mängder änder, bl.a. 100 *Garganeys*, 20 *Eurasian Teals* och 100 *Northern Shovelers*. Resans andra *Saddle-billed*

Stork spatserade omkring och en hona av *Plain Nightjar* stöttes. Kring Lubak Lodge syntes en *African Palm Swift*, en *Black-eared Wheatear*, en *Mouse-coloured Penduline-Tit* samt minst tre *Red-faced Warblers*.

På eftermiddagen gjorde vi en ny runda i Awash National Park. Fåglar att särskilt notera var en *African Swallow-tailed Kite* samt fyra *Buff-crested* och en *Hartlaub's Bustard*. Av däggdjur upptäcktes ett ex. av vardera *Lesser Kudu*, *Black-and White Colobus* samt *Side-striped Jackal*.

En mörkertur gav en *Spotted Thickknee* och två *Double-banded Coursers* vid den övergivna landningsbanan några kilometer från lägret.

31/1. En morgonvandring till och ett stycke bortom Awash Falls producerade bl.a. en *Woodland Kingfisher* och en *Greater Honeyguide*.

Vi begav oss sedan ut på en lång och dammig körning på vägar som inte fanns på kartan mot bergen i nordväst. Alldeles i början stod två *White-bellied Bustards* mycket fint nära vägen och sedan noterades bl.a. två *Pearl-spotted Owlets*, två *Desert Larks*, 15 *Black-crowned Sparrow-Larks* (som uppenbarligen gillar när det är riktigt torrt) och en *Nile Valley Sunbird*. Vid vårt lunchstopp hittade vi två *Eastern Orphean Warblers* i en stor dunge.



Nile Valley Sunbird

Vid Melka Gebdo, ett stycke upp på bergens sluttning, fanns det inte mycket plats för tälten utan här lades en stor presenning på marken och på dem rader av madrasser. Här, som på flera andra platser, förstärktes trossen av några smågrabbar som tjänade en liten slant genom att bl.a. hjälpa till att diska. Två *Grey Kestrels* jagade kring lägerplatsen och vid en kvällsvandring inhängdes snabbt platsens målart nr. 1, endemen *Yellow-throated Seed-eater* i minst tio exemplar. Vi såg då också *Short-toed Eagle*, *Klaas's Cuckoo*, *Yellow-breasted Barbet*, *Mocking Cliff-Chat* och *Little Weaver*.

1/2. På morgonen sågs bl.a. två *Black Storks*, en *Giant Kingfisher* och fem hannar samt flera honor av *Northern Red Bishop* kring Melka Gebdo. Vi fortsatte sedan uppåt bergen med flera stopp längs vägen. *Lammergeier*, *Verraux's Eagle*, *Lanner Falcon*, *Rufous-breasted Sparrowhawk*, *African Olive Pigeon*, *Erlanger's Lark*, *Long-billed Pipit*, *Rüppel's Black Chat*, *Little Rock Thrush* och *Abyssinian Waxbill* noterades.



Lammergeier

Vid en soptipp utanför Debre Birhan huserade bl.a. minst ett halvdussin *Lammergeiers* samt en *Lappet-faced Vulture* och gav utomordentliga tillfällen till verkliga närobsar. På vägen mot Ankober såg vi våra första *Geladas*, de märkliga gräsätande babianerna.

Den hisnande klyftan vid Ankober badade i solsken och därmed blev det mycket lätt att hitta de endemiska *Ankober*

Serins som vi såg i över tio exemplar. Här fanns också ett par *White-billed Starlings* samt ytterligare *Geladas* och en *Klipspringer*. En subadult *Eastern Imperial Eagle* gled över och en *Peregrine Falcon* susade förbi.

2/2. Efter övernattnings på ett hotell i Debre Birhan gav vi oss iväg mot nordväst och Jemma Valley. Längs vägen syntes flera flockar av *Common Cranes*, två *Hemprich's Hornbills* och en *Rüppel's Vulture*. Vi hade haft dåligt med cisticolas dittills under resan, antagligen för att varken de eller några andra tättingar visade någon större sångaktivitet. Nu kryssade vi dock både *Pectoral Patch* och *Singing Cisticola*.

Vi gjorde stopp för lunch och skådning vid branten ovanför Jemma Valley och här var det en makalös utsikt av nästan Grand Canyon-karaktär nedemot dalen. Fyra *Erckel's Francolins* och ett större antal *Rüppel's Black Chats* sågs fint, men det var bara Håkan och Roger som fick se *White-winged Cliff Chat*. Uppe på högplatån såg vi resans enda *Stone Curlew*.

På vägen ner i Jemma Valley stannade vi vid "Fox Kestrel Rock" och mycket riktigt såg vi en *Fox Kestrel* här i närheten och sedan ytterligare en längre ned i dalen. Sedan hittade vi också *Woodchat Shrike*, *Bush Petronia*, *Black-winged Red Bishop*, *Speckle-fronted Weaver* och *White-billed Starling*. Lägre slogs upp i en liten dunge alldeles intill en by vilket borgade för att vi hela tiden hade en nyfiken publik omkring oss. Tittade på oss gjorde också en *Verraux's Eagle Owl* som satt i ett högt träd ovanför våra tält. En kort kvällsvandring ned mot ett mindre tillflöde till Jemma River gav *Vinaceous Dove*, *European Turtle Dove*, *Great Reed Warbler*, *Red-faced Cisticola* (som vi missat vid Lake Awasi och sedan trott var körd) samt en flock om minst 15 *Abyssinian Waxbills*.

3/2. Jemma är en biflod till Nilen och detta är säkert orsaken till att dess dalgång

verkar vara en helgolandsryssja för fåglar som följt floddalen söderut. Här kan uppenbarligen vad som helst dyka upp och dagen bjöd därför på ett antal trevliga överraskningar.

Innan vi började leta udda arter begav vi oss i gryningen till en plats där *Harwood's Francolin* skulle finnas. Efter kontakt med folk på platsen fick vi dock veta att frankolinerna inte var kvar här längre, men väl på en plats någon kilometer bort. Med ett antal villiga vägvisare förflyttade vi oss dit och fick fina obsar av minst fem individer. Samtidigt hittade vi säkert det dubbla antalet *Erckel's Francolins*. *Ortolan Bunting* noterades också i området och så fick alla i gruppen äntligen se *White-winged Cliff Chat* som varit ovanligt svårfångad dittills. I samma område fanns vidare ett tiotal *White-billed Starlings* och på en annan plats sågs ungefär lika många av dess nära släkting *Slender-billed Starling*. Ett stopp vid Fox Kestrel Rock gav en flock om minst 20 *Red-collared Widowbirds*, alla dock tyvärr i icke-häckningsdräkt.



White-billed Starling

Vi begav oss nu ned mot en wadi på andra sidan floden. Målarten var *Red-billed Pytilia* och vi hittade tämligen lätt ett par av denna svåra art. Här fanns bl.a. också *African Silverbill* och *Red-billed Quelea*, den senare kanske Afrikas talrikaste fågel som dock förvånansvärt nog dittills mycket skickligt hållit sig utom synhåll från våra ögon.

En vandring under eftermiddagen längs den lilla bifloden gav resans första och enda *Purple Heron*, *Woolly-necked Stork*, *Barbary Falcon* och *Common Snipe*. Två *Fox Kestrels*, fyra *Black-headed Plovers* och en *African Pygmy Kingfisher* noterades också.

4/2. Nu hade vi kommit fram till resans sista dag. På morgonen gjorde vi en tur ned till flodbädden där bl.a. en *Wahlbergs Eagle* kunde ses länge och på närhåll i ett träd. Här fanns också kungsfiskare av fyra arter, bl.a. två *African Pygmy* och tre *Grey-headed Kingfishers*, samt några *Sedge Warblers*. De flesta i gruppen gjorde därefter ett besök i den närbelägna byn och fick en god inblick i levnadsförhållandena där. När de återvände till lägret upptäcktes en *Masked Shrike*, en fin hanne. På vägen ut ur dalen sågs tre *Hemprich's Hornbills* och en stor flock av *European Crag Martins*.

Längs vägen över högslätten mot Addis noterade vi bl.a. ett tiotal av vardera *White-backed* och *Rüppel's Vultures* samt ett 50-tal *Black-winged Plovers*. Sululta Plains var dock helt uttorkade och därmed tomma på fågel.

Vi åt resan bästa lunch på en liten restaurang i Addis och gjorde sedan en avslutande sväng söderut till Debre Zeyt. Vid den stora grunda sjön, som vi tyvärr bara besökte helt kort, fanns det framför allt mängder av stora fåglar. Säkert över 1000 *Marabou Storks* är i särklass den största mängd jag själv sett och de sekunderades av minst 200 *Common Cranes*, 20 *Great White Pelicans*, 10 *Black-headed Herons* samt 10 *Greater* och 30 *Lesser Flamingos*. På plats fanns även 200 *Black-tailed Godwits*.

Vi avslutade dagen och skådningen på resan vid den mindre kratersjön i närheten. Där fick vi äntligen se minst fyra *Maccoa Ducks* samt en *Tufted Duck*. Den totala artlistan kunde därmed fastställas till 504 arter.

Artlista Fåglar

Namn och ordningsföljd enligt Redman-Stevensson-Fanshawe. Birds of the Horn of Africa. London 2009.

1. *Somali Ostrich*. Alledoghi Plains åtta ex.
2. *Great White Pelican*. Ca 1200 ex. Noterad åtta dagar.
3. *Pink-backed Pelican*. Ca 50 ex. Noterad fem dagar.
4. *Little Grebe*. Noterad sju dagar.
5. *Black-necked Grebe*. Lake Abiata 100+ex.
6. *Great Cormorant*. Ca 50 ex. Noterad fem dagar
7. *Long-tailed Cormorant*. Ca 40 ex. Noterad sju dagar.
8. *African Darter*. Ca 15 ex. Noterad fyra dagar
9. *Black-crowned Night Heron*. Nära Lake Bojo sju ex.
10. *Cattle Egret*. Allmän. Noterad 11 dagar
11. *Squacco Heron*. Ca 50ex. Noterad tio dagar.
12. *Striated Heron*. Lake Chamo ett ex.
13. *Little Egret*. Ca 50 ex.. Noterad åtta dagar.
14. *Western Reef Egret*. Damm nära Awash NP ett ex.
15. *Black Heron*. Lake Ziway ett ex, Lake Chamo tre ex, Lake Awasa ett ex.
16. *Great Egret*. Ca 50 ex. Noterad åtta dagar.
17. *Yellow-billed Egret*. Fem ex. Noterad fyra dagar
18. *Goliath Heron*. Lake Chamo 10 + ex., Lake Awasa ett ex., Awash River ett ex.
19. *Purple Heron*. Jemma Valley ett ex.
20. *Grey Heron*. Ca 25 ex. Noterad 11 dagar.
21. *Black-headed Heron*. Ca 20 ex., flest vid Debre Zeyt. Noterad fem dagar.
22. *Hamerkop*. Tämligen allmän. Noterad 11 dagar.
23. *White Stork*. Ca 80 ex. Noterad fyra dagar.
24. *Yellow-billed Stork*. Ca 130 ex. Noterad åtta dagar.
25. *Black Stork*. Melka Gebdo två ex., Jemma Valley ett ex.
26. *Abdim`s Stork*. Rift Valley fyra ex., Nechisar-Yabello fem ex.
27. *Wooly-necked Stork*. Jemma Valley två ex.
28. *Saddle-billed Stork*. Lake Awasa ett ex., Bilen ett ex.
29. *Marabou Stork*. Allmän, med som flest 1000 + ex., vid Debre Zeyt. Noterad 11 dagar.
30. *Sacred Ibis*. Allmän. Noterad 11 dagar.
31. *Hadada Ibis*. Ca 15 ex. Noterad sju dagar.
32. *Glossy Ibis*. Ca 100 ex. Noterad åtta dagar.
33. *Wattled Ibis E*. Allmän i höglandet. Noterad nio dagar.
34. *African Spoonbill*. Ca 150 ex. Noterad sju dagar.
35. *Greater Flamingo*. Ca 90 ex. Noterad sex dagar.
36. *Lesser Flamingo*. Allmän i vissa sjöar, som flest, 10 000 + i Lake Abiata. Noterad sex dagar.
37. *Spur-winged Goose*. Ca 50 ex., som flest, ca 40 ex., vid Debre Zeyt. Noterad fem dagar.
38. *Egyptian Goose*. Tämligen allmän. Noterad elva dagar.
39. *Blue-winged Goose E*. Allmän i höglandet. Ca 200 ex.. Noterad sju dagar.
40. *Knob-billed Duck*. Lake Bojo tre ex.
41. *White-faced Whistling Duck*. Ca 175 ex. Noterad sex dagar.
42. *Fulvous Whistling Duck*. Ca 220 ex. Noterad fyra dagar.
43. *African Pygmy-goose*. Lake Ziway två par, Lake Awasa ett par.
44. *Ruddy Shelduck*. Senetti Plains ca tio ex..
45. *Red-billed Duck*. Lake Bojo ca 10 ex.

46. *Hottentot Teal*. Ca 40 ex. Noterad fyra dagar.
47. *Cape Teal*. Lake Abiata ett ex.
48. *White-backed Duck*. Lake Bojo tre ex., Lake Awasa ca 15 ex.
49. *Maccoa Duck*. Debre Zeyt fyra ex.
50. *Yellow-billed Duck*. Ca 90 ex. Noterad sex dagar.
51. *African Black Duck*. Bale NP ett par.
52. *Northern Shoveler*. Ca 250 ex. Noterad tio dagar.
53. *Northern Pintail*. Ca 50 ex. Noterad tre dagar.
54. *Eurasian Teal*. Ca 30 ex. Noterad två dagar.
55. *Garganey*. Ca 120 ex, flest, ca 100 ex., vid Bilen. Noterad fem dagar.
56. *Eurasian Wigeon*. Bilen ca 10 ex.
57. *Southern Pochard*. Ca 100 ex, flest vid Lake Abiata, Noterad tre dagar.
58. *Tufted Duck*. Debre Zeyt en hona.
59. *Black Kite*. Ca 10 ex, alla i norr, bestämdes definitivt till denna art.
60. *Yellow-billed Kite*. Allmän i stort sett överallt. Noterad 19 dagar.
61. *Black-shouldered Kite*. Ca sex ex. Noterad fem dagar.
62. *African Swallow-tailed Kite*. Senkele ca tio ex., Awash NP ett ex.
63. *African Fish-Eagle*. Allmän nära vatten. Noterad åtta dagar.
64. *Osprey*. Lake Chamo ett ex.
65. *Lammergeier*. Senetti Plains- Sof Omar ett ex., Bale NP-Lake Abiata ett ex., Debre Birhan 12 ex. , Debre Birhan - Jemma Valley ett ex.
66. *Egyptian Vulture*. Ca 10 ex, flest i nordost kring Awash NP. Noterad fem dagar.
67. *Hooded Vulture*. Allmän i stort sett överallt. Noterad 17 dagar.
68. *White-headed Vulture*. Tre ex. Noterad tre dagar.
69. *Lappet-faced Vulture*. Två ex. Noterad två dagar.
70. *White-backed Vulture*. Tämmligen allmän. Noterad 16 dagar.
71. *Rüppel's Vulture*. 14 ex, flest, ca tio ex., Jemma valley – Addis Ababa. Noterad fem dagar.
72. *Black-chested Snake-Eagle*. Lake Abiata ett par på bo.
73. *Short-toed Snake-Eagle*. Melka Gebdo ett ex.
74. *Brown Snake-Eagle*. Ca tio ex. Noterad sex dagar.
75. *Western Marsh Harrier*. Ca tio ex., flest i Rift Valley. Noterad sju dagar.
76. *Montagu's Harrier*. Ca fem ex. säkert bestämda plus många stängshökar. Noterad fyra dagar.
77. *Pallid Harrier*. Ca 15 ex. säkert bestämda plus många stängshökar. Noterad tio dagar.
78. *Eastern Chanting Goshawk*. Ca 20 ex., alla i söder. Noterad sju dagar.
79. *Dark Chanting Goshawk*. Ca 30 ex., alla från Rift Valley och norrut. Noterad tio dagar.
80. *Gabar Goshawk*. Tre ex. Noterad tre dagar.
81. *Shikra*. Fyra ex. Noterad fyra dagar.
82. *Eurasian Sparrowhawk*. Bobella Forest ett ex.
83. *African Goshawk*. Bale NP ett ex.
84. *Rufous-breasted Sparrowhawk*. Tre ex. Noterad två dagar.
85. *Great Sparrowhawk*. Två ex. Noterad två dagar.
86. *African Harrier-Hawk*. Åtta ex., varav ett par vid bo i Nechisar NP. Noterad sju dagar.



Steppe Eagle vs Augur Buzzard

87. *Augur Buzzard*. Ca 60 ex.. Noterad 14 dagar.
 88. *Mountain Buzzard*. Sennetti Plains två ex .
 89. *Common Buzzard*. Tre ex. Noterad två dagar.
 90. *Long-legged Buzzard*. Rift Valley s. Addis Ababa ett ex.
 91. *Lesser Spotted Eagle*. Yabello ett ex.
 92. *Eastern Imperial Eagle*. Ankober ett ex., Jemma Valley ett ex., Jemma Valley -Addis Ababa ett ex.
 93. *Tawny Eagle*. Ca 30 ex., i huvudsak på lägre höjder. Noterad nio dagar.
 94. *Steppe Eagle*. Ca 70 ex, i huvudsak på högre höjder. Noterad tio dagar.
 95. *Wahlberg's Eagle*. Tre ex. Noterad tre dagar.
 96. *African Hawk-Eagle*. Arero-Negelle ett ex., Sof Omar ett par med bo.

97. *Booted Eagle*. Addis Ababa ett ex, Addis Ababa-Wendo Genet ett ex., Nechisar – Yabello ett ex.
 98. *Bateleur*. Åtta ex. Noterad fem dagar.
 99. *Long-crested Eagle*. Nio ex., samtliga i söder. Noterad fyra dagar.
 100. *Verreaux's Eagle*. Melka Gebdo- Debre Dirhan ett ex..
 101. *Common Kestrel*. Allmän. Noterad 19 dagar.
 102. *Lesser Kestrel*. Vägen mot Sof Omar ca. 30 ex. i en flock.
 103. *Fox Kestrel*. Jemma Valley fem ex. Noterad tre dagar där.
 104. *Grey Kestrel*. Fyra ex., bl.a. ett par vid Melka Gebdo. Noterad tre dagar
 105. *Pygmy Falcon*. 14 ex, alla utom ett ex i söder. Noterad fem dagar.
 106. *African Hobby*. Bobella Forest ett ex.
 107. *Eurasian Hobby*. Lake Awasa ett ex.
 108. *Lanner Falcon*. Sju ex. Noterad sex dagar.
 109. *Peregrine Falcon*. Nio ex. Noterad sex dagar.
 110. *Barbary Falcon*. Jemma Valley ett ex.
 111. *Helmeted Guineafowl*. Ca 250 ex. Noterad sex dagar.
 112. *Vulturine Guineafowl*. Nechisar -Yabello 100 + ex, Arero-Negelle nio ex.
 113. *Crested Francolin*. Ca 45 ex. Noterad 11 dagar.
 114. *Harwood's Francolin E.* Jemma Valley 5+ ex..
 115. *Erckel's Francolin NE.* Jemma Valley med omgivningar ca 15 ex. Noterad fyra dagar.
 116. *Chestnut-naped Francolin E.* Högländet kring Bale NP ca 25 ex. Noterad fyra dagar.
 117. *Moorland Francolin*. Dinsho fem ex.
 118. *Clapperton's Francolin*. Ca 20 ex. Noterad fyra dagar.
 119. *Yellow-necked Spurfowl*. Sju ex. i söder. Noterad tre dagar.
 120. *Black Crake*. Lake Awasa fyra ex, Jemma Valley ett ex.
 121. *Purple Swamphen*. Lake Awasa fyra adulta plus några pulli.
 122. *Allen's Gallinule*. Lake Awasa två ex.
 123. *Rouget's Rail E.* Dinsho allmän. Noterad tre dagar.
 124. *Red-knobbed Coot*. Allmän i vegetationsrika sjöar. Noterad sju dagar.
 125. *Common Moorhen*. Ca 30 ex. Noterad fyra dagar.
 126. *Black Crowned Crane*. Addis Ababa - Wendo Genet två ex, Lake Bojo sex ex.
 127. *Wattled Crane*. Lake Bojo 76 ex, Senneti Plains ett par nära vägen.

128. *Common Crane*. Lake Bojo 150 ex, Debre Birhan - Jemma Valley 100 ex, Debre Zeyt 200 + ex.
129. *Kori Bustard*. Lake Abiata fyra ex.
130. *Arabian Bustard*. Alleghedi Plains tre ex.
131. *Buff-crested Bustard*. 12 ex. Noterad tre dagar.
132. *White-bellied Bustard*. Awash NP ett ex., Awash -Melka Gebdo ett par.
133. *Black-bellied Bustard*. Lake Bojo - Nechisar sex ex.
134. *Hartlaub's Bustard*. Awash NP en hona.
135. *African Jacana*. Tämligen allmän. Noterad åtta dagar.
136. *Lesser Jacana*. Lake Ziway två ex., Lake Bojo ett ex.
137. *Red-necked Phalarope*. Lake Abiata 25 + ex.
138. *Black-winged Stilt*. Relativt allmän. Noterad nio dagar.
139. *Pied Avocet*. Lake Bojo ett ex., Lake Abiata tio ex, nära Awash NP ett ex, Debre Zeyt fem ex.
140. *Spotted Thick-knee*. Awash NP ett ex..
141. *Senegal Thick-knee*. Fem ex. Noterad tre dagar.
142. *Stone-curlew*. Ovanför Jemma Valley ett ex.
143. *Temminck's Courser*. Yabello två ex.
144. *Double-banded Courser*. Awash NP två ex.
145. *Kittlitz's Plover*. Lake Bojo 100 + ex., Lake Chamo ett ex., Lake Abiata 30 + ex.
146. *Three-banded Plover*. 15 ex. Noterad sex dagar.
147. *Common Ringed Plover*. Sex ex. Noterad fyra dagar.
148. *Little Ringed Plover*. 22 ex. Noterad åtta dagar.
149. *Spur-winged Plover*. Allmän. Noterad 12 dagar.
150. *African Wattled Plover*. Dinsho-Lake Abiata ett ex.
151. *Spot-breasted Plover*. E. Dinsho ca 75 ex. Noterad tre dagar.
152. *Black-headed Plover*. Alledoghi Plains nio ex., Jemma Valley fyra ex.
153. *Crowned Plover*. 15 ex, av vilka 14 i söder. Noterad fem dagar.
154. *Black-winged Plover*. Liben Plains 30 + ex., Dinsho - Lake Abiata tre ex., Sululta Plains 50 + ex.
155. *Ruff*. Allmän, bl.a. 1000 + ex. vid Lake Bojo. Noterad 11 dagar.
156. *Common Sandpiper*. Tämligen allmän. Noterad 13 dagar.
157. *Wood Sandpiper*. Tämligen allmän. Noterad 12 dagar.
158. *Green Sandpiper*. Ca 40 ex. Noterad 12 dagar.
159. *Common Greenshank*. Fem ex. Noterad fem dagar.
160. *Marsh Sandpiper*. Tämligen allmän. Noterad åtta dagar.
161. *Spotted Redshank*. Lake Awasa ett ex.
162. *Little Stint*. Tämligen allmän. Noterad sju dagar.
163. *Temminck's Stint*. 20 ex. Noterad sex dagar.
164. *Curlew Sandpiper*. Lake Abiata sju ex.
165. *Black-tailed Godwit*. Ca 250 ex, varav ca 200 ex. vid Debre Zeyt. Noterad fem dagar.
166. *Common Snipe*. Jemma Valley fyra ex.
167. *African Snipe*. Lake Bojo sex ex., Dinsho area ett ex.
168. *Grey-headed Gull*. 40 ex. Noterad fyra dagar.
169. *Black-headed Gull*. Ca 15 ex. Noterad två dagar i Rift Valley-sjöar.
170. *Lesser Black-backed Gull*. Lake Chamo tre ex., Lake Awasa ett ex.
171. *Pallas's Gull*. Lake Chamo ett ex, Lake Awasa fem. ex.
172. *Gull-billed Tern*. Lake Bojo 20 ex., Lake Chamo ett ex, Lake Awasa ett ex.
173. *White-winged Tern*. Ca 140 ex. Noterad fem dagar i Rift Valley-sjöar.
174. *Whiskered Tern*. Ca 60 ex. Noterad tre dagar i Rift Valley-sjöar.

175. *Chestnut-bellied Sandgrouse*. Ca 30 ex., varav ca 25 ex. i flock vid första stoppet Addis Ababa- Wendo Genet. Noterad tre dagar.
176. *Liechtenstein's Sandgrouse*. Ca 85 ex. Noterad fyra dagar.
177. *Bruce's Green Pigeon*. Ca 25 ex. Noterad sju dagar.
178. *Speckled Pigeon*. Allmän. Noterad 20 dagar.
179. *White-collared Pigeon*. E. Tämligen allmän i höglandet. Noterad nio dagar.
180. *African Olive Pigeon*. Tämligen allmän i höglandet. Noterad fyra dagar.
181. *Rock Dove*. Tämligen allmän (men inte så allmän som på många andra håll i världen) i anslutning till bebyggelse. Noterad sex dagar.
182. *Emerald-spotted Wood Dove*. Noterad fem dagar, oftast bara hörd.
183. *Blue-spotted Wood Dove*. Noterad fyra dagar, oftast bara hörd.
184. *Tambourine Dove*. Noterad sju dagar, oftast bara hörd.
185. *Namaqua Dove*. Allmän. Noterad 13 dagar.
186. *Ring-necked (Cape Turtle) Dove*. Allmän. Noterad 12 dagar.
187. *African Collared Dove*. Alledoghi Plains 10 + ex., Awash-Melka Gebdo fem ex.
188. *Red-eyed Dove*. Allmän. Noterad 19 dagar.
189. *African Mourning Dove*. Allmän. Noterad 13 dagar.
190. *Vinaceous Dove*. Jemma Valley allmän. Noterad tre dagar.
191. *African White-winged Dove*. NE. Dawa River tio ex.
192. *Laughing Dove*. Allmän. Noterad 19 dagar.
193. *Dusky Turtle Dove*. Tämligen allmän. Noterad tio dagar.
194. *European Turtle Dove*. Jemma Valley 10 + ex.
195. *Lemon Dove*. Yabello, höghöjdssocken två ex.
196. *African Orange-bellied Parrot*. Tämligen allmän, framför allt i söder. Noterad sju dagar.
197. *Yellow-fronted Parrot* E. Wendo Genet fem ex.
198. *Black-winged Lovebird* E. Ca 25 ex. Noterad fem dagar.
199. *White-cheeked Turaco*. NE. Ca 15 ex, varav ca tio ex vid Wendo Genet. Noterad fyra dagar.
200. *Prince Ruspoli's Turaco* E. Bobella Forest minst sju ex.
201. *White-bellied Go-away-bird*. Allmän. Noterad 13 dagar.
202. *Bare-faced Go-away-bird*. 11 ex. Noterad fem dagar.
203. *Eastern Grey Plantain-eater*. Awash NP två ex vid vår camp.
204. *Red-chested Cuckoo*. Haremma Forest tre ex. hörda.



African Wood Owl

205. *Klaas's Cuckoo*. Nechisar ett ex., Melka Gebdo två ex.
206. *African Emerald Cuckoo*. Wendo Genet ett ex., Haremma Forest ett ex.
207. *White-browed Coucal*. 11 ex. Noterad sex dagar.
208. *Blue-headed Coucal*. Sex ex. Noterad sex dagar.
209. *Abyssinian Owl* E. Bale NP två juv.
210. *African Wood Owl*. Nechisar en hörd, Haremma Forest en hörd, Bale NP två ex. sedda.
211. *African Scops Owl*. 12 ex hörda och minst ett ex sett. Noterad nio dagar.
212. *Northern White-faced Owl*. Lake Bojo två ex spelande alldeles invid våra tält.
213. *Pearl-spotted Owlet*. Tre ex. sedda och två hörda. Noterad fem dagar.
214. *Greyish Eagle-Owl*. Lake Abiata ett par sedda.

215. *Verreaux's Eagle-Owl*. Jemma Valley ett ex. vid lägret.
216. *Slender-tailed Nightjar*. Tio ex. Noterad sju dagar.
217. *Montane Nightjar*. Nio ex. Noterad sju dagar.
218. *Plain Nightjar*. Bilen ett ex. sett.
219. *Donaldson Smith's Nightjar*. Bobella Forest ett ex. hört.
220. *Alpine Swift*. Ca 15 ex. Noterad tre dagar.
221. *Mottled Swift*. Melka Gebdo - Debre Birhan minst ett ex.
222. *Nyanza Swift*. Ca 70 ex., de flesta längs vägen mot Sof Omar. Noterad tre dagar
223. *African Palm Swift*. Ca fem ex, alla vid Bilen-Awash NP. Förvånansvärt fåtalig.
224. *Speckled Mousebird*. Allmän. Noterad 16 dagar.
225. *Blue-naped Mousebird*. Tämligen allmän i torrare marker. Noterad nio dagar.
226. *Narina Trogon*. Bobella Forest en hanne.
227. *Pied Kingfisher*. Minst 40 ex. Noterad tio dagar.
228. *Grey-headed Kingfisher*. Negelle-Hareenna två ex., Jemma Valley tre ex.
229. *Giant Kingfisher*. Melka Gebdo ett ex., Jemma River två ex.
230. *Woodland Kingfisher*. Awash NP två ex.
231. *Striped Kingfisher*. Tre ex. Noterad tre dagar.
232. *Half-collared Kingfisher*. Wendo Genet ett ex.
233. *Malachite Kingfisher*. 17 ex. Noterad åtta dagar.
234. *African Pygmy Kingfisher*. Lake Bojo ett ex, Jemma Valley tre ex.
235. *Little Bee-eater*. Ca 50 ex. Noterad 11 dagar.
236. *Blue-breasted Bee-eater*. Ca 50 ex. Noterad åtta dagar. Normalt högre upp än föregående art.
237. *European Bee-eater*. Lake Bojo- Nechisar ett ex.
238. *Northern Carmine Bee-eater*. Ca 45 ex. Noterad sju dagar.
239. *Broad-billed Roller*. Nechisar NP fyra ex.
240. *Rufous-crowned Roller*. 27 ex., mest i söder. Noterad åtta dagar.
241. *Abyssinian Roller*. Ca 35 ex. i Rift Valley och i norr. Noterad 12 dagar.
242. *Lilac-breasted Roller*. Allmän i Rift Valley och i söder. Noterad åtta dagar.
243. *European Roller*. Tre ex i söder. Noterad tre dagar.
244. *Black-billed Wood-hoopoe*. Ca 50 ex, mest i söder. Noterad åtta dagar.
245. *Eurasian Hoopoe*. Allmän. Noterad 16 dagar.
246. *Abyssinian Scimitarbill*. Yabello fem ex., Bobella Forest- Negelle fyra ex., Bilen två ex.
247. *Black Scimitarbill*. Negelle -Hareenna två ex., Lake Abiata fyra ex.
248. *Eastern Yellow-billed Hornbill*. Ca 30 ex. Noterad åtta dagar.
249. *Red-billed Hornbill*. Allmän. Noterad 14 dagar.
250. *Von der Decken's Hornbill*. Ca 40 ex. Noterad åtta dagar.
251. *Hemprich's Hornbill NE*. Ca 15 ex. Noterad sex dagar.
252. *African Grey Hornbill*. Tämligen allmän. Noterad tio dagar.
253. *Silvery-cheeked Hornbill*. Tämligen allmän i skog i söder. Noterad åtta dagar.
254. *Abyssinian Ground-hornbill*. 27 ex. Noterad 11 dagar.
256. *Yellow-fronted Tinkerbird*. Wendo Genet ett ex.
257. *Red-fronted Tinkerbird*. Nio ex. Noterad fem dagar.
258. *Red-fronted Barbet*. Fem ex. Noterad tre dagar.
259. *Black-throated Barbet NE*. 13 ex. Noterad fyra dagar.
260. *Black-billed Barbet*. 25 ex. Noterad tio dagar.
261. *Double-toothed Barbet*. Fem ex. Noterad fyra dagar.
262. *Banded Barbet E*. Wendo Genet ett ex., Hareenna-Sof Omar ett ex., Sof Omar-Dinsho ett ex.
263. *d'Arnaud's Barbet*. Ca 20 ex. i söder. Noterad fyra dagar.

264. *Red-and -yellow Barbet*. Ca 15 ex. i söder. Noterad tre dagar.
265. *Yellow-breasted Barbet*. Melka Gebdo tre ex.
266. *Greater Honeyguide*. Awash Falls ett ex.
267. *Scaly-throated Honeyguide*. Nechisar NP fem ex.
268. *Red-throated Wryneck*. Wendo Genet -Lake Bojo ett ex.
269. *Eurasian Wryneck*. Lake Bojo ett ex., Yabello- Arero ett ex.
270. *Nubian Woodpecker*. Sex ex. Noterad fyra dagar.
271. *Bearded Woodpecker*. Fyra ex. Noterad tre dagar.
272. *Cardinal Woodpecker*. Två ex. Noterad två dagar.
273. *Abyssinian Woodpecker E.* Wendo Genet två ex.
274. *Grey-headed Woodpecker*. Wendo Genet tre ex.
275. *Flappet Lark*. Liben Plains ett ex.
276. *Foxy Lark*. Yabello ett ex., Yabello- Arero ett ex.
277. *Singing Bush Lark*. Awash NP ett ex..
278. *Sidamo Lark*. Liben Plains 1-3 ex.
279. *Erlanger's Lark*. Lokalt allmän på höglandet kring Debre Birhan. Noterad tre dagar.
280. *Somali Short-toed Lark*. Liben Plains minst ett tiotal ex.
281. *Desert Lark*. Awash - Melka Gebdo två ex.
282. *Thekla Lark*. Tämligen allmän på höga höjder. Noterad sju dagar.
283. *Black-crowned Sparrow-Lark*. Alledoghi Plains ett ex, Awash-Melka Gebdo 15 ex.
284. *Rock Martin*. Tämligen allmän kring klippor. Noterad sju dagar.
285. *Crag Martin*. Jemma Valley - Addis Ababa 100 + ex.
286. *Sand Martin*. Tämligen allmän lokalt. Noterad sex dagar.
287. *Plain Martin*. Tämligen allmän lokalt. Noterad sju dagar.
288. *Common House Martin*. Ca 25 ex. Noterad fem dagar.
289. *Red-rumped Swallow*. Dinsho 25 ex.
290. *Mosque Swallow*. Arero-Negelle ett ex.
291. *Lesser Striped Swallow*. Yabello tre ex.
292. *White-tailed Swallow*. Yabello ett ex., Arero- Negelle två ex.
293. *Barn Swallow*. Allmän. Noterad 18 dagar.
294. *Red-chested Swallow*. Lake Koka fem ex.
295. *Ethiopian Swallow*. Ca 40 ex. Noterad sex dagar.
296. *Wire-tailed Swallow*. Negelle- Harena tio ex., Jemma Valley fyra ex.
297. *Black Saw-wing*. Wendo Genet allmän.
298. *Yellow Wagtail*. Allmän. Noterad 14 dagar.
299. *African Pied Wagtail*. Sex ex. Noterad fyra dagar.
300. *White Wagtail*. Tämligen allmän. Noterad 11 dagar.
301. *Mountain Wagtail*. Ca tio ex. Noterad fyra dagar.
302. *Grey Wagtail*. Tre ex. Noterad två dagar.
303. *Abyssinian Longclaw*. Nio ex. på hög höjd. Noterad tre dagar.
304. *Tawny Pipit*. Alledoghi Plains två ex.
305. *Grassland Pipit*. Senkele ca tio ex. (Vi ägnade mycket liten tid åt piplärkorna – det fanns säkert fler Grasslands under resan)
306. *Long-billed Pipit*. Melka Gebdo- Ankober två ex., Debre Dirhan – Jemma Valley fem ex.

307. *Plain-backed Pipit*. Ca 15 ex. Noterad tre dagar.
308. *Red-throated Pipit*. Allmän på framför allt fuktig ängsmark. Noterad tio dagar.
309. *Tree Pipit*. Ca 15 ex. Noterad åtta dagar.
310. *Black Cuckooshrike*. Harenna Forest en hanne.
311. *Red-shouldered Cuckooshrike*. Arero- Negelle en hona.
312. *White-breasted Cuckooshrike*. Bobella Forest ett ex.
313. *Common Bulbul*. Allmän. Noterad resans samtliga 20 dagar.
314. *Northern Brownbul*. Yabello fem ex, Bobella Forest tre ex.
315. *Rüppels Robin-Chat*. Nio ex. på högre höjder. Noterad fem dagar.
316. *White-browed Robin-Chat*. Lake Awasa två ex.
317. *Common Nightingale*. Lake Chamo en sjungande fågel, Lake Abiata ett ex.
318. *Common Redstart*. Sju ex. Noterad sex dagar.
319. *Rufous Scrub Robin*. Nechisar -Yabello ett ex.
320. *White-browed Scrub Robin*. 13 ex. Noterad fem dagar.
321. *Spotted Palm-Thrush*. Yabello fyra ex., Negelle- Harenna ett ex.
322. *Siberian Stonechat*. Dinsho-Lake Abiata ett ex.
323. *African Stonechat*. Ca 20 ex på högre höjder. Noterad tre dagar.
324. *Red-breasted Wheatear*. Ca 25 ex. Noterad fem dagar.
325. *Isabelline Wheatear*. Allmän. Noterad 19 dagar.
326. *Northern Wheatear*. Fem ex. Noterad tre dagar.
327. *Pied Wheatear*. Allmän. Noterad 15 dagar.
328. *Black-eared Wheatear*. Lubak Lodge ett ex.
329. *Abyssinian Black Wheatear*. Ca 15 ex. Noterad sex dagar.
330. *Brown-tailed Rock Chat*. Sof Omar fem ex.
331. *Sombre Rock Chat*. Lavafält nära Awash NP ett ex.
332. *Moorland Chat*. Allmän på högre höjder. Noterad sex dagar.
333. *Blackstart*. Lavafält nära Awash NP två ex.
334. *Mocking Cliff Chat*. 14 ex. Noterad fyra dagar.
335. *White-winged Cliff Chat*. Jemma Escarpment två ex., Jemma Valley ett ex.
336. *Rüppel's Black Chat*. Jemma Escarpment och Jemma Valley tämligen allmän.
337. *Groundscraper Thrush*. Ca 50 ex. på högre höjder. Noterad sex dagar.
338. *Blue Rock Thrush*. Sex ex. Noterad fem dagar.
339. *Common Rock Thrush*. Ca 15 ex. Noterad åtta dagar.



Little Rock Thrush

340. Little Rock Thrush. Melka Gebdo- Debre Dirhan fem ex.

341. Mountain Thrush. Allmän-tämligen allmän i skog på högre höjder. Noterad åtta dagar.

342. African Thrush. Sju ex. Noterad fem dagar.

343. Bare-eyed Thrush. Yabello- Arero ett ex., Arero-Negelle ett ex.

344. Abyssinian Ground Thrush. Bale NP ett ex.

345. Cinnamon Bracken Warbler. Dinsho ett ex.

346. Great Reed Warbler. Jemma Valley tre ex.

347. Lesser Swamp Warbler. Laka Awasa ett ex.

348. African Reed Warbler. Lake Awasa ett ex.

349. Eurasian Reed Warbler. Lake Awasa ett ex.

350. Eastern Olivaceous Warbler. Sju ex. Noterad fem dagar.

351. Grey-backed Camaroptera. Allmän. Noterad 13 dagar.

352. Grey Wren-Warbler. Sof Omar två ex.

353. Yellow-bellied Eremomela. 11 ex. Noterad fem dagar.

354. Northern Crombec. Tio ex. Noterad sex dagar.

355. Red-faced Crombec. 14 ex. Noterad fyra dagar.

356. Buff-bellied Warbler. Lake Abiata fyra ex.

357. Willow Warbler. Nio ex. Noterad fem dagar

358. Common Chiffchaff. Tämligen allmän. Noterad 13 dagar.

359. Brown Woodland Warbler. Hareenna Forest två ex., Bale NP allmän.

360. Lesser Whitethroat. Fem ex. Noterad fyra dagar.

361. Common Whitethroat. Två ex. Noterad två dagar.

362. Blackcap. Sju ex. Noterad tre dagar.

363. Eastern Orphean Warbler. Awash NP- Melka Gebdo två ex.

364. Banded Parisoma. Yabello två ex. Yabello-Arero ett ex.

365. Brown Parisoma. Wendo Genet ett ex.

366. Bale Parisoma E. Bale NP ett ex.

367. Pectoral-patch Cisticola. Debre Dirhan - Jemma Valley två ex.

368. Zitting Cisticola. Awash NP ett ex.

369. Ethiopian Cisticola E. Ca 20 ex. Noterad sex dagar.

370. Rattling Cisticola. Fyra ex. Noterad fyra dagar.

371. Singing Cisticola. Debre Dirhan-Jemma Valley ett ex.

372. Red-faced Cisticola. Jemma Valley ett ex.

373. Tawny-flanked Prinia. 11 ex. Noterad fem dagar.

374. Red-fronted Warbler. Lubak Lodge tre ex.

375. Yellow-breasted Apalis. Ca 20 ex. i söder. Noterad fyra dagar.

376. Abyssinian Slaty Flycatcher. E. Ca 20 ex. Noterad fem dagar.

377. Northern Black Flycatcher. Ca 25 ex. Noterad sju dagar.

378. African Grey Flycatcher. Tämligen allmän i torr terräng i söder. Noterad fem dagar.

379. Pale Flycatcher. Sju ex. Noterad tre dagar.

380. African Dusky Flycatcher. Ca 20 ex. Noterad fem dagar.

381. Spotted Flycatcher. Bale NP ett ex.

382. *African Paradise Flycatcher*. Ca 25 ex. Noterad 12 dagar.
383. *Pygmy Batis*. Yabello två ex.
384. *Grey-headed Batis*. Åtta ex. Noterad fyra dagar.
385. *Black-headed Batis*. Tre ex. Noterad två dagar.
386. *White-rumped Babbler NE*. Ca 35 ex. Noterad sex dagar.
387. *Rufous Chatterer*. Ca 20 ex. Noterad sex dagar.
388. *Abyssinian Catbird E*. Harena Forest ca tio ex., Bale NP tre ex.
389. *Northern Grey Tit*. Tio ex i söder. Noterad fyra dagar.
390. *White-backed Black Tit E*. Bale NP åtta ex.
391. *Spotted Creeper*. Wendo Genet två ex.
392. *Mouse-coloured Penduline-tit*. Tre ex. Noterad tre dagar.
393. *Montane White-eye*. Ca tio ex. Noterad fyra dagar.
394. *Abyssinian White-eye*. Ca 30 ex. Noterad fem dagar.
395. *Tacazze Sunbird*. 18 ex. på högre höjder. Noterad åtta dagar.
396. *Scarlet-chested Sunbird*. Sex ex. Noterad fem dagar.
397. *Hunter's Sunbird*. Arero- Negelle ett ex.
398. *Beautiful Sunbird*. Sex ex. Noterad sex dagar.
399. *Shining Sunbird*. Tio ex. Noterad fyra dagar.
400. *Marico Sunbird*. Sex ex. Noterad fyra dagar.
401. *Eastern Violet-backed Sunbird*. Yabello ett ex.
402. *Variable Sunbird*. Tre ex. i söder. Noterad tre dagar.
403. *Collared Sunbird*. Fyra ex. Noterad två dagar.
404. *Nile Valley Sunbird*. Alledoghi Plains sju ex., Awash NP- Melka Gebdo fyra ex.
405. *Common Fiscal*. Allmän. Noterad 14 dagar
406. *Somali Fiscal NE*. Awash NP och Alledoghi Plains tämligen allmän
407. *Grey-backed Fiscal*. Ca 35 ex. Noterad sex dagar.
408. *Southern Grey Shrike*. Ca tio ex. Noterad fyra dagar.
409. *Woodchat Shrike*. Sju ex. Noterad fyra dagar.
410. *Masked Shrike*. Jemma Valley en hanne.
411. *Isabelline Shrike*. Ca 15 ex. Noterad tio dagar.
412. *Brubru*. Sju ex. Noterad två dagar.
413. *Slate-coloured Boubou*. 14 ex. Noterad åtta dagar.
414. *Ethiopian Boubou NE*. Ca 20 ex. Noterad 12 dagar.
415. *Red-naped Bush-shrike*. Yabello- Arero ett ex., Arero- Negelle ett ex.
416. *Northern Puffback*. Fem ex. Noterad fyra dagar.
417. *Pringle's Puffback*. Yabello area en hona, Arero-Negelle ett par.
418. *Black-crowned Tchagra*. Ca tio ex. Noterad sex dagar.
419. *Rosy-patched Bush-shrike*. Ca 15 ex. Noterad sex dagar.
420. *Sulphur-breasted Bush-shrike*. Yabello-Arero två ex., Negelle- Harena två ex.
421. *Grey-headed Bush-shrike*. Sof Omar två ex.
422. *Northern White-crowned Shrike*. Tämligen allmän. Noterad 11 dagar
423. *White-crested Helmetshrike*. 12 ex. Noterad sex dagar.
424. *Black-headed Oriole*. Tämligen allmän i söder. Noterad sex dagar.
425. *Abyssinian Oriole E*. Tämligen allmän i skog på högre höjd. Noterad fyra dagar.
426. *Fork-tailed Drongo*. Allmän. Noterad 15 dagar.
427. *Stresemann's Bush-crow E*. Yabello ca tio ex., Yabello-Arero minst 20 ex.
428. *Red-billed Chough*. Senetti Plains sex ex.
429. *Pied Crow*. Allmän utom i söder. Noterad 12 dagar.
430. *Dwarf Raven*. Ca 40 ex., mest i sydost. Noterad fyra dagar.
431. *Cape Rook*. Allmän på högre höjder. Noterad tio dagar.

432. *Fan-tailed Raven*. Allmän. Noterad 18 dagar.
433. *Thick-billed Raven E*. Allmän, i huvudsak på högre höjder. Noterad 12 dagar.
434. *Red-billed Oxpecker*. Ca 45 ex. Noterad nio dagar.
435. *Golden-breasted Starling*. Allmän i söder. Noterad fyra dagar.
436. *Red-winged Starling*. Wendo Genet två ex.
437. *Slender-billed Starling*. Dinsho area minst 20 ex., Jemma Valley minst tio ex.
438. *White-billed Starling E*. Ankober två ex., Jemma Valley ca 40 ex.
439. *Bristle-crowned Starling*. Ca tio ex. Noterad tre dagar.
440. *Lesser Blue-eared Starling*. Yabello två ex., Jemma Valley tämligen allmän.
441. *Greater Blue-eared Starling*. Allmän. Noterad 18 dagar.
442. *Rüppell's Starling*. Lokalt tämligen allmän. Noterad nio dagar
443. *Superb Starling*. Lokalt allmän. Noterad 12 dagar.
444. *Shelley's Starling*. Tämligen allmän längts i söder. Noterad fem dagar.
445. *Wattled Starling*. Ca 100 ex. Noterad fem dagar.
446. *Violet-backed Starling*. Nechisar ett ex., Arero ett par.
447. *Magpie Starling*. Nechisar - Yabello 14 ex., Yabello area fyra ex.
448. *White-crowned Starling NE*. Lokalt relativt allmän längst i syd. Noterad tre dagar.
449. *Shelley's Rufous Sparrow*. Yabello fem ex.
450. *Swainson's Sparrow*. Allmän. Noterad 19 dagar
451. *Yellow-spotted Petronia*. Ca 50 ex. Noterad nio dagar.
452. *Bush Petronia*. Jemma Valley ca tio ex.
453. *White-browed Sparrow-Weaver*. Allmän lokalt. Noterad 11 dagar.
454. *Grey-capped Social Weaver*. Relativt allmän längts i söder. Noterad två dagar.
455. *Black-capped Social Weaver*. Tre ex. längst i söder. Noterad tre dagar.
456. *Speckled-fronted Weaver*. Jemma Valley tre ex.
457. *White-headed Buffalo-Weaver*. Tämligen allmän. Noterad 12 dagar.
458. *Red-billed Buffalo-Weaver*. Ca 20 ex. Noterad sex dagar.
459. *Village Weaver*. Bara fem ex (men vi tittade inte så noga på alla vävarhonor och hannar utan praktdräkt). Noterad två dagar.
460. *Vitelline Masked Weaver*. Yabello-Arero ett par.
461. *Northern Masked Weaver*. Yabello tre ex.
462. *Yuba Weaver*. Negelle- Harena tre ex.
463. *Speke's Weaver*. Negelle- Harena tio ex., Senkele ett ex.
464. *Spectacled Weaver*. Lake Awasa tre ex.
465. *Rüppell's Weaver NE*. Ca 30 ex. Noterad fyra dagar.
466. *Little Weaver*. Yabello ett par, Melka Gebdo ett par
467. *Baglafecht Weaver*. Ca 30 ex. Noterad nio dagar.
468. *Red-billed Quelea*. Jemma Valley ca tio ex.
469. *Red-headed Weaver*. 14 ex. Noterad sex dagar.
470. *Black-winged Red Bishop*. Jemma Valley ca 25 ex.
471. *Northern Red Bishop*. Vägen mot Sof Omar ca tio ex., Melka Gebdo ca tio ex., flera i häckningsdräkt.
472. *Yellow Bishop*. Ca 90 ex. Noterad fyra dagar.
473. *Red-collared Widowbird*. Jemma Valley ca 20 ex.
474. *Green-winged Pytilia*. Två ex. Noterad två dagar.
475. *Red-billed Pytilia*. Jemma Valley ett par.
476. *Green-backed Twinspot*. Bobella Forest ett ex.
477. *Red-cheeked Cordon-bleu*. Allmän. Noterad 17 dagar.
478. *Purple Grenadier*. Ca 15 ex. längst i söder. Noterad fem dagar.
479. *Abyssinian Crimsonwing*. Harena Forest ett ex.

480. *Red-billed Firefinch*. Tämligen allmän. Noterad nio dagar.
 481. *African Firefinch*. Lake Bojo ett ex.
 482. *Yellow-bellied Waxbill*. Negelle-Hareenna ca 50 ex., Hareenna Forest ett ex.
 483. *Common Waxbill*. Lake Awasa fyra ex.
 484. *Crimson-rumped Waxbill*. Ca 60 ex. Noterad fem dagar.
 485. *Abyssinian Waxbill*. Jemma Valley ca 20 ex.
 486. *Black-cheeked Waxbill*. Yabello- Arero ett ex.
 487. *African Silverbill*. Jemma Valley två ex.
 488. *Bronze Mannikin*. Ca 30 ex. Noterad tre dagar.
 489. *Cut-throat Finch*. 17 ex. Noterad fem dagar.
 490. *Pin-tailed Whydah*. Ca 20 ex, ingen i häckningsdräkt. Noterad fyra dagar.
 491. *Straw-tailed Whydah*. Arero-Negelle ett ex. (inte i häckningsdräkt).
 492. *Village Indigobird*. Ca 10 ex. Noterad fyra dagar.
 493. *Yellow-fronted Canary*. Yabello två ex.



Ankober Serin

494. *White-bellied Canary*. 14 ex. Noterad tre dagar.
 495. *African Citril*. Ca 35 ex. Noterad sex dagar.
 496. *Black-headed Siskin* E. Allmän på höga höjder. Noterad sex dagar.
 497. *Reichenow's Seedeater*. Tämligen allmän. Noterad nio dagar.
 498. *Yellow-throated Seedeater* E. Melka Gebdo ca tio ex.
 499. *Brown-rumped Seedeater* E. Ca 20 ex. Noterad fem dagar.
 500. *Streaky Seedeater*. Ca 35 ex. Noterad fem dagar.
 501. *Ankober Serin* E. Ankober minst tio ex.
 502. *Ortolan Bunting*. Jemma Valley ett ex.
 503. *Cinnamon-breasted Bunting*. ca 15 ex. Noterad fyra dagar
 504. *Somali Bunting*. Yabello ca fem ex, Awash NP ett ex.

Artlista Däggdjur


Namn och ordningsföljd i huvudsak enligt Chris & Tilde Stuart. A field guide to the larger mammals of Africa. Cape Town 2008.

1. *Hamadryas*. Sof Omar 30+ ex., nära Alledeghi Plains 30 + ex., Awash NP-Melka Gebdo 20+ex.
2. *Olive Baboon*. Tämligen allmän. Noterad 11 dagar.
3. *Gelada E.* Debre Dirhan-Ankober 12 ex., Ankober sex ex., Debre Dirhan-Jemma Valley 30 ex.
4. *Vervet Monkey*. Tämligen allmän. Noterad 13 dagar.
5. *Abyssinian Black and White Colubus*. Ca 25 ex. Noterad åtta dagar.
6. *Grevy's Zebra*. Alleghedi Plains ett ex.
7. *Common Hippopotamus*. Lake Chamo ca 20 ex., Lake Awasa ett ex (en jätte!)
8. *Common Warthog*. Tämligen allmän, särskilt kring Dinsho. Noterad nio dagar.
9. *Lesser Kudu*. Sex ex. Noterad fyra dagar.
10. *Mountain Nyala*. Allmän i Bale NP
11. *Bushbuck*. Ca 20 ex. Noterad sex dagar.
12. *Beisa Oryx*. Awash NP 20 ex., Alledeghi Plains 30 ex.
13. *Bohor Reedbuck*. Dinsho area ca 30 ex.
14. *Swayne's Hartebeest*. Senkele ca 60 ex.
15. *Soemmering's Gazelle*. Awash NP sex ex., Alledeghi Plains 20 + ex.
16. *Grant's Gazelle*. Lake Abiata 10+ ex.
17. *Oribi*. Senkele sju ex.
18. *Klipspringer*. Yabello area ett ex., Ankober ett ex.
19. *Salt's Dikdik*. 23 ex. i norr. Noterad tre dagar.
20. *Guenter's Dikdik*. Ca. 60 ex. i söder. Noterad sju dagar.
21. *Common Duiker*. Dinsho area sju ex.
22. *Ethiopian Wolf*. Senetti Plains 1+2+1 ex.
23. *Black-backed Jackal*. Awash NP ett ex., Awash NP-Melka Gebdo ett ex.
24. *Side-striped Jackal*. Dinsho - Lake Abiata ett ex.
25. *Golden Jackal*. Lake Abiata ett ex., Alledeghi Plains tre ex.
26. *African Civet*. Wendo Genet tre ex på kvällen.
27. *Slender Mongoose*. Lake Abiata- Lake Awasa ett ex.
28. *White-tailed Mongoose*. Wendo Genet ett ex.
29. *Large Grey Mongoose*. Dinsho-Lake Abiata ett ex., Awash NP ett ex.
30. *Spotted Hyena*. Dinsho area fyra ex. sedda. Desutom hörda nattetid på två platser
31. *African Wild Cat*. Sof Omar ett ex.
32. *Serval*. Dinsho area ett ex.
33. *Rock-dwelling Hyrax*. Ca 50 ex. Noterad nio dagar.
34. *Stark's Hare*. Senetti Plains 13 ex.
35. *Scrub Hare*. Tio ex. Noterad sju dagar.
36. *Unstriped Ground Squirrel*. Ca 20 ex, flest mellan Arero och Negelle. Noterad tre dagar
37. *Gambian Sun Squirrel*. Wendo Genet ett ex., Lake Awasa ett ex.

Artlista kräddjur

Nile Crocodile. Lake Chamo 200 + ex. (många jättar!), Awash River sju ex., Jemma River ett ex.

Nile Monitor. Lake Chamo ca tio ex.



Några slutord

När man studerar olika reserapporter inser man att Håkan Pohlstrand både har det mest prisvärda och det ornitologiskt bästa konceptet. Att tälta innebär att man kommer mycket närmare skådarområdena och kan nyttja hela de tidiga morgnarna. Tältboende med fälttoaletter och fältduschar känns avgjort också som ett mycket trevligare alternativ än de mycket enkla hotell som finns på den etiopiska landsbygden. Den mat som trossens kock lagar till är dessutom mycket godare, mer hygienisk och mer näringsriktig än den man får på landsbygdens restauranger. Därtill kommer att Håkan själv är ovärderlig genom att han behärskar språket fullständigt och genom att han är så kunnig om landet och dess historia. Han har också pondus och en enastående falkblick, och kan långt mer om fågel än vad han ger sken av. Detta tycker jag kommer fram dåligt i de rapporter från kommersiella resebyråer som anlitar honom (och vars resenärer genom den extra mellanhanden får betala 50 % mer än vad vi gjorde). Samla ihop ett gäng om åtta personer och anlita Håkan direkt är mitt råd!