

Sydöstra Brasilien

19/8–5/9 2010



Heliangelus naturresor



Samuel Hansson
Bondegatan 2
573 40 Tranås

www.heliangelus.se
heliangelus@telia.com
Tel. 0140-107 44

Deltagare

Samuel Hansson, Tranås
Tomas Hedmark, Vaxholm
Roger Holmberg, Kungsör
Karl-Lennart Nilsson, Falkenberg
Lars-Olof Sandberg, Pixbo
Stefan Sandberg, Askersund
Bengt-Eric Sjölander, Malmö

Inledning

Efter oroligheter på Madagaskar som startade i januari 2009 blev jag tvungen att ställa in Heliangelus inplanerade resa dit i oktober samma år. Den ersattes med en resa till Norra Peru. Samma öde gick 2010 års resa till mötes, men nu omstyrd destinationen till sydöstra Brasilien eftersom flera personer kunde tänka sig att istället åka dit. Bara någon månad efter rockaden förklarade UD att säkerheten på Madagaskar var tillfredställande, men då hade hjulen redan kommit i rullning. Brasilien fick det bli! Tidigt kontaktades en av Brasiliens absoluta toppguider, Ricardo Parrini, som var tänkt att bistå oss under resans andra vecka. Under något märkliga omständigheter drog sig Ricardo sedermera ur, men inte utan att rekommendera en annan guide, Rafael Fortes, som genast kontaktades. Rafael visade sig snabbt vara en effektiv medhjälpare. Utan honom hade såväl transportbiten som en del av hotellbokningarna varit mer svårhanterliga, så det hela löste sig på ett bra sätt.

Resan förlöpte väl på det stora hela, förutom att den anlidade transportfirman trilskades under några dagar när det gällde körning på grusvägar. Även om det innebar huvudvärk för mig som arrangör påverkades inte programmet, och firman bad på slutet om ursäkt för det inträffade som väl bäst beskrivs som missförstånd parterna emellan. Rafael visade sig vara en klippa, tack vare honom kom vi slutligen upp i goda 423 arter på 16 dagar. Vi hade god gemenskap, åt mycket god mat (oftast i bufféstil) och så upplevde vi förstås mycket fin natur.

Bland resans absoluta höjdpunkter måste nämnas Brazilian Merganser och Long-trained Nightjar, som båda sågs efter flera försök när vi hade gett upp hoppet, sex spelande hanar av Blue Manakin – värsta naturfilmen! – samt fina obsar av Giant Anteater och en Black Capuchin som med avancerad teknik utvann hjärtat av en palm. Listan över övriga fina arter är lång och innefattar sådana ovanligheter som Black-fronted Piping-Guan, White-necked Hawk, Pavonine Cuckoo, Vinaceous Amazon, Blue-bellied Parrot, Festive Coquette, Hyacinth Visorbearer, Stripe-breasted Starthroat, Saffron Toucanet, Campo Miner, Cipó Canastero, White-bearded Antshrike, den obeskrivna São Paulo Antwren, Spotted Bamboowren, Slaty Bristlefront, Brasilia Tapaculo, São Paulo och Bay-ringed Tyrannulets, Fork-tailed Tody-Tyrant, Cock-tailed Tyrant, Buff-throated Purpleuft, Black-capped Piprites, Cinnamon-vented Piha, Swallow-tailed och Black-and-gold Cotingas, Ochre-breasted Pipit, Green-chinned Euphonia, Half-collared Sparrow, Blue Finch och den sällsynta spindelapan Southern Muriqui.

Karl-Lennart, Bengt-Eric och jag själv fortsatte med en veckas skådning i Paraná/Santa Catarina och Rio Grande do Sul. En sammanfattning av denna lyckade extension finns med i rapporten, och artlistan gäller i denna version den kompletta resan. Stort tack till Roger för många fina foton!

/Samuel Hansson

Kortfattad beskrivning av besökta lokaler

Serra do Cipó

Ett välkänt och naturskönt bergsområde med *campo rupestre* ("stenig cerrado") 8 mil nordost om Belo Horizonte. Specialarterna framför andra är Cipó Canastero (upptäckt 1986), Long-tailed Cinclodes (nyupptäckt – en rejäl range extension), Hyacinth Visorbearer, Gray-backed Tachuri, Pale-throated Serra-Finch och Cinereous Warbling-Finch. Andra godbitar man har chans på är Horned Sungem, Checkered Woodpecker, Collared Crescentchest och Blue Finch.

Caraca

Denna kombination av natur- och kulturresevat 12 mil sydost om Belo Horizonte hyser både fina högländsskogar och *campo rupestre*. Klassiska marker för Serra Antwren och Maned Wolf (som matas fram vid klostret), men här finns också Ochre-rumped Antbird, White-breasted Tapaculo, Swallow-tailed Cotinga, Red-ruffed Fruitcrow och Serra do Mar Tyrant-Manakin.

Serra da Canastra NP

Denna stora nationalpark skyddar ett av de viktigaste *cerrado*områdena i hela Brasilien. De vidsträckta gräsmarkerna, bäckravinerna med kristallklart vatten och skogarna utmed São Francisco-floden är hem för ett stort antal olika fåglar och djur. Brazilian Merganser är star bird nummer ett, och bland de många övriga specialarna bör nämnas Crowned Eagle, Golden-capped Parakeet, Stripe-breasted Starthroat, Campo Miner, Planalto Foliage-gleaner, Brasilia Tapaculo, Cock-tailed och Sharp-tailed Tyrants, Ochre-breasted Pipit, Black-masked och Blue Finches, Maned Wolf, Giant Anteater och Pampas Deer.

Itatiaia NP

Brasiliens äldsta (1937) och kanske mest kända nationalpark, belägen i Serra do Mantiqueira mellan Rio de Janeiro och São Paulo. Pico de Agulhas Negras är med sina 2 878 meter Brasiliens tredje högsta berg medan de lägsta delarna ligger på kanske 700 meters höjd. Mycket av parken är otillgänglig för besökare. Agulhas Negras Road leder till de högst belägna områdena och hyser arter som Plovercrest, Itatiaia Spinetail, Black-capped Piprites och Hellmayr's Pipit. Några stigar i hjärtat av parken kan ge sådana höjdare som Mantled Hawk, Pileated Parrot, Frilled Coquette, Saffron Toucanet, White-collared Foliage-gleaner, White-bearded och Large-tailed Antshrikes, Rufous-backed Antvireo, Bertoni's och White-bibbed Antbirds, Cryptic Antthrush, Slaty Bristlefront, Black-and-gold, Shrike-like och Swallow-tailed Cotingas samt Black-legged Dacnis.

Perequê

Kustnära låglandsskog nära Angra dos Reis, tyvärr med mycket begränsad tillgänglighet. Perequê är standardlokal för den ytterst lokala Black-hooded Antwren, men här finns även en hel del andra roliga arter inklusive Buff-bellied Puffbird, Orange-eyed Thornbird, Fork-tailed Tody-Tyrant, São Paulo Tyrannulet, Buff-throated Purpletuft och Half-collared Sparrow.

Ubatuba

Vi besökte två klassiska lokaler nära denna kuststad, Fazenda Angelim och Folha Seca. Angelim är särskilt bra för Buff-throated Purpletuft och Fork-tailed Tody-Tyrant, Folha Seca är särskilt bra för Saw-billed Hermit och Festive Coquette på feeders samt Slaty Bristlefront och Bare-throated Bellbird; båda lokalerna är bra för Spotted Bamboowren, Black-cheeked Gnateater, São Paulo Antwren och Black-legged Dacnis.

Campos do Jordão

Denna Schweizinspirerade "hill resort" norr om São Paulo har en hel del roliga skogsarter i omgivningarna, såsom Vinaceous Amazon, Long-trained Nightjar, Black-capped Piprites, Dusky-tailed Antbird, Red-ruffed Fruitcrow och Araucaria Tit-Spinetail. Amazonen såg vi på två platser utmed vägen till Horto Florestal, annars finns den bästa skogen längs vägen till Pedra do Baú. Gräsmarker i området hyser Hellmayr's Pipit.

São José dos Campos

En nyupptäckt lokal (av några få) norr om São Paulo för den obeskrivna "São Paulo" Antwren ligger en dryg mil väster om São José dos Campos. Vi hade inga problem att se denna ytterst lokalt förekommande art och fick dessutom in Orange-breasted Thornbird som bonus.

Parque Estadual do Intervales

Intervales ligger i södra São Paulo state och skyddar ett av de största kvarvarande områdena av atlantskog inom höjdistervallet 500–1 000 meter. Under det senaste decenniet har parken blivit välkänd inom fågelskådarkretsar för de många ovanliga arter som ses regelbundet här. Bland de allra mest eftertraktade arterna kan nämnas Black-fronted Piping-Guan, Purple-winged Ground-Dove (mycket sällsynt), Blue-bellied Parrot, Long-trained Nightjar, Helmeted Woodpecker, White-bearded Antshrike, Atlantic Royal-Flycatcher, Bay-ringed Tyrannulet, Shrike-like Cotinga, Green-chinned Euphonia, Black-legged Dacnis, Temminck's Seedeater samt den sällsynta Woolly Spider Monkey.

Endemer

Sydöstra Brasilien tillhör världens allra främsta endemcentran. Många arter delas med Argentina och Paraguay, men en bit över 100 fågelarter är helt endemiska för Brasilien. Trots att människan har gått hårt åt naturen i sydöstra Brasilien finns en hel del fin skog kvar i bergstrakterna. Värst utsatt är låglandsskogen men även cerradon har fått se enorma arealer omvandlas till jordbruks- eller betesmark. En följd av detta är att ett relativt stort antal arter klassas som närahotade (nt) eller hotade (Vulnerable, Endangered eller Critically endangered). Vi noterade 64 av 70-talet realistiska endemer utmed resrutten, vilket är ett utmärkt resultat. Fördelningen av rödlistade endemer är *nt* 20, *VU* 3, *EN* 1, medan helhetsbilden ser ut så här: *nt* 34, *VU* 11, *EN* 3, *CR* 1 (inkl. extraveckan: *nt* 42, *VU* 16, *EN* 6, *CR* 1.)

White-necked Hawk (VU)
Golden-capped Parakeet (nt)
Plain Parakeet
Blue-bellied Parrot (nt)
Saw-billed Hermit (nt)
Frisled Coquette
Sombre Hummingbird
Brazilian Ruby
Hyacinth Visorbearer (nt)
Stripe-breasted Starthroat
Crescent-chested Puffbird
Pallid Spinetail
Cipó Canastero (VU)
Orange-eyed Thornbird
Orange-breasted Thornbird
Pale-browed Treehunter
White-collared Foliage-gleaner
Rufous-backed Antwren
Star-throated Antwren
Unicolored Antwren (nt)
Serra Antwren
Black-hooded Antwren (EN)
"São Paulo" Antwren (EN?)
Ferruginous Antbird
Rufous-tailed Antbird (nt)
Ochre-rumped Antbird (nt)
Scaled Antbird
White-bibbed Antbird
Squamate Antbird
Cryptic Antthrush
Slaty Bristlefront (nt)
Brasilia Tapaculo (nt)

White-breasted Tapaculo (nt)
Mouse-colored Tapaculo
Black-cheeked Gnateater
Black-and-gold Cotinga (nt)
Hooded Berryeater (nt)
Buff-throated Purpletuft (nt)
Cinnamon-vented Piha (nt)
Pin-tailed Manakin
Serra do Mar Tyrant-Manakin
Brown-breasted Bamboo-Tyrant
Hangnest Tody-Tyrant
Fork-tailed Tody-Tyrant (VU)
Yellow-lored Tody-Flycatcher
Gray-capped Tyrannulet (nt)
Gray-backed Tachuri (nt)
Oustalet's Tyrannulet (nt)
Serra do Mar Tyrannulet (nt)
Velvety Black-Tyrant
Gray-hooded Attila
Gray-eyed Greenlet
Long-billed Wren
Brown Tanager (nt)
Cinnamon Tanager
Rufous-headed Tanager
Olive-green Tanager
Azure-shouldered Tanager (nt)
Golden-chevroned Tanager
Brassy-breasted Tanager
Gilt-edged Tanager
Bay-chested Warbling-Finch
Buff-throated Warbling-Finch
Pale-throated Serra Finch

Dagbok

Torsdag 19/8

Det blev en ganska tidig start på dagen för en del, trots att våra respektive flyg gick först på sena eftermiddagen. Själv startade jag med buss till Jönköping klockan 08.20 och kom fram till **Landvetter** 13.10. Karl-Lennart, Lars-Olof och Stefan dök upp vid 14.30-tiden medan Tomas anslöt till oss i **Frankfurt** på kvällen. Bengt-Eric och Roger väntade vi först i São Paulo nästa morgon. Atlantflygningen blev för undertecknad en jobbig historia, stel som en pinne i kroppen men som tur var placerad vid gången ...

Fredag 20/8

Trots en försenad start landade vi i tid vid **Guarulhos** och alla väskor kom slutligen rullande på bagagebandet efter en lite nervös väntan. Roger anslöt vid incheckningsdisken och Bengt-Eric vid gaten. Skönt! Nästa flygsträcka tog oss till **Belo Horizonte** i hjärtat av Minas Gerais. Här väntade våra två chaufförer Sergio och Elizeu med en rymlig minibuss, och snart var vi på väg mot vår första skådarlokal **Serra do Cipó**. Det var mycket skönt att komma fram till pousadan Chão da Serra vid 11.30-tiden! Innan och under lunchen skådade vi fåglar som Scaly-headed Parrot, Yellow-chevroned Parakeet, White-collared Swift, Stripe-breasted Starthroat, Fork-tailed Woodnymph, Glittering-bellied Emerald, Toco Toucan, Lineated Woodpecker, Swallow och Burnished-buff Tanagers, Blue Dacnis och Double-collared Seedeater. Vid 3-tiden körde vi upp till toppen av serran där vi möttes av taggtrådar och "No trespassing"-skyltar i det klassiska området med campo rupestre. Vi fortsatte därför en bit för att leta efter andra lämpliga toppar med karaktäristiskt utskjutande stenflak, biotopen för superendemen Cipó Canastero och några andra specialare. Snart kunde vi bege oss ut i markerna till fots, vilket gav målarterna Hyacinth Visorbearer, Gray-backed Tachuri och Blue Finch samt många andra nyheter som Spotted Nothura, King Vulture, Peach-fronted Parakeet, White-eared Puffbird, White-vented Violetear, Crested Black-Tyrant, Cinnamon Tanager, Green-winged Saltator och Grassland Sparrow. Solen gick ner redan vid halv sex, men innan dess lyckades vi faktiskt vaska fram en Cipó Canastero med hjälp av kombinationen playback och Stefans skarpa ögon. Gott! Efter den första artgenomgången vankades soppa och bröd, sedan var det sannerligen skönt att få gå till sängs. Själv somnade jag tämligen omgående!



Skådning vid Serra do Cipó.

Lördag 21/8

Frukost var beställd till klockan 05.30, och framdukat stod ett typisk brasilianskt morgonmål bestående av banan, melon, papaya, vitt bröd, ostbollar, sockerkaka i olika former, juice och kaffe/te. I vanliga fall ingår även ägg och bacon/korv, men bara inom normala tider. De kvarvarande målarna uppe på serran visade sig vara svårflörtade, men vi lyckades på sista möjliga försöket hitta åtminstone Pale-throated Serra Finch. I övrigt sågs bland annat Burrowing Owl, Gray-backed Tachuri, White-rumped Tanager och Yellow-rumped Marshbird. Vi lämnade Chão da Serra vid 10.50 och styrde först kosan mot **Belo Horizonte** för att sedan fortsätta österut mot **Caraça**. Strax utanför 5-miljonersstaden kåkade vi lunchbuffé till kilopriset 23.95 på den uppenbarligen populär churrascarian Beija Flor; det var fullt med hungriga brasileiros förutom oss nordbor. Den krokiga och lastbilsrika vägen mot Vitória förde oss allt närmare slutmålet som låg 45 km söder om korsningen, och vi kom fram till klostret, numera hotellet, vid 15.30. Under resten av eftermiddagen skådade vi i de närmaste omgivningarna och kunde förutom den primära målarten Serra Antwren även notera Rusty-margined Guan, Blackish Rail, White-shouldered Fire-eye, Masked Water-Tyrant, Sooty Tyrannulet, Highland Elaenia, Pin-tailed och Blue Manakins, Gray-eyed Greenlet, Black-goggled Tanager och en hane av den ovanliga men ifrågasatta (vad gäller artstatus) Dubois's Seedeater. En udda attraktion vid Caraça är att en manvarg kommer och äter utlagd mat vid kyrkporten kring skymningstiden. Det tog ett tag innan vi fattade hur det hela egentligen går till. Slutligen fick vi veta att prästen stod för utfodringen och att den normalt sker vid 19-tiden. Idag var det dock fullbokat, mycket liv och rörelse och dessutom en kvällsmassa som drog ut på tiden. Vi passade på att äta buffémiddag innan vargen skulle få sitt mål mat, men ingen präst kom och förutsättningarna verkade minst sagt ogynnsamma varför vi snart gav upp. Istället for vi ner till Fazenda do Engenho en mil bort, klarade av listan och kom i säng vid 22-tiden eller så. Todo bem!



Oblyg Blackish Rail vid Caraça. Foto: Roger Holmberg.

Söndag 22/8

Eftersom vi kunde bli serverade frukost först 07.00 spenderades första dagsljusstimman i pousadans närmaste omgivningar. Fåglar fanns det gott om. En orädd Red-legged Seriema blev den mest uppskattade arten, men vi noterade även White-eyed Parakeet, Spix's Spinetail, Sharp-tailed Streamcreeper (hörd), Olivaceous Woodcreeper, Bran-colored och Cliff Flycatchers, Yellow-lored Tody-Flycatcher, ett 30-tal Dubois's Seedeaters, Gray Pileated-Finch och Ruby-crowned Tanager. Direkt efter frukosten packade vi in allt i bussen och for iväg till Tanque Grande-stigen nära klostret. Här fick vi slutligen ihop en hyfsad lista inkluderande Amethyst Woodstar, Rufous-capped och Pallid Spinetails, Buff-fronted Foliage-gleaner, Ochre-rumped Antbird, Black-capped Antwren, Rufous Gnateater för några, Hangnest Tody-Tyrant, Mottled-cheeked Tyrannulet, Pin-tailed Manakin samt Golden-chevroned och Gilt-edged Tanagers. Efter morgonens skådning var det dags för en lång transport västerut. Lunchen intogs på Beija Flor, och efter ett bankbesök i **Belo Horizonte** fortsatte färden mot São Roque de Minas. Chaufförernas GPS visade tyvärr en olämplig färdväg, vilket undertecknad upptäckte allt för sent. Hade vi tagit den gamla goda vägen skulle vi nämligen ha kommit fram avsevärt tidigare. Trots denna miss fick vi ändå god utdelning vid ett våtmarksområde

som gav bland andra Pied-billed Grebe, Cocoi Heron, White-faced och Black-bellied Whistling-Ducks, Brazilian Teal, mängder med Common Gallinules, Wattled Jacana, White-headed Marsh-Tyrant, Fork-tailed Flycatcher och en överraskning i form av ett 15-tal Red-cowled Cardinals på sydgränsen av sitt utbredningsområde. I lite väl höga hastigheter for vi fram på den brasilianska landsbygden för att äntligen nå Pousada Barcelos i **São Roque de Minas** vid 20.45-tiden. Vi hoppade över middagen, gjorde vår listgenomgång och så var denna långa dag snart slut.



Måndag 23/8

Vår första heldag vid **Serra da Canastra** tillbringades nedanför högplatån med främsta målet att se den kritiskt utrotningshotade Brazilian Merganser. Det var en klar och rätt så kylig morgon. Utmed grusvägen till **Casca D'Anta** gjorde vi några stopp som gav Red-legged Seriema, sex Streamer-tailed Tyrants, ett flertal Toco Toucans, Campo Flicker, White-rumped Monjita och White-bellied Seedeater. Vid Fazenda Buteco Ra sågs Whispering Ibis, White-rumped Swallow och Giant

Cowbird innan det var dags för en första seriös skrakspaning utmed São Francisco. En traktorstig bakom fazendan ledde oss ner till den klarvattnade floden, och sedan vandrade vi en dryg kilometer nedströms medan vi noggrant letade i alla vinklar och vrår. Flera Muscovy Ducks sågs på nära håll, men det närmaste skrake vi kom var då en turkisk skådare plötsligt uppenbarade sig med en lokal guide. I rask takt, nästan halvspringande gick guiden ner till floden, lyfte kikaren och fortsatte i lika raskt tempo. Han hade sett en skrake flyga bortåt! Vi hakade givetvis på. Guiden klättrade snabbt ut på en ranglig hängbro och kunde där konstatera att skranken var en myskand. Efter en kort konversation med vår turkiske kollega, som visade sig vara doktorand i ornitologi vid Stanford University, rusade paret tillbaka mot fazendan medan vi fortsatte i ett makligt tempo nedströms. Någon skrake stod inte att finna, men vi såg bland andra Golden-capped Parakeet, Stripe-breasted Starthroat, Rufous-tailed Jacamar och Swainson's Flycatcher samt ådrog oss ett



Red-legged Seriema och Rufous-tailed Jacamar. Foton: Roger Holmberg.

betydande antal små fåstingar som noggrant plockades bort så gott det gick. Nära Casca D'Anta fanns en enkel restaurang som kunde servera lunch till 12.30. Innan dess hann vi ta en promenad in i Serra da Canastras nationalpark och beskåda det i fritt fall 144 meter höga brudslöjefallet samtidigt som vi fick suveräna obsar på häftiga Helmeted Manakins. Vi tog ett break fram till 14.15, därefter återvände vi till Casca D'Anta i jakt på skrakar och skogsfåglar. Några blommande *Inga*-träd attraherade flera arter kolibrier inklusive Frilled Coquette, Black Jacobin, Fork-tailed Woodnymph och Versicolored Emerald, i övrigt var det mycket lugnt. På återtåget stötte vi på den turkiske skådaren som kunde visa upp foton på en hona Brazilian Merganser med två ungar, han gav oss även exakta anvisningar om

lokalen. Glada i hågen satte vi fart mot parkeringen och stannade bara för en Red-ruffed Fruitcrow som flög över stigen men sedan försvann in i skogsdunklet. Tre kilometers bilfärd bort fann vi mycket riktigt en liten gård med en vänlig bonde som lät oss spana från hans ägor. Tyvärr stod ingen skrake att finna, dock tre oväntade Bare-faced Curassows och en Gray-necked Wood-Rail som spatserade omkring bland tamhönsen. Dagens sista insats gjordes vid Buteco Ra, men turen var helt enkelt inte på vår sida idag. I skymningen återvände till Pousada Barcelos och beställde hem pizzor; en lång dag var snart till ända.



Nära skjuter ingen hare – Muscovy Duck!

Tisdag 24/8

I dag skulle vi tillbringa en heldag på Serra da Canastras högplatå men startade i São Roques utkant eftersom vi inte skulle bli insläppta förrän 08.00. Det var bra fart i gräsmarker och mestadels brända buskmarker. Nyheter var bland andra Striped Cuckoo (hörd), Common Thornbird, Sharp-tailed Tyrant, Euler's Flycatcher (hörd), Gray Monjita, Curl-crested Jay, Plumbeous Seedeater, Wedge-tailed Grass-Finch och Black-throated Saltator medan trevliga repriser var till exempel Spotted Nothura, Red-legged Seriema, Toco Toucan och Campo Flicker. Några minuter efter åtta var vi framme vid parkentrén och 08.15 var allt klart för inträde. De vidsträckta gräsmarkerna på platån var huvudsakligen torra och ett jätteområde i den södra delen av parken hade brunnit, något som till och med nämndes i brasilianska nyhetsinslag. Det dröjde inte längs förrän vi såg vår första av fem hanar Cock-tailed Tyrant, och vid São Francisco-flodens källa hörde vi en Brasilia Tapaculo på bara några meters håll. Sedan fortsatte flytet med två suveräna jättemyrslokar på bra avstånd – fina studier, Greater Rhea, åtta Campo Miners, en tämligen blek Ochre-breasted Pipit, Burrowing Owl, Sharp-tailed Tyrant, Stripe-tailed Yellow-Finch och Pampas Deer. Tyvärr var Retiro das Pedras, en lokal där



Ett av världens märkligaste djur – Giant Anteater!



Vacker natur på Serra da Canastras högplatå.

Samuel hade sett Brazilian Merganser för tio år sedan, belagd med besöksförbud, varför vi fortsatte norrut och åt fältlunchen vid ett vackert vattenfall med fina vyer. Återfärden på eftermiddagen var lugn, men vi lyckades ändå hänga in en hona Black-masked Finch och ett par extremt oskygga Great Pampa-Finches. En sista insats på slutningen utanför parken gav Little Woodpecker och White-crested Tyrannulet. Nöjda och solbrända kunde vi återvända till pousadan vid 17.45-tiden och en dryg timme senare var det dags för middag på stan. Innan dess meddelade dock Sergio att man på transportfirmans kontor ogillade att vi åkte på grusvägar, något som ledde till långgrandiga diskussioner under kvällen och slutade med att bossen helt förbjöd chaufförerna att åka på grusvägar, utan att jag fick chansen att föra min talan. Absurt och frustrerande! Det hela slutade med att en lokal bil med skräkkunnig chaufför inhyrdes för morgondagens nya skrakexpedition. Sannerligen en oväntad utveckling av resan ...

Onsdag 25/8

Klockan 06.00 infann sig en glad och trevlig kille (har glömt bort hans namn) i hotellets entré, och snart var vi på väg mot **Casca D'Anta** i hans bil. Tomas och Stefan fick uteplatser medan vi andra klarade oss bra utan långkalsonger. Att vår räddare i nöden hade varit med om skrakletning förr bekräftades snart. Han stannade vid alla platser med utsikt över floden och hade sett en hona med fyra ungar för sex dagar sedan nära Casca D'Anta; det blev därför där som sökandet började på allvar. Idag stod ingen skrake att finna nedanför fallet, så jakten fortsatte systematiskt nedströms där förhållandena tillät med Plush-crested Jay som bonus. Till slut befann vi oss för tredje gången vid Buteco Ra. Idag kunde vi köra ner till floden för att spara tid, men hoppet var i stort sett ute när vi återvände mot bilen. Med bara 50 meter kvar till bilen hände det otroliga. Karl-Lennart och Lars-Olof såg samtidigt honan med de två nyflygga ungarna mitt ute i floden! Alla tillskyndade, det viftades och signalerades vilt till dem som kommit på efterkälken och Roger och Bengt-Eric fick sig ett rejält sprintlopp. Vilken skön upplösning! Mycket nöjda kunde vi återvända till Vargem Bonita vid asfaltens början där bussen väntade färdigpackad och klar. Framför oss låg nu en transport på cirka 40 mil med slutmålet Itamonte i allra sydligaste Minas Gerais. Vi åt givetvis lunch på ett self service-ställe och gjorde annars bara ett fåtal stopp utmed vägen. Vid 18-tiden checkade vi in på Hotel Tomaz i **Itamonte**. Föga anade

reseledaren att det skulle uppstå komplikationer även för morgondagens skådning, men det slutade ändå med att en bil beställdes till klockan 09.00 som specifikt skulle ta oss upp till de höglänta markerna för Itatiaia Spinetail. En ganska så bullrig natt för dem som saknade öronproppar eftersom lastbilar dundrade förbi med jämna mellanrum ...


Torsdag 26/8

Vi fick oss åter en riklig frukost, denna gång med extra höga kalorihalter då det bland annat erbjöds flera olika sockerkakor, bullar och jello. **Agulhas Negras Road** låg en halvtimmes körning bort och vi var väl framme vid 06.45-tiden. Precis när vi började vandringen uppåt vägen uppmärksammade Sergio en tygbanderoll med budskapet att vägen var avspärrad efter 8 kilometer. Anledningen till detta fick vi snart veta, det hade härjat bränder där uppe i mer än två veckor och till och med militären hade inkallats för att bekämpa elden. Den lokala arrangör som skulle bistå oss med en bil senare på morgonen visste med all sannolikhet om detta, så Sergio fick i uppdrag att vänligt men bestämt meddela chauffören att vi inte behövde bilen under dessa omständigheter (som vi borde ha blivit informerade om). Eftersom vi nu hade noll chans att se Itatiaia Spinetail koncentrerades morgonens skådning till de första kilometrarna av Agulhas Negras Road, och det blev en riktigt lyckad tillställning. Kanonobsar av Black-capped Piprites, Black-and-gold Cotinga och Plovercrest var riktiga höjdpunkter och i övrigt noterades även arter som Dusky-legged Guan, Surucua Trogon, White-spotted och Yellow-browed Woodpeckers, Sharp-billed Treehunter, Buff-browed Foliage-gleaner, Rufous-tailed och Ochre-rumped Antbirds, Rufous-tailed Antthrush, Speckle-breasted Antpitta (hörd), Mouse-colored Tapaculo, Serra do Mar Tyrannulet, Brown-breasted Bamboo-Tyrant (hörd), White-throated Spadebill, Blue Manakin, Serra do Mar Tyrant-Manakin, White-necked och Creamy-bellied Thrushes, White-rimmed Warbler, Brassy-breasted, Diademed och Fawn-breasted Tanagers, Bay-chested och Buff-throated Warbling-Finches samt Golden-winged Cacique. Muito bom! Chauffören för den beställda bilen väntade på oss vid parkeringen men fick nöja sig med en symbolisk summa pengar att ta med sig hem till Itamonte och ta resten av diskussionen med sin chef. Lunchen intogs någon mil ifrån Itatiaia stad, och vid 14.40-tiden var vi framme vid **Hotel do Ypê** i hjärtat av **Itatiaia NP**. Under resten av eftermiddagen skådade vi kring hotellet och kunde nästan genast hänga in ett par



Black-capped Piprites, Agulhas Negras Road. Foto: Roger Holmberg.

Swallow-tailed Cotingas. Wow! Andra godbitar var en mängd tama Dusky-legged Guans, Reddish-bellied Parakeet, Brazilian Ruby, Violet-capped Woodnymph, Red-breasted Toucan, Yellow-fronted Woodpecker, Yellow-legged Thrush, Olive-green och Green-headed Tanagers samt Uniform Finch. En storstilad buffé avslutade denna fina skådardag.



Dusky-legged Guan.

Schiffornis, sedan tystnade det ganska fort. Allra roligast under morgonen var att på olika ställen studera Brown Capuchins på nära håll. På nervägen stod vi och tittade i minst en kvart på hur en apa systematiskt bet och slet av palmblad för att komma åt palmhjärtat som den sedan förnöjsamt satt och mumsade på. En läcker hona Tufted Antshrike avslutade morgonsessionen, och snart följde givetvis en hejdundrandes buffé. Sergio och Elizeu hade det lugnt och skönt, men på eftermiddagen var det dags att en gång för alla göra upp med transportfirman om grusvägskörningens vara



Saffron Toucanet. Foto: Roger Holmberg.



En företagsam Black Capuchin. Foto: Roger Holmberg.

eller icke vara. Sergio var till god hjälp och Priscila på kontoret förstod att situationen var ohållbar. Det hela slutade i någorlunda samförstånd och skulle säkert lösa sig helt inom en snar framtid. Huruvida Sergio skulle vara med ytterligare två dagar eller om istället Elizeu skulle åka hem förblev dock oklart. Eftermiddagspasset blev en ganska så lugn historia med mestadels repriser, men vi kunde åtminstone addera Streak-capped Antwren, Sepia-capped Flycatcher och Eared Pygmy-Tyrant (Sandbergs). När vi kom tillbaka till hotellet hade Sergio redan åkt mot São Paulo. Ett par timmar senare

anlände Rafael Fortes som jag anlitat som guide för resans sista vecka. Han visade sig vara en ganska tystlåten men stabil och trevlig ung man. Rafael kunde skönt nog bekräfta att grusvägsproblemet definitivt var löst, och snart satt vi och smed detaljerade planer för morgondagen. Det här kändes verkligen bra!

Lördag 28/8

Omedelbart efter frukosten hittade Rafael en suverän hona Large-tailed Antshrike som hoppade utanför restaurangen, och detta var bara början på ett par fina timmar i parken innan vi fortsatte söderut. En Rufous-capped Motmot vid vägkanten ledde till en hörd White-bearded Antshrike och en helt fantastisk uppvisning av upp till sex spelande Blue Manakins, nästa stopp gav White-bibbed Antbird och vi avslutade med några bleka men ovanliga Buffy-fronted Seedeaters som satt och käkade bambufrön. Sedan var det hög tid att fortsätta eftersom **Perequê** låg tre timmars bilfärd bort. Elizeu körde som ett skållat troll, men vi kom fram helskinnade och det rådande mulna vädret (vi hade knappt sett ett moln tidigare under resan) var helt perfekt. Black-hooded Antwren satt som en smäck, och vi kunde under vårt korta besök även kamma in Orange-eyed Thornbird, Tufted och Chestnut-backed Antshrikes, White-bearded Manakin, Gray-hooded Attila, Orange-headed och Brazilian Tanagers samt Chestnut-vented Conebill. Nice! Som vanligt åt vi lunch på en self service-restaurang, och vid ankomsten till dagens slutmål **Ubatuba** begav vi oss direkt ut i fält till **Fazenda Angelim**. Under en och en halv timme noterade vi sådana godbitar som Black-cheeked Gnateater, Spotted Bamboowren (hörd), Gray Elaenia, Buff-throated Purpletuff och Long-billed Gnatwren. En ny chaufför skulle ersätta Elizeu, så för att på bästa sätt koordinera detta åkte vi till hotellet vid 17-tiden. Lenin visade sig vara bättre på alla sätt och vis, så det var onekligen ett bra byte! På kvällen åt vi pizzabuffé. Särskilt efterrättspizzorna rönt uppmärksamhet, för vem hade tidigare ätit pizza med glass, chokladsås och jordgubbar? Nöjda återvände vi till hotellet för nattens vila.



Plain-winged Woodcreeper. Foto: Roger Holmberg.


Rafael var mycket mån om att vi skulle få se Slaty Bristlefront, men trots en stunds duellerande visade vårt playbackoffer inget intresse att komma fram ur skogsdunklet. Annars gick det utmärkt med obsar av Reddish Hermit, Green-backed Trogon, White-barred Piculet, Blond-crested Woodpecker, White-eyed och Black-capped Foliage-gleaners, Rufous-winged, Streak-capped och Unicolored Antwrens, Scaled Antbird, Variegated Antpitta (hörd), Sharpbill, Bare-throated Bellbird samt Red-necked, Flame-crested, Azure-shouldered och Rufous-headed Tanagers. Ytterligare feederspaning följde, och innan vi tackade för oss upptäcktes en ovanlig White-necked Hawk kretsa på ganska långt håll. Good! Vi åt lunch på en restaurang som även serverade mat till våra befjädrade vänner, vilket resulterade i kanonobsar på Plain Parakeet, Yellow-fronted Woodpecker och Red-necked

Söndag 29/8

Morgonens mål var **Folha Seca** en knapp halvtimme söderut, och omedelbart vid ankomsten till "Jonas's place" var skådningen i full gång kring frukt- och hummingbird feeders. Närobsar bjöds på sådana lækkerheter som Saw-billed Hermit, Festive Coquette, Violet-capped Woodnymph, Blue Dacnis, Green Honeycreeper, Chestnut-bellied Euphonia och Green-headed Tanager. Snart gav vi oss ut på skogsvägen i jakt på Folha Secas specialarter och plockade in den ena arten efter den andra.



Black-cheeked Gnateater.



Vilken fågel! Red-necked Tanager kalasar. Foto: Roger Holmberg.

Måndag 30/8

Denna dag började med ett återbesök till **Folha Seca**. Längs infartsvägen stötte vi på tre skådare varav en såg misstänkt bekant ut. Jomenvisst var det **Ciro Albano**, superguiden från nordöstra Brasilien! Ett trevligt återseende. Sällskapet hade deltagit i en stor ornitologisk kongress i Campos do Jordão, den stad vi själva var på väg till. Framme hos Jonas var det fullt med annat folk från kongressen, så vi hade inte direkt skogen för oss själva. Vid Bristlefrontstället stod redan ett gäng och lockade, det visade sig senare både att de lyckades se fågeln samt att det var en delegation från



Saw-billed Hermit. Foto: Roger Holmberg. Nedan: Blue Dacnis.

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Skapligt oväntat! Nya fåglar blev bland andra Spot-billed Toucanet (hörd), Pale-browed Treehunter, Grayish Mourner och São Paulo Tyrannulet. På tillbaka-vägen lirkade vi fram en Long-billed Wren, och efter tips från **Ciro** lyckades alla efter mycket om och



men få mer eller mindre fina obsar på en Spotted Bamboowren inne i ett tätt snår. Way to go! Nöjda kunde vi nu fortsätta mot **Campos do Jordão** med det obligatoriska bufféstoppet utmed vägen. Vi nådde den centraleuropeiskt inspirerade bergsstad på eftermiddagen och gav oss genast ut i fält i de araucariadominerade skogsomgivningarna. Huvudmålarten var den ovanliga Vinaceous Amazon som förhoppningsvis skulle dyka upp mot kvällen. Under tiden passade vi på att hänga in Araucaria Tit-Spinetail, White-spotted Woodpecker, Scalloped Woodcreeper, White-crested

Tyrannulet, Black-throated Trogon (hörd) och ett par malplacerade Long-tailed Reed-Finches. Tre amazoner sågs sedermera som hastigast på långt håll, men de flesta såg dem inte överhuvud taget. Bättre lycka i morgon. Vi övernattade på en Dom Bosco-anläggning och åt burgare alternativt soppa på ett snabbmatställe. Natluften var sval liksom temperaturen på rummen, men duschen var skön!



Gräsmarker med inslag av araucaria nära Campos do Jordão.

Tisdag 31/8

Det blev visst ett mindre missförstånd angående frukosten denna morgon, men vad gjorde det när vi fick se en Collared Forest-Falcon helt öppet i den väldiga trädgården och senare fick kanonobsar på flertalet Vinaceous Amazons på två olika lokaler. Gott! Andra trevligheter var Brazilian Teal, Sharp-tailed Streamcreeper, Swallow-tailed Cotinga, Greenish Tyrannulet, Southern Yellowthroat, Buff-throated Warbling-Finch och en kvick Neotropical River Otter i en sunkig bäck. Trots att klockan tickade på alldeles för snabbt hann vi med en sväng till Pedra do Baú, en väldig granitformation, och fick här se arter som Sick's Swift, Dusky-tailed Antbird (en riktig skulkare!), Brown-chested Martin och Hellmayr's Pipit medan ett par Giant Antshrikes höll sig helt utom synhåll. Vid 11-tiden återvände vi till stan och fortsatte sedan söderut för en sju timmars transport mot den hägrande Intervalles SP som enligt hörsägen skulle hysa nästan alla hittills missade arter och väldigt många nya därtill. Men först



Buff-throated Warbling-Finch. Foto: Roger Holmberg.

skulle vi försöka se den obeskrivna São Paulo Antwren i en våtmark nära **São José dos Campos** (en av några få kända lokaler för arten). Vi fick se ett par under utmärkta förhållanden och fick dessutom in bonusfåglar i form av Brown Tinamou för några, Orange-breasted Thornbird och Black-capped Donacobius. Under sena eftermiddagen körde vi rakt igenom **São Paulo**, denna groteskt stora betongdjungel, och nådde **Intervalles** först ett par timmar efter mörkrets inbrott. Det bjöds genast på

middag, och sedan var det äntligen dags för inkvartering. Ett stort hus skulle stå till vårt förfogande, men efter några förvirrade minuter insåg vi att vi blivit hänvisade till fel hus! Misstaget rättades snabbt till, och när väl listan var avklarad kunde vi snart sova och drömma om alla ovanliga fåglar vi skulle få se de kommande dagarna vid Intervales.



Black-throated Grosbeak. Foto: Roger Holmberg.

Onsdag 1/9

Efter frukosten 05.45 denna reseledarens namnsdag var det så äntligen dags för första skådarsvängen vid Intervales. Med oss hade vi förutom Rafael även den lokale guiden Bertinho, som visade sig vara både kunnig och skarpögd. Med så kompetenta kollegor kände man sig aningen överflödig, men nog gjorde även jag några goda upptäckter. Intervales visade genast prov på sina högkvalitativa fåglar i form av Blue-bellied Parrot, White-bearded Antshrike, White-collared Foliage-gleaner, Uniform Finch och en hörd Three-striped Flycatcher. Sedan fortsatte

det i samma stil! Under resten av morgonen kunde vi notera Black-and-white Hawk-Eagle, Black-fronted Piping-Guan, Pavonine Cuckoo (hörd), Dusky-throated Hermit, Crescent-chested Puffbird, Ochre-collared Piculet, Giant Antshrike, Oustalet's och Bay-ringed Tyrannulets, Eared Pygmy-Tyrant, Eastern Sirystes, Wing-barred Piprites, Hooded Berryeater, Chestnut-crowned Becard, Azure-shouldered, Brown, Brassy-breasted och Rufous-headed Tanagers, Black-throated Grosbeak, Half-collared Sparrow samt Brown Howler Monkey. Dessutom hittades en Fer-de-lance, Sydamerikas näst giftigaste orm, ligga blickstill mitt på vägen. Respekt! Efter lunch fick vi en välbehövlig siesta fram till 15.00, sedan följde en promenad på några kortare skogsstigar. Aktiviteten var som väntat betydligt beskedligare än på morgonen, dock kunde vi håva in ytterligare godbitar i form av Black Hawk-Eagle, White-rumped Hawk, Spot-winged Wood-Quail (hörd), Plovercrest, Rufous-capped Antshrike, Dusky-tailed Antbird, Slaty Bristlefront (sedd!) och Hangnest Tody-Tyrant. Vi stannade till skymningen i hopp om att få se den exklusiva Long-trained Nightjar. Tyvärr behagade ingen skärre visa upp sig, däremot fick vi se en Crab-eating Fox på nära håll. Den enda uggla vi lyckades få i gång var en Tropical Screech-Owl som slutligen också sågs fint. Middag och artlista (totalen räknades till 396 arter) avslutade denna lyckade dag.



Poserande Black-capped Foliage-gleaner.

Torsdag 2/9

Dag två vid Intervales hade samma tidsmässiga upplägg som dag ett, men vi besökte nya områden. Morgonen bjöd på många trevliga fåglar, kanske inte fullt i klass med gårdagen men inte långt ifrån. Nya arter var White-browed Foliage-gleaner, Star-throated Antwren, Bertoni's Antbird, White-breasted Tapaculo (hörd) och Rufous-breasted Leaf Tosser medan Black-throated Trogon, Squamate Antbird och Three-striped Flycatcher hamnade i kategorin (väl) sedda fåglar. Bland övriga godbitar bör nämnas Blue-bellied Parrot, Ochre-collared Piculet, White och White-spotted Woodpeckers, Sharp-billed Treehunter, Scalloped och White-throated Woodcreepers, Giant Antshrike, Oustalet's och São Paulo Tyrannulets, Spotted Bamboowren (sedd av några), Rufous Gnateater, Bare-throated Bellbird, Hooded Berryeater, Sharpbill, Blue Manakin, Rufous-crowned




Den mycket lokala Black-fronted Piping-Guan. Foto: Roger Holmberg.

Greenlet och Olive-green Tanager. Dagens orm var ogiftig men enligt uppgift aggressivt lagd! När det var dags för lunch höll man på att montera ner hela restaurangen; middagen skulle serveras i ett annat hus. Rikligt med mat fick vi ändå! Efter siestan gav vi oss ånyo ut i skogen och marscherade på rätt bra under Bertinhos ledning. Atlantic Royal-Flycatcher var en av målarterna, men vi fick nöja oss med att se ett fjolårsbo samt fåglar som Black-billed Scythebill, Blond-crested Woodpecker, Spot-backed

Antshrike och Rough-legged Tyrannulet. I de öppnare markerna kring parkbyggnaderna kunde vi addera kolobrier av flera arter, Tropical Screech-Owl på dagkvist, Rufous-capped Antshrike, White-breasted Tapaculo (kanon!), Fuscous Flycatcher och Chestnut-backed Tanager. Inte heller denna kväll blev det någon Long-trained Nightjar, istället fick vi höra Tawny-browed Owl och se en Red Brocket Deer. Den nya restaurangen var till allmän belåtenhet och maten smakade alldeles utmärkt. Skönt att så småningom få ta sig en dusch och gå till sängs efter ytterligare en rejäl dag i fält.

Fredag 3/9

Reseledaren vaknade rejält stel i kroppen och fick en fysiskt ganska jobbig morgon. Övriga verkade vara i bättre vigör. En Variable Screech-Owl hördes under frukosten men tystnade tyvärr tvärt och var inte intresserad av playback. Vi vandrade först på ett par skogsstigar i jakt på den gäckande Atlantic Royal-Flycatcher och belönades med White-rumped Hawk, Black-throated Trogon, Sharp-tailed Streamcreeper, Buff-browed Foliage-gleaner, Gray-bellied Spinetail, Star-throated Antwren, Short-tailed Antthrush



Mata Atlântica, Intervaes. Foto: Roger Holmberg.

(hörd), Gray-hooded Attila, Red-ruffed Fruitcrow (hörd), Riverbank Warbler och ett nytt fjolårsbo av målarten. Vi fortsatte sedan till lokalen från första morgonen, Carmo road, och fick ytterligare trevlig skådning. Nya arter blev sådana godbitar som Solitary Tinamou (hörd), Mantled Hawk, Least Pygmy-Owl, Sooty Swift och Cinnamon-vented Piha medan repriserna innefattade fyra Black-fronted Piping-Guans, en Pavonine Cuckoo som svarade på playback och liknade en minihoatzin i flykten, Sick's Swift, Green-backed Trogon, Crescent-chested Puffbird, Green-barred Woodpecker, Spot-breasted Antwren, Streak-capped Antwren, Bay-ringed Tyrannulet och Olive-green Tanager. Vår egen "Snake man" L-O hittade även denna dags Fer-de-lance i vägkanten. Den efter lunchen påföljande siestan var ytterst välbehövlig! Eftermiddagens exkursion tog oss till en ny väg genom ytterligare fin primärskog. Bästa arten blev utan tvekan den sällsynta Southern Muriqui som har en total population på max. 1 000 individer och enligt Rafael skulle vara Nya världens största apa. I fågelväg kan nämnas obsar av

Ochre-breasted Foliage-gleaner, White-bearded Antshrike, Hooded Berryeater och Serra do Mar Tyrant-Manakin. Vårt tredje och sista försök att se Long-trained Nightjar misslyckades, men vi kunde ändå vara rätt så nöjda eftersom både Scissor-tailed Nightjar och Barn Owl oväntat flög förbi på nära håll. Sista kvällen med gänget ...

Lördag 4/9

Idag hade vi en kvarts sovmorgon, men 05.55 knackade Roger på dörren och lät meddela att "nattskärnan" hade siktats utanför huset. Gruppen mobiliserades blicksnabbt! Bertinho hade sett ett par av Long-trained Nightjar när han anlände till *Pica Pau*, och med hjälp av playback fick vi se hanen flyga förbi fint två gånger i halvdunklet. Kanonhäftigt – vilken upphämtning! Vad gällde frukosten hade det uppenbarligen skett ett missförstånd eftersom restaurangen var igenbommad, men vi skulle ändå skåda i de närmaste omgivningarna och kunde bänka oss vid 06.45. Sista morgonen var fågelrik och gav bland andra Rufous-thighed Kite (korekt bestämd efter en hel del diskussion), Gray Hawk, Rufous-sided Crake, Orange-breasted Thornbird, Gray-throated Warbling-Finch och den luriga Green-chinned Euphonia. Efter att ha packat in i bussen och betalat för vår vistelse tackade vi Bertinho för en god insats och styrde kosan mot **São Paulo**. Vi åt ännu en brasiliansk buffé någon mil från flygplatsen och infann oss i mycket god tid före Rogers avgång mot Amsterdam vid 19-tiden. Lenin och Rafael avtackades, och efter att ha gjort en sista listgenomgång började gruppen gå åt olika håll. Karl-Lennart, Bengt-Eric och Samuel skulle vidare till södra Brasilien med start i Curitiba och övriga skulle hem via Frankfurt vid 22.20. För den fortsättande trion gick allt problemfritt, och vi kunde vid 22-tiden checka in på Hotel Exclusivo i São José dos Pinhais bara någon kilometer från Curitiba flygplats.

Söndag 5/9

Hemvändarnas respektive resor förflöt enligt uppgift väl, och alla landade i fäderneslandet någon gång på eftermiddagen eller kvällen. En sammanfattning av trions öden och äventyr i södra Brasilien följer nedan!



Här har vi hela gruppen! Stefan, Bengt-Eric, Karl-Lennart, Lars-Olof, Roger, Tomas, Rafael, Samuel och Bertinho. Bakom Rogers kamera står Lenin.

Extension: Curitiba och Río Grande do Sul

Under en vecka 5-12/9 utforskades några områden i södra Brasilien, dels i Paraná/Santa Catarina nära Curitiba och dels i Rio Grande do Sul. Målsättningen var att se ett antal svåra och/eller lokala regionala endemer samt att få uppleva brasiliansk pampas med sina stora mängder våtmarksfåglar.

Vi började som nämnts ovan med att flyga till Curitiba. Strax utanför staden letade vi efter den ytterst lokala Marsh Tapaculo, ett företag som tyvärr misslyckades. Istället fick vi nöja oss med Freckle-breasted Thornbird och Olive Spinetail m.fl. Vitsandskogarna (=restinga) vid Volta Velha nära kusten gav däremot så gott som full pott: Restinga Tyrannulet, Kaempfer's Tody-Tyrant och Black-backed Tanager plus Paraná Antwren i en närbelägen våtmark.

På kvällen den 6 september flög vi till Porto Alegre och fortsatte nästa morgon till Cassino vid kusten 10 mil från den uruguayanska gränsen. Längs med vägen sågs såväl Ringed Teal som en mycket oväntad hona av Yellow Cardinal som flög upp från vägkanten. Våtmarkerna kring Cassino och Taim var fulla med Coscoroba Swans, Southern Screamers, White-faced Ibises och många andra arter såsom Great och White-tufted Grebes, Pinnated Bittern, Black-necked Swan, Silver Teal, Yellow-billed Pintail, Rosy-billed Pochard, Chilean Flamingo, Long-winged och Cinereous Harriers, Snail Kites i mängder, Snowy-crowned Tern, Brown-hooded Gull, American Golden-Plover, Wilson's Phalarope, Curve-billed Reedhaunter, Wren-like Rushbird, Spectacled och Yellow-browed Tyrants, White Monjita, Chestnut-capped Blackbirds i tusenden samt Scarlet-headed Blackbird. Ett par kortare havsfågelspan gav en obestämd albatross, juvenila Southern Giant-Petrels på nära håll och ett par Chilean Skuas.



Taims vidsträckta våtmarker.

De sista dagarna tillbringades i bergen norr om Porto Alegre kring São Francisco de Paula. Trots att vi var här tidigt på säsongen och dessutom fick en del regn (som vi ju undslapp under resan i övrigt) lyckades vi riktigt bra. Den häftigaste obsen var utan tvekan när vi i solnedgångsljus fick se ett par Black-and-white Monjitas leda en flock på hela 85 Saffron-cowled Blackbirds på "bete" – helt magnifikt! Andra godbitar var Plovercrest, Mottled Piculet, Straight-billed Reedhaunter, Striolated och



Araucaria Tit-Spinetails, Long-tailed Cinclodes, Canebrake Groundcreeper (hörd), Brown-breasted Bamboo-Tyrant och Lesser Grass-Finch. Dessutom fick vi beskåda en mäktig kanjon i Aparados da Serra NP.

Sista dagen började med lagning av ett punkterat däck men vi hade inga problem att hinna med flyget till São Paulo och sedan Frankfurt–Köpenhamn/Göteborg. Under veckan noterades 231 arter fåglar och slutsumman för hela resan hamnade på 511 arter.

Bilderna: Brown-hooded Gull, Southern Screamer, Coscoroba Swan, Long-tailed Cinclodes, Black-and-white Monjita (hona) samt vy från Aparados da Serra NP.

Artlista

RHEIDAE

Greater Rhea *Rhea americana* (nt) 24/8 2 ex. Serra da Canastra.

TINAMIDAE

Solitary Tinamou *Tinamus solitarius* (nt) 3/9 2 sj. Intervalles.

Brown Tinamou *Crypturellus obsoletus* 21/8 2 sj. Caraca, 26/8-4/9 1-4 sj. dagligen, 31/8 1 ex. São José dos Campos, 5/9 1 sj. São José dos Pinhais, 12/9 1 sj. São Francisco de Paula.

Yellow-legged Tinamou *Crypturellus noctivagus* (nt) 5/9 2 sj. Volta Velha.

Red-winged Tinamou *Rhynchotus rufescens* 24/8 1 sj. Serra da Canastra, 10/9 1 sj., 11/9 1 sj. Cambará do Sul.

Spotted Nothura *Nothura maculosa* 20/8 1 ex. Serra do Cipó, 24/8 4 ex.+1 sj. Serra da Canastra.

PODICIPEDIDAE

Pied-billed Grebe *Podilymbus podiceps* 22/8 2 ex. Bom Despacho–Luz, 8/9 8 ex. Taim, 9/9 2 ex. Cassino.

White-tufted Grebe *Rollandia rolland* 7/9 2 ex. Cassino, 8/9 ca 10 ex. Taim.

Great Grebe *Podiceps major* 7/9 ca 40 ex., 8/9 2 ex. Cassino, 8/9 ca 10 ex. Taim, 9/9 1 ex. Pelotas–Camaquã.

DIOMEDEIDAE

Black-browed Albatross *Thalassarche melanophrys* (EN) ?? 8/9 1 troligt ex. Cassino.

PROCELLARIIDAE

Southern Giant-Petrel *Macronectes giganteus* 7/9 6 juv., 8/9 minst 6 juv. Cassino.

PHALACROCORACIDAE

Neotropic Cormorant *Phalacrocorax brasilianus* 21/8 1 ex. Cipó–Belo Horizonte, 22/8 2 ex. Bom Despacho–Luz, 29/8 1 ex. Ubatuba, 4/9 ca 40 ex. Guarulhos, 7-9/7 20-50 ex. dagligen södra i södra Rio Grande do Sul, 9/9 1 ex. São Francisco de Paula.

FREGATIDAE

Magnificent Frigatebird *Fregata magnificens* 28/8 ca 100 ex. Angra dos Reis–Ubatuba, 29/8 5 ex., 30/8 5 ex. Ubatuba, 5/9 1 ex., 6/9 3 ex. Itapoá.

ARDEIDAE

Whistling Heron *Syrigma sibilatrix* 23/8 3 ex., 25/8 2 ex. Serra da Canastra, 6/9 2 ex. Volta Velha, 7/9 1 ex., 9/9 1 ex. Cassino, 8/9 1 ex. Taim, 9/9 1 ex. Pelotas–Camaquã, 10/9 8 ex., 11/9 1 ex. kring São Francisco de Paula.

Cocoi Heron *Ardea cocoi* 22/8 2 ex. Bom Despacho–Luz, 30/8 1 ex. V Taubaté, 7/9 2 ex. Pelotas–Cassino, 8/9 ca 15 ex. Taim, 9/9 2 ex. Cassino, 5 ex. Cassino–Camaquã, 12/9 1 ex. Porto Alegre.

Great Egret *Ardea alba* Sedd under 14 dagar, mest i mindre antal men med 50 ex. V Taubaté 30/8 och 100-tals fåglar i Rio Grande do Sul.

Snowy Egret *Egretta thula* Sedd under 12 dagar med max. 20-30 ex. vid Taim 8/9.

Cattle Egret *Bubulcus ibis* Tämligen allmän, sedd under 15 dagar med max. 75 ex.

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax* 22/8 4 ad. Bom Despacho–Luz.

Rufescent Tiger-Heron *Tigrisoma lineatum* 8/9 2 ad. Taim, 9/9 1 ex. Pelotas–Camaquã.

Pinnated Bittern *Botaurus pinnatus* 8/9 1 ex. Taim.

CICONIIDAE

Maguari Stork *Ciconia maguari* 7/9 3 ex. Pelotas/Cassino, 8/9 ca 25 ex. Taim, 9/9 ca 15 ex. Cassino–Camaquã.

THRESKIORNITIDAE

Plumbeous Ibis *Theristictus caerulescens* 8/9 2 ex. Taim.

Buff-necked Ibis *Theristictus caudatus* 23/8 2 ex., 24/8 3 ex. Serra da Canastra, 2/9 1 hörd Intervales, 10/9 2 ex. Cambará do Sul.

Whispering Ibis *Phimosus infuscatus* 23/8 3 ex. Serra da Canastra, 7/9 1 ex. Pelotas, 8/9 1 ex. Taim, 9/9 2 ex. Pelotas–Porto Alegre, 12/9 ca 20 ex. Porto Alegre.

White-faced Ibis *Plegadis chihi* 7-9/9 200-500 ex. dagligen i södra Rio Grande do Sul.

Roseate Spoonbill *Platalea ajaja* 30/8 6 ex. V Taubaté, 7/9 5 ex. Camaquã–Pelotas, 8/9 5 ex. Taim, 9/9 1 ex. längs med vägen.

PHOENICOPTERIDAE

Chilean Flamingo *Phoenicopterus chilensis* (nt) 8/9 ca 150 ex. Taim.

ANHIMIDAE

Southern Screamer *Chauna torquata* 7/9 5 ex. S Camaquã, ca 20 ex. Pelotas, 8/9 minst 300 ex. Taim, 9/9 ca 15 ex. Pelotas, 3 ex. Pelotas–Camaquã. Fantastiska mängder!

ANATIDAE

White-faced Whistling-Duck *Dendrocygna viduata* 22/8 ca 40 ex. Bom Despacho–Luz, 7/9 5 ex. Pelotas, 8/9 ca 10 ex. Taim, 9/9 2 ex. Cassino, 12/9 2 ex. Porto Alegre.

Black-bellied Whistling-Duck *Dendrocygna autumnalis* 22/8 3 ex. Bom Despacho–Luz.

Black-necked Swan *Cygnus melanocoryphus* 8/9 16 ex. Taim, 9/9 2 ex. Pelotas. Yes!

Coscoroba Swan *Coscoroba coscoroba* 7/9 9 ex., 9/9 ca 20 ex. Pelotas, 8/9 ca 400 ex. Taim.

Muscovy Duck *Cairina moschata* 22/8 3 ex. Bom Despacho–Luz, 23/8 5-7 ex., 25/8 3 ex. Serra da Canastra.

Ringed Teal *Callonetta leucophrys* 7/9 2 par S Camaquã. Läckert!

Brazilian Teal *Amazonetta brasiliensis* 22/8 ca 10 ex. Bom Despacho–Luz, 31/8 4 ex. Campos do Jordão, 5/9 2 ex., 6/9 2 ex. São José dos Pinhais, 5-6/9 2 ex. N Garuva, 7/9 5 ex. S Camaquã, 7/9 ca 15 ex., 9/9 ca 10 ex. Cassino, 8/9 ca 10 ex. Taim, 9/9 ca 10 ex. Pelotas–Porto Alegre.

Speckled Teal *Anas flavirostris* 7/9 2 ex. Cassino.

Yellow-billed Pintail *Anas georgica* 7/9 ca 10 ex., 9/9 ca 5 ex. Cassino, 8/9 4 ex. Taim, 10/9 3 ex. Cambará do Sul.

Silver Teal *Anas versicolor* 7/9 ca 15 ex., 9/9 ca 10 ex. Pelotas/Cassino, 8/9 ca 25 ex. Taim.

Rosy-billed Pochard *Netta peposaca* 8/9 4 ♂, 2 ♀ Taim.

Brazilian Merganser *Mergus octosetaceus* **(CR)** 25/8 1 ♀, 2 juv. Serra da Canastra. Underbart!

CATHARTIDAE

Turkey Vulture *Cathartes aura* Tämligen allmän, noterad under 19 dagar.

Lesser Yellow-headed Vulture *Cathartes burrovianus* 9/9 1 ex. Pelotas–Camaquã (SH).

Black Vulture *Coragyps atratus* Oftast allmän, sedd under 22 dagar.

King Vulture *Sarcoramphus papa* 20/8 2 ad. Serra do Cipó, 25/8 3 ad. Serra da Canastra.

ACCIPITRIDAE

Swallow-tailed Kite *Elanoides forficatus* 30/8 1 ex. V Taubaté.

Pearl Kite *Gampsonyx swainsonii* 23/8 1 ex. Serra da Canastra.

White-tailed Kite *Elanus leucurus* 30/8 1 ex. V Taubaté, 4/9 1 ex. längs med vägen, 6/9 1 ex. São José dos Pinhais.

Snail Kite *Rostrhamus sociabilis* 7/9 3-4 ex., 9/9 1 ad. Cassino, 8/9 minst 150 ex. Taim.

Rufous-thighed Kite *Harpagus diodon* 4/9 1 ad. Intervales.

Plumbeous Kite *Ictinia plumbea* 23/8 1 ad. Serra da Canastra, 4/9 1 ad. Intervales.

Long-winged Harrier *Circus buffoni* 7/9 1 ex. Pelotas, 7/9 3 ex., 9/9 3 ex. Cassino, 8/9 ca 10 ex. Taim, 9/9 1 ex. Pelotas–Camaquã. Flera riktigt fina obsar!

Cinereous Harrier *Circus cinereus* 9/9 1 ♂ Cassino.

Rufous-thighed Hawk *Accipiter (striatus) erythronemius* 28/8 1 ex. Itatiaia–Angra dos Reis, 4/9 1 ex. Intervales.

White-necked Hawk *Leucopternis lacerlunata* **(VU)** 29/8 1 ex. Folha Seca. En ganska så svårsedd art.

Mantled Hawk *Leucopternis polionota* **(nt)** 3/9 2 ex. Intervales.

Great Black-Hawk *Buteogallus urubitinga* 23/8 2 ad. Serra da Canastra.

Savanna Hawk *Buteogallus meridionalis* 21/8 1 ex. Serra do Cipó, 22/8 2 ex. längs med vägen, 23/8 1 ex., 24/8 1 ex. Serra da Canastra, 25/8 5 ex. längs med vägen, 7/9 1 ex. Cassino.

Black-chested Buzzard-Eagle *Geranoaetus melanoleucus* 24/8 1 ad. Serra da Canastra.

Gray Hawk *Buteo nitidus* 4/9 1 juv. Intervalles.

Roadside Hawk *Buteo magnirostris* Sedd med 1-5 ex. under 17 dagar.

White-rumped Hawk *Buteo leucorrhous* 2/9 1 ex., 3/9 2 ex. Intervalles.

Short-tailed Hawk *Buteo brachyurus* 28/8 1 mörk Perequê, 5/9 1 mörk Volta Velha.

White-tailed Hawk *Buteo albicaudatus* 22/8 2 ex. längs med vägen, 23/8 1 ex., 24/8 5 ex. Serra da Canastra, 25/8 1 ex. längs med vägen, 30/8 1 ex. Campos do Jordão, 1/9 1 ex., 4/9 1 ex. Intervalles.

Black Hawk-Eagle *Spizaetus tyrannus* 1/9 1 ad. Intervalles.

Black-and-white Hawk-Eagle *Spizaetus melanoleucus* 1/9 1 ex. Intervalles.

FALCONIDAE

Yellow-headed Caracara *Milvago chimachima* Sedd under 12 dagar med 1-10 ex.

Chimango Caracara *Milvago chimango* Vanlig i Rio Grande do Sul, sedd dagligen 7-11/9 med 20-40 ex.

Southern Caracara *Caracara plancus* Tämligen allmän—allmän, sedd under 22 dagar med max. 50 ex.

Laughing Falcon *Herpetotheres cachinnans* 6/9 2 hörda Volta Velha.

Barred Forest-Falcon *Micrastur ruficollis* 27/8 1 hörd, 28/8 2 hörda Itatiaia, 1/9 3 hörda, 2/9 4 hörda, 3/9 2 hörda Intervalles, 10/9 1 hörd São Francisco de Paula.

Collared Forest-Falcon *Micrastur semitorquatus* 31/8 1 ad. Campos do Jordão.

American Kestrel *Falco sparverius* Sedd under 10 dagar med 1-5 ex.

CRACIDAE

Speckled Chachalaca *Ortalis guttata* 22/8 1 sj. Caraca.

Rusty-margined Guan *Penelope superciliaris* 21/8 8 ex., 22/8 2 ex. Caraca, 23/8 1 ex. Serra da Canastra.

Dusky-legged Guan *Penelope obscura* 26/8 2 ex. Agulhas Negras Rd., 26-28/8 10-20 ex. dagligen Itatiaia, 1-4/9 1-4 ex. dagligen Intervalles, 6/9 1 ex. Volta Velha, 11/9 1 hörd Aparados da Serra, 12/9 4 ex. São Francisco de Paula.

Black-fronted Piping-Guan *Pipile jacutinga* (EN) 1/9 2 ex., 2/9 1 hörd, 3/9 4 ex. Intervalles. Yes!

Bare-faced Curassow *Crax fasciolata* 23/8 1 ♂, 2 ♀ Serra da Canastra.

ODONTOPHORIDAE

Spot-winged Wood-Quail *Odontophorus capueira* 1/9 4 sj., 2/9 6 sj., 3/9 4 sj. Intervalles.

ARAMIDAE

Limpkin *Aramus guarauna* 7/9 20 ex. Pelotas–Cassino, 7/9 10 ex., 9/9 10 ex. Cassino, 8/9 ca 200 ex. Taim.

RALLIDAE

Rufous-sided Crane *Laterallus melanophaius* 4/9 minst 1 ex. Intervalles.

Gray-necked Wood-Rail *Aramides cajanea* 23/8 1 ex., 25/8 1 ex. Serra da Canastra, 25/8 1 sj. São Roque de Minas (SH).

Giant Wood-Rail *Aramides ypecaha* 7/9 2 ex. S Camaquã, 7/9 3 ex., 9/9 2 ex. Cassino, 8/9 8 ex. Taim.

Slaty-breasted Wood-Rail *Aramides saracura* 26/8 4 ex. Itamonte–Aguilhas Negras, 26/8 1 ex., 28/8 3 ex. Itatiaia, 29/8 1 sj., 30/8 1 ex. Folha Seca, 31/8 3 ex. Campos do Jordão, 1/9 2 ex., 3/9 2 ex. Intervales, 5/9 2 ex., 6/9 2 ex.+1 sj. Volta Velha, 10/9 1 ex.+1 sj., 11/9 1 ex.+1 sj. São Francisco de Paula.

Blackish Rail *Pardirallus nigricans* 21/8 2 ex., 22/8 1 ex. Caraca, 23/8 1 ex. Serra da Canastra, 31/8 1 hörd Campos do Jordão, 5/9 1 hörd São José dos Pinhais.

Common Gallinule *Gallinula galeata* 22/8 ca 100 ex. Bom Despacho–Luz, 1/9 1 ex. Intervales, 5/9 2 ex, 6/9 ca 15 ex. São José dos Pinhais, 6/9 3 ex. Itapoá–Garuva, 7/9 ca 300 ex., 8/9 ca 250 ex., 9/9 ca 20 ex. södra Rio Grande do Sul, 10/9 2 ex. Cambará do Sul. Observera att Nya världens rörhöns nu utgör en egen art.

Spot-flanked Gallinule *Gallinula melanops* 7/9 6 ex., 9/9 2 ex. Cassino, 8/9 1 ex. Taim.

White-winged Coot *Fulica leucoptera* 7/9 1 ex. Cassino, 8/9 ca 70 ex. Taim.

Red-gartered Coot *Fulica armillata* 8/9 2 ex. Taim.

Red-fronted Coot *Fulica rufifrons* 8/9 ca 20 ex. Taim.

CARIAMIDAE

Red-legged Seriema *Cariama cristata* 21/8 2 sj. Serra do Cipó, 22/8 1 ex.+1 sj. Caraca, 23/8 5 ex.+5 sj., 24/8 5 ex.+3 sj., 25/8 2 ex.+2 sj. Serra da Canastra, 31/8 1 sj. Campos do Jordão, 10/9 5 ex., 11/9 1 sj. Cambará do Sul. Finfina obsar!

JACANIDAE

Wattled Jacana *Jacana jacana* 22/8 ca 20 ex. Bom Despacho–Luz, 5/9 2 ex., 6/9 4 ex. São José dos Pinhais, 6/9 1 ex. Garuva–Curitiba, 7-9/9 10-50 ex. dagligen i södra Rio Grande do Sul, 11/9 1 ex. Tainhas.

RECURVIROSTRIDAE

White-backed Stilt *Himantopus (mexicanus) melanurus* 30/8 6 ex. V Taubaté, 7/9 6 ex., 9/9 5 ex. Cassino, 8/9 4 ex. Taim, 10/9 2 ex. Cambará do Sul.

CHARADRIIDAE

Southern Lapwing *Vanellus chilensis* Tämligen allmän–allmän, sedd under 20 dagar.

American Golden-Plover *Pluvialis dominica* 8/9 23 ex. Taim, 9/9 2 ex. Cassino.

Collared Plover *Charadrius collaris* 8/9 2 ad. Taim.

SCOLOPACIDAE

South American Snipe *Gallinago paraguaiae* 7/9 1 ex. Camaquã–Pelotas, 7/9 3 ex., 9/9 2 ex. Cassino, 9/9 1 ex. Pelotas–Camaquã, 10/9 1 ex. Cambará do Sul.

Greater Yellowlegs *Tringa melanoleuca* 8/9 5 ex. Taim.

Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes* 7/9 18 ex., 9/9 ca 40 ex. Cassino, 8/9 ca 50 ex. Taim.

Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos* 8/9 13 ex. Taim.

Wilson's Phalarope *Steganopus tricolor* 6/9 1 ex. São José dos Pinhais, 8/9 1 ex. Taim. En sparsam genomsträckare.

STERCORARIIDAE

Chilean Skua *Stercorarius chilensis* 7/9 2 ex. Cassino.

LARIDAE

Kelp Gull *Larus dominicanus* 29/8 4 ex., 30/8 11 ex. Ubatuba, 5/9 2 ex., 6/9 10 ex. Itapoá, 7/9 ca 20 ex., 8/9 ca 15 ex. Cassino.

Brown-hooded Gull *Croicocephalus maculipennis* 7/9 ca 10 ex. Pelotas–Cassino, 7/9 ca 50 ex., 8/9 ca 10 ex. Cassino, 8/9 ca 200 ex. Taim, 9/9 ca 10 ex. Cassino/Pelotas.

Sandwich Tern *Thalasseus sandvicensis* 7/9 1 ex. Cassino.

Royal Tern *Thalasseus maximus* 7/9 ca 10 ex., 8/9 2 ex. Cassino.

South American Tern *Sterna hirundinacea* 7/9 2 ad. Cassino.

Snowy-crowned Tern *Sterna trudeaui* 7/9 2 ex., 9/9 6 ex. Cassino, 8/9 ca 15 ex. Taim.

Yellow-billed Tern *Sternula superciliaris* 7/9 2 ex. Cassino, 8/9 3 ex. Taim.

Large-billed Tern *Phaetusa simplex* 7/9 1 ex. S Camaquã, 1 ex. Pelotas–Cassino, 8/9 2 ex. Taim, 9/9 4 ex. Cassino.

COLUMBIDAE

Rock Pigeon *Columba livia* Noterad under 10 dagar.

Picazuro Pigeon *Patagioenas picazuro* Tämigen allmän–allmän, sedd under 22 dagar.

Plumbeous Pigeon *Patagioenas plumbea* 22/8 1 sj. Caraca, 31/8 1 sj. Campos do Jordão, 1/9 3 ex., 2/9 1 ex., 3/9 2 ex.+1 sj. Intervales.

Eared Dove *Zenaida auriculata* Observerad under 16 dagar, mestadels i smärre antal.

Plain-breasted Ground-Dove *Columbina minuta* 21/8 1 ex. Serra do Cipó (SS).

Ruddy Ground-Dove *Columbina talpacoti* Sedd under 13 dagar med max. 25 ex.

Picui Ground-Dove *Columbina picui* 7/9 ca 40 ex. Porto Alegre–Pelotas, 8/9 ca 60 ex. Taim, 9/9 ca 10 ex. Pelotas–Porto Alegre.

Scaled Dove *Scardafella squammata* 23/8 3 ex., 24/8 2 ex.+1 sj., 25/8 ca 15 ex. Serra da Canastra.

White-tipped Dove *Leptotila verreauxi* 21/8 1 sj., 22/8 3 sj. Caraca, 23/8 6 ex.+3 sj., 24/8 3 ex., 25/8 ca 5 ex. Serra da Canastra, 28/8 1 ex.+1 sj. Perequê, 31/8 3 ex. Campos do Jordão.

Gray-fronted Dove *Leptotila rufaxilla* 28/8 1 sj. Fazenda Angelim, 29/8 1 sj., 30/8 2 sj. Folha Seca, 11/9 1 ex. São Francisco de Paula.

Ruddy Quail-Dove *Geotrygon montana* 2/9 2 ex. (RH), 3/9 1 sj. Intervales.

PSITTACIDAE

White-eyed Parakeet *Aratinga leucophthalmus* 22/8 ca 15 ex. Caraca, 2 ex. Bom Despacho–Luz, 23/8 2 ex., 25/8 3 ex. Serra da Canastra, 31/8 3 ex. Campos do Jordão, 1/9 2 ex. Intervales.

Golden-capped Parakeet *Aratinga auricapilla* (nt) 23/8 4 ex. Serra da Canastra.

Peach-fronted Parakeet *Aratinga aurea* 20/8 20/8 ca 10 ex., 21/8 4 ex. Serra do Cipó, 22/8 6 ex. Bom Despacho–Luz, 23/8 ca 30 ex., 24/8 ca 15 ex., 25/8 ca 10 ex. Serra da Canastra.

Maroon-bellied Parakeet *Pyrrhura frontalis* 26/8 ca 15 ex., 27/8 ca 40 ex., 28/8 några ex. Itatiaia, 29/8 hörd Fazenda Angelim, 1-4/9 10-30 ex. dagligen Intervales, 10/9 ca 20 ex., 11/9 ca 10 ex. São Francisco de Paula.

Monk Parakeet *Myiopsitta monachus* 7/9 ca 20 ex., 9/9 ca 10 ex. Cassino, 8/9 ca 25 ex. Taim.

Blue-winged Parrotlet *Forpus xanthopterygius* 22/8 4 ex. Belo Horizonte, 2 ex. längs med vägen, 25/8 6 ex. Serra da Canastra, 26-28/8 2-3 ex. dagligen Itatiaia, 29/8 2 ex. Folha Seca, 1/9 3 ex. Intervales, 6/9 10 ex. Volta Velha.

Plain Parakeet *Brotogeris tirica* 26/8 ca 5 ex. Itatiaia, 28/8 2 ex. Perequê, 29/8 12 ex. S Folha Seca, 2/9 4 ex., 3/9 6 ex., 4/9 2 ex. Intervales.

Yellow-chevroned Parakeet *Brotogeris chiriri* 20/8 4 ex., 21/8 2 ex. Serra do Cipó, 24/8 4 ex. Serra da Canastra.

Pileated Parrot *Pionopsitta pileata* 31/8 2 ex. Campos do Jordão.

Scaly-headed Parrot *Pionus maximiliani* Observerad med 1-20 ex. under 14 dagar.

Red-spectacled Amazon *Amazona pretrei* (VU) 10/9 30-40 ex. São Francisco de Paula.

Vinaceous Amazon *Amazona vinacea* (EN) 30/8 3 ex., 31/8 6 ex. Campos do Jordão. Världspopulationen beräknas ligga runt 2 500 fåglar.

Blue-bellied Parrot *Triclaria malachitacea* (nt) 1/9 2 ex., 2/9 2 ex. Intervales.

CUCULIDAE

Squirrel Cuckoo *Piaya cayana* 25/8 2 ex. Serra da Canastra, 27/8 2 ex. Itatiaia, 28/8 1 hörd Fazenda Angelim, 31/8 1 ex. Campos do Jordão.

Smooth-billed Ani *Crotophaga ani* Sedd under 13 dagar med max. 20 ex.

Guira Cuckoo *Guira guira* Sedd under 10 dagar med 1-15 ex., ofta utmed vägarna vid transporter.

American Striped Cuckoo *Tapera naevia* 24/8 1 sj., 25/8 1 sj. Serra da Canastra.

Pavonine Cuckoo *Dromococcyx pavoninus* 1/9 2 sj., 2/9 1 sj., 3/9 1 ex.+2 sj. Intervales. Jättehäftigt att få se denna sällan sedda gök i sin hoatzinliknande flykt!

TYTONIDAE

Barn Owl *Tyto alba* 3/9 1 ex. Intervales. Vackert!

STRIGIDAE

Tropical Screech-Owl *Megascops choliba* 22/8 1 sj. Caraca (SH), 1/9 1 sj. ♂, 2/9 1 ex.+1 sj., 3/9 1 sj. Intervales.

Variable Screech-Owl *Megascops atricapillus* 3/9 1 sj. Intervalles.

Long-tufted Screech-Owl *Megascops sanctaecatarinae* 10/9 1 sj. ♂ São Francisco de Paula.

Great Horned Owl *Bubo virginianus* 8/9 1 ex. Taim.

Tawny-browed Owl *Pulsatrix koenigswaldiana* 2/9 2 sj. Intervalles.

Least Pygmy-Owl *Glaucidium minutissimum* 3/9 1 sj. ♂ Intervalles.

Ferruginous Pygmy-Owl *Glaucidium brasilianum* 20-21/8 1 sj. Serra do Cipó, 24/8 1 sj. Serra da Canastra.

Burrowing Owl *Athene cunicularia* 21/8 1 ex. Serra do Cipó, 24/8 12 ex. Serra da Canastra, 28/8 1 ex. Angra dos Reis–Ubatuba, 5/9 1 ex., 6/9 1 ex. Volta Velha, 7/9 6 ex. Camaquã–Cassino, 8/9 1 ex. Taim, 9/9 1 ex. Cassino, 10/9 1 ex. Cambará do Sul.

CAPRIMULGIDAE

Common Pauraque *Nyctidromus albigollis* 5/9 1 sj. Volta Velha (SH).

Scissor-tailed Nightjar *Hydropsalis torquata* 3/9 1 ♂ Intervalles.

Long-trained Nightjar *Macropsalis forcipata* 4/9 1 ♂ Intervalles. Yeesss!

APODIDAE

Sooty Swift *Cypseloides fumigatus* 3/9 ca 100 ex. Intervalles, 10/9 2 ex. N São Francisco de Paula.

White-collared Swift *Streptoprocne zonaris* 20/8 ca 40 ex., 21/8 nãgra ex. Serra do Cipó, 22/8 1 ex. Caraca, 26/8 ca 40 ex., 27/8 nãgra ex. Itatiaia, 28/8 ca 100 ex., 29/8 ca 250 ex. Fazenda Angelim, 2/9 ca 25 ex., 3/9 ca 300 ex. Intervalles.

Biscutate Swift *Streptoprocne biscutata* 11/9 ca 25 ex. Aparados da Serra.

Gray-rumped Swift *Chaetura cinereiventris cinereiventris* 28/8 ca 20 ex. Itatiaia–Angra dos Reis, 28/8 ca 100 ex., 29/8 ca 30 ex. Fazenda Angelim, 1/9 ca 25 ex., 2/9 ca 10 ex., 3/9 ca 50 ex. Intervalles.

Sick's Swift *Chaetura meridionalis* 31/8 1 ex. Campos do Jordão, 3/9 5 ex. Intervalles, 6/9 ca 10 ex. Volta Velha, 9/9 ca 20 ex., 10/9 ca 5 ex., 11/9 5 ex. São Francisco de Paula.

Lesser Swallow-tailed Swift *Panyptila cayennensis* 3/9 1 ex. Intervalles.

TROCHILIDAE

Saw-billed Hermit *Ramphodon naevius* (nt) 29-30/8 ca 15 ex. Folha Seca, 28/8 2 ex. Fazenda Angelim. Mंगा fina obsar!

Scale-throated Hermit *Phaethornis eurynome* 26/8 1 ex., 27/8 2 ex. Itatiaia, 1/9 1 ex., 2/9 2 ex., 3/9 3 ex. Intervalles.

Planalto Hermit *Phaethornis pretrei* 21/8 1 ex., 22/8 2 ex. Caraca, 23/8 1 ex., 25/8 2 ex. Serra da Canastra, 31/8 1 ex. Campos do Jordão.

Dusky-throated Hermit *Phaethornis squalidus* 1/9 1 ex., 2/9 1 ex., 3/9 2 ex. Intervalles.

Reddish Hermit *Phaethornis ruber* 28/8 1 ex. Perequê, 29/8 2 ex., 30/8 2 ex. Folha Seca.

Sombre Hummingbird *Campylopterus currochloris* 29/8 1 ex. S Folha Seca.

Swallow-tailed Hummingbird *Eupetomena macrourus* 21/8 2 ex. Serra do Cipó, 22/8 2 ex. Caraca, 1 ex. Bom Despacho–Luz, 23/8 1 ex., 24/8 1 ex. Serra da Canastra, 28/8 1 ex. Perequê, 29/8 1 ex. Folha Seca, 1 ex. Fazenda Angelim.

Black Jacobin *Florisuga fusca* 22/8 1 ex. Caraca, 23/8 3 ex., 25/8 1 ex. Serra da Canastra, 26/8 2 ex., 27/8 5-10 ex., 28/8 1 ex. Itatiaia, 29-30/8 1 ex. Folha Seca. 2/9 1 ex., 4/9 1 ex. Intervalles.

White-vented Violetear *Colibri serrirostris* 20/8 2 ex.+3 sj., 21/8 ca 5 ex. Serra do Cipó, 23/8 3 ex., 24/8 3 ex., 25/8 1 ex.+1 sj. Serra da Canastra, 5/9 1 sj. São José dos Pinhais.

Black-throated Mango *Anthracothorax nigricollis* 29/8 1 ♂ Folha Seca.

Plovercrest *Stephanoxis lalandi* 26/8 2 ♂, 1 ♀ Agulhas Negras Road (*lalandi*), 1/9 1 ♂ Intervalles, 11/9 1 ♂, 1 ♀+1 sj. Aparados da Serra (*loddigesii*).

Frilled Coquette *Lophornis magnificus* 23/8 1 ♂, 25/8 1 ♂ Serra da Canastra.

Festive Coquette *Lophornis chalybeus chalybeus* 29-30/8 11 ex. Folha Seca. Denna isolerade och distinkta ras bör få egen artstatus vad det lider.

Glittering-bellied Emerald *Chlorostilbon aureoventris* 20/8 4 ♂, 21/8 3 ♂ Serra do Cipó, 22/8 2 ♂, 1 ♀ Caraca, 23/8 2 ♀ Serra da Canastra.

Fork-tailed Woodnymph *Thalurania furcata* 20/8 2 ♂ Serra do Cipó, 23/8 3 ♂ Serra da Canastra.

Violet-capped Woodnymph *Thalurania glaucopis* 26/8 3 ♂, 27/8 ca 5 ex., 28/8 2 ex. Itatiaia, 29/8 ca 10 ex., 30/8 ca 5 ex. Folha Seca, 31/8 1 ♀ São José dos Campos, 1 och 3-4/9 ca 5 ex., 2/9 ca 10 ex. Intervalles, 10/9 2 ♂, 11/9 1 ex. São Francisco de Paula.

Rufous-throated Sapphire *Hylocharis sapphirina* 27/8 1 ♂ Itatiaia (LOS, SS).

White-chinned Sapphire *Hylocharis cyanus* 28/8 1 ♂ Perequê, 29/8 1 ♂ Fazenda Angelim.

White-throated Hummingbird *Leucochloris albicollis* 26/8 1 ex., 27/8 2 ex.+1 sj. Itatiaia, 31/8 3 ex. Campos do Jordão, 2/9 5 ex., 3/9 5 ex., 4/9 3 ex. Intervalles, 5/9 3 sj., 6/9 2 ex. São José dos Pinhais, 10/9 2 ex.+1 sj., 11/9 1 ex. São Francisco de Paula, 11/9 1 sj. Aparados da Serra.

Versicolored Emerald *Amazilia versicolor* 23/8 2 ex., 24/8 1 ex. Serra da Canastra, 27/8 1 ex. Itatiaia, 28/8 2 ex. Perequê, 29-30/8 1 ex. Folha Seca, 2/9 1 ex., 4/9 3 ex. Intervalles, 5/9 1 ex. São José dos Pinhais, 6/9 1 ex. Volta Velha.

Glittering-throated Emerald *Amazilia fimbriata* 29/8 ca 5 ex., 30/8 1 ex. Folha Seca.

Brazilian Ruby *Clytolaema rubricauda* 26/8 1 ♂, 1 ♀, 27/8 ca 5 ex. Itatiaia, 29/8 1 ♂, 1-2 ♀ Folha Seca, 1/9 1 ♀, 3/9 1 ♀ Intervalles.

Hyacinth Visorbearer *Augastes scutatus* (nt) 20/8 1 ♂, 2 ♀, 21/8 2 ♀ Serra do Cipó.

Stripe-breasted Starthroat *Heliomaster squamosus* 20/8 1 ♂, 1 ♀ Serra do Cipó, 23/8 1 ♀ Serra da Canastra. En riktig läckerbit!

Amethyst Woodstar *Calliphlox amethystina* 22/8 1 ♂, 1 ♀ Caraca, 23/8 1 ♀ Serra da Canastra, 1/9 1 ex., 3/9 1 ♀, 4/9 2 ♂ Intervalles.

TROGONIDAE

Green-backed Trogon *Trogon viridis* 29/8 3 ex.+7 sj., 30/8 1 ♂+3 sj. Folha Seca, 3/9 1 ♂ Intervalles.

Black-throated Trogon *Trogon rufus* 30/8 1 sj. Campos do Jordão, 2/9 1 ♂, 3/9 1 ♂+1 sj. Intervalles, 10/9 1 par+1 sj. São Francisco de Paula.

Surucua Trogon *Trogon surrucura* 22/8 2 sj. Caraca, 26/8 3 ex.+2 sj. Agulhas Negras Rd., 27/8 2 ex.+5 sj., 28/8 2 ex.+2 sj. Itatiaia, 1/9 2 sj., 2/9 2 ex.+5 sj., 3/9 1 ex.+3 sj. Intervalles.

ALCEDINIDAE

Green Kingfisher *Chloroceryle americana* 23/8 1 ex., 25/8 1 ex. Serra da Canastra.

Amazon Kingfisher *Chloroceryle amazona* 22/8 1 ex. Bom Despacho–Luz, 23/8 1 ex., 25/8 3 ex. Serra da Canastra, 6/9 1 ex. São José dos Pinhais, 7/9 1 ex. Cassino, 8/9 2 ex. Taim.

Ringed Kingfisher *Megaceryle torquatus* 28/8 1 ex. Angra dos Reis–Ubatuba, 31/8 2 ex. Campos do Jordão, 5/9 1 ex. São José dos Pinhais.

MOMOTIDAE

Rufous-capped Motmot *Baryphthengus ruficapillus* 28/8 1 ex. Itatiaia, 30/8 1 sj. Folha Seca, 1/9 4 sj., 2-3/9 2 sj. dagligen, 4/9 1 sj. Intervalles.

GALBULIDAE

Rufous-tailed Jacamar *Galbula ruficauda* 23/8 2 ex. Serra da Canastra, 28/8 1 ex. Perequê.

BUCCONIDAE

White-eared Puffbird *Nystalus chacuru* 20/8 4 ex. Serra do Cipó.

Crescent-chested Puffbird *Malacoptila striata* 1/9 2 ex., 3/9 2 ex. Intervalles, 5/9 1 ex. Volta Velha.

RAMPHASTIDAE

Spot-billed Toucanet *Selenidera maculirostris* 30/8 2 hörda Folha Seca.

Saffron Toucanet *Pteroglossus bailloni* (nt) 27/8 6 ex. Itatiaia, 3/9 2 ex. Intervalles. Grymma obsar!

Red-breasted Toucan *Ramphastos dicolorus* 26/8 1 ex., 27/8 ca 15 ex. Itatiaia, 1/9 1 ex., 3/9 2 sj., 4/9 4 ex. Intervalles, 10/9 1 ex. São Francisco de Paula.

Channel-billed Toucan *Ramphastos vitellinus ariel* 28/8 1 sj. Perequê, 1 sj. Fazenda Angelim, 5/9 6 ex., 6/9 4 ex. Volta Velha.

Toco Toucan *Ramphastos toco* 20/8 1 ex., 21/8 1 ex. Serra do Cipó, 22/8 1 ex. längs med vägen, 23/8 ca 10 ex., 24/8 ca 10 ex., 25/8 ca 20 ex. Serra da Canastra.

PICIDAE

White-barred Piculet *Picumnus cirrhatus* 29/8 1 ex. Fazenda Angelim, 29/8 1 ex., 30/8 2 ex. Folha Seca.

Ochre-collared Piculet *Picumnus temminckii* 1/9 3 ex., 2/9 1 ex., 3/9 2 ex.+1 sj. Intervalles, 5/9 1 ex., 6/9 2 sj. Volta Velha.

Mottled Piculet *Picumnus nebulosus* (nt) 10/9 1 ex. São Francisco de Paula.

White Woodpecker *Melanerpes candidus* 31/8 5 ex. Campos do Jordão, 2/9 2 ex., 3/9 3 ex. Intervalles.

Yellow-fronted Woodpecker *Melanerpes flavifrons* 26/8 4 ex., 27/8 2 ex. Itatiaia, 29/8 2 ex. S Folha Seca, 1/9 2 ex., 2/9 2 ex., 4/9 5 ex. Intervalles.

Little Woodpecker *Veniliornis passerinus* 24/8 1 ♀ Serra da Canastra.

White-spotted Woodpecker *Veniliornis spilogaster* 26/8 4 ex. Agulhas Negras Rd., 30/8 1 ♀ Campos do Jordão, 1/9 1 ♀, 3/9 2 ex. Intervales.

Yellow-browed Woodpecker *Piculus aurulentus* (nt) 26/8 1 ♂ Agulhas Negras Rd., 27/8 1 ♀, 28/8 1 par Itatiaia, 2/9 2 hörda Intervales.

Green-barred Woodpecker *Colaptes melanochloros* 26/8 1 ♂ Itatiaia, 3/9 2 ex. Intervales, 11/9 1 ♀ São Francisco de Paula (BES).

Campo Flicker *Colaptes campestris* 23/8 2 ex., 24/8 ca 15 ex., 25/8 2 ex. Serra da Canastra, 28/8 1 ex. O Itatiaia, 31/8 1 ex. Campos do Jordão, 2/9 1 ex., 4/9 2 ex. Intervales, 5/9 5 ex., 6/9 3 ex. Volta Velha.

Field Flicker *Colpates (campestris) campestroides* 7/9 2 ex., 9/9 2 ex. Cassino, 10/9 2 ex. Cambará do Sul, 11/9 2 ex. N São Francisco de Paula.

Blond-crested Woodpecker *Celeus flavescens* 29/8 1 par+1 hörd, 30/8 1 ♀ Folha Seca, 2/9 1 ♂, 3/9 1 hörd Intervales.

Lineated Woodpecker *Dryocopus lineatus* 20/8 1 juv., 21/8 1 ♀ Serra do Cipó, 25/8 1 ex. Serra da Canastra.

Robust Woodpecker *Campephilus robustus* 27/8 2 ♂ Itatiaia, 29/8 1 ♂ Fazenda Angelim, 31/8 1 hörd Campos do Jordão.

FURNARIIDAE

Rufous-breasted Leaf Tosser *Sclerurus scansor* 2/9 2 ex. Intervales.

Campo Miner *Geositta poeciloptera* (VU) 24/8 minst 8 ex. Serra da Canastra.

Buff-winged Cinclodes *Cinclodes fuscus* 8/9 8 ex. Taim.

Long-tailed Cinclodes *Cinclodes pabsti* (nt) 10/9 3 ex. N São Francisco de Paula.

Rufous Hornero *Furnarius rufus* Tämligen allmän i öppnare marker, sedd under 13 dagar.

Curve-billed Reedhaunter *Limnornis curvirostris* 8/9 1 sj. ♂+4 sj. Taim.

Straight-billed Reedhaunter *Limnornis rectirostris* (nt) 10/9 1 ex. Cambará do Sul.

Wren-like Rushbird *Phleocryptes melanops* 8/9 2 ex.+ca 10 hörda Taim.

Striolated Tit-Spinetail *Leptasthenura striolata* 11/9 1 ex. Cambará do Sul, 1 ex. Aparados da Serra.

Araucaria Tit-Spinetail *Leptasthenura setaria* (nt) 30/8 2 ex., 31/8 2 sj. Campos do Jordão, 10/9 3 ex., 11/9 2 ex. São Francisco de Paula, 12/9 1 ex. Cambará do Sul, 2 sj. Aparados da Serra.

Rufous-capped Spinetail *Synallaxis ruficapilla* 22/8 2 ex. Caraca, 27/8 4 ex.+1 sj. Itatiaia, 1/9 ca 5 ex.+1 sj., 2/9 1 ex.+5 sj., 3/9 2 ex.+4 sj., 4/9 1 sj. Intervales.

Gray-bellied Spinetail *Synallaxis cinerascens* 3/9 1 ex. Intervales.

Sooty-fronted Spinetail *Synallaxis frontalis* 20/8 1 ex., 21/8 1 sj. Serra do Cipó.

Pale-breasted Spinetail *Synallaxis albescens* 24/8 4 ex. Serra da Canastra.

Spix's Spinetail *Synallaxis spixi* 22/8 3 ex. Caraca, 24/8 2 sj. Serra da Canastra, 28/8 1 sj. Perequê, 31/8 1 ex.+3 sj. Campos do Jordão, 1/9 1 ex. Intervales, 5/9 5 sj., 6/9 3 sj. Volta Velha, 8/9 1 ex.+3 sj. Taim, 10/9 1 ex. São Francisco de Paula.

Olive Spinetail *Cranioleuca obsoleta* 5/9 2 ex. São José dos Pinhais, 10/9 1 ex. São Francisco de Paula, 11/9 1 ex. Aparados da Serra.

Pallid Spinetail *Cranioleuca pallida* 22/8 2 ex. Caraca, 27/8 3 ex.+1 sj. Itatiaia, 31/8 4 ex. Campos do Jordão, 2/9 1 ex., 4/9 1 ex. Intervales.

Yellow-chinned Spinetail *Certhiaxis cinnamomea* 8/9 5 ex. Taim.

Cipó Canastero *Asthenes luizae* (VU) 20/8 1 ex., 21/8 1 sj. Serra do Cipó.

Rufous-fronted Thornbird *Phacellodomus rufifrons* 21/8 1 ex., 22/8 1 ex. Caraca, 24/8 2 ex.+2 sj. Serra da Canastra.

Freckle-breasted Thornbird *Phacellodomus striaticollis* 5/9 2 ex. São José dos Pinhais.

Orange-eyed Thornbird *Phacellodomus erythrophthalmus* 28/8 2 ex.+1 sj. Perequê. Sorry guys, tror ni inte att SACC bestämde sig för Orange-eyed istället för Chestnut-eyed Thornbird! Denna art har för övrigt av okända orsaker nästan försvunnit från Bahia i andra änden av utbredningsområdet.

Orange-breasted Thornbird *Phacellodomus ferrugineigula* 31/8 2 ex. São José dos Campos, 4/9 2 ex. Intervales.

Canebrake Groundcreeper *Clibanornis dendrocolaptoides* (nt) 11/9 1 sj. Aparados da Serra.

Firewood-gatherer *Anumbius annumbi* 7/9 2 ex.+2 sj., 9/9 3 ex.+1 sj. Cassino, 10/9 1 sj. Cambará do Sul.

White-browed Foliage-gleaner *Anabacerthia amaurotis* (nt) 2/9 2 ex., 3/9 1 ex. Intervales.

Buff-browed Foliage-gleaner *Syndactyla rufosuperciliata* 26/8 1 ex.+3 sj. Agulhas Negras Rd., 2/9 1 sj., 3/9 2 ex., 4/9 1 sj. Intervales.

Ochre-breasted Foliage-gleaner *Philydor lichtensteini* 3/9 1 ex. Intervales.

Black-capped Foliage-gleaner *Philydor atricapillus* 29/8 1 ex., 30/8 1 ex. Folha Seca, 2/9 1 ex. Intervales, 5/9 1 ex., 6/9 2 ex. Volta Velha.

Buff-fronted Foliage-gleaner *Philydor rufum* 22/8 2 ex. Caraca, 26/8 3 ex. Agulhas Negras Rd., 27/8 4 ex. Itatiaia, 1-3/9 ca 5 ex. dagligen Intervales, 10/9 1 ex. São Francisco de Paula.

White-collared Foliage-gleaner *Anabazenops fuscus* 27/8 3-4 ex. Itatiaia, 1/9 3 ex., 2/9 1 ex., 3/9 2 ex. Intervales.

Pale-browed Treehunter *Cichlocolaptes leucophrys holti* 30/8 1 ex. Folha Seca, 6/9 1 ex. Volta Velha. Denna sydliga form av arten är splittvarnad.

White-eyed Foliage-gleaner *Automolus leucophthalmus* 29/8 1 ex.+1 hörd, 30/8 2 hörda Folha Seca, 1/9 1 hörd Intervales.

Sharp-tailed Streamcreeper *Lochmias nematura* 22/8 2 hörda Caraca, 26/8 1 hörd Agulhas Negras Rd., 31/8 1 ex. Campos do Jordão, 1/9 1 hörd, 3/9 1 ex. Intervales, 10/9 1 ex. São Francisco de Paula.

Sharp-billed Treehunter *Heliobletus contaminatus* 26/8 1 ex. Agulhas Negras Rd., 30/8 2 ex. Campos do Jordão, 2/9 4 ex., 3/9 1 ex. Intervales, 10/9 1 ex. São Francisco de Paula.

Plain Xenops *Xenops minutus minutus* 29/8 1 ex. Folha Seca.

Streaked Xenops *Xenops rutilans* 22/8 1 ex. Caraca, 26/8 3 ex. Agulhas Negras Rd., 2/9 1 ex. Intervales.

Plain-winged Woodcreeper *Dendrocicla turdina* 27/8 2 ex., 28/8 1 ex. Itatiaia, 28/8 1 ex., 29/8 1 ex. Fazenda Angelim, 29/8 1 ex., 30/8 3 ex. Folha Seca.

Olivaceous Woodcreeper *Sittasomus (griseicapillus) sylviiellus* 22/8 2 ex. Caraca, 27/8 5 ex. Itatiaia, 1-4/9 2-4 ex. dagligen Intervales. Kommer garanterat att splittas i framtiden.

White-throated Woodcreeper *Xiphocolaptes albicollis* 1/9 1 ex.+1 sj., 2/9 2 ex., 3/9 2 ex., 4/9 1 sj. Intervales, 5/9 1 sj. Volta Velha.

Planalto Woodcreeper *Dendrocolaptes platyrostris* 27/8 1 ex. Itatiaia (SS, RH).

Lesser Woodcreeper *Xiphorhynchus fuscus* 27/8 1 ex. Itatiaia, 29/8 1 ex., 30/8 1 ex. Folha Seca, 1/9 1 ex., 2/9 3 ex. Intervales.

Scaled Woodcreeper *Lepidocolaptes squamatus* 26/8 1 ex. Agulhas Negras Rd.

Scalloped Woodcreeper *Lepidocolaptes falcinellus* 30/8 1 ex. Campos do Jordão, 1/9 1 ex., 2/9 1 ex. Intervales.

Black-billed Scythebill *Campylorhamphus falcularius* 2/9 1 ex., 3/9 2 ex. Intervales. Vackert!

THAMNOPHILIDAE

Spot-backed Antshrike *Hypodaleus guttatus* 28/8 2 sj. Perequê, 29/8 2 ex. Fazenda Angelim, 2/9 1 ex. Intervales, 6/9 1 sj. Volta Velha.

Giant Antshrike *Batara cinerea* 28/8 1 sj. Itatiaia–Angra dos Reis, 31/8 2 sj. Campos do Jordão, 1/9 1 ♂+2 sj., 2/9 1 ♂, 1 ♀+3 sj., 3/9 2 sj. Intervales.

Large-tailed Antshrike *Mackenziaena leachii* 28/8 1 ♀ Itatiaia, 4/9 1 sj. ♂ Intervales. Kanonobsar!

Tufted Antshrike *Mackenziaena severa* 27/8 1 ♀ Itatiaia, 28/8 1 sj. ♂ Perequê, 3/9 1 sj. Intervales.

Great Antshrike *Taraba major* 20/8 1 ♂ Serra do Cipó.

White-bearded Antshrike *Biatas nigropectus* (VU) 28/8 1 sj. Itatiaia, 1/9 1 sj. ♂, 3/9 1 sj. ♂ Intervales.

Chestnut-backed Antshrike *Thamnophilus palliatus* 28/8 3 ex. Perequê.

Rufous-capped Antshrike *Thamnophilus ruficapillus* 1/9 1 ♂, 2/9 1 ♂ Intervales, 5/9 1 sj., 6/9 1 sj. São José dos Pinhais, 10/9 1 sj. Cambará do Sul, 11/9 1 ♀+1 sj. Tainhas.

Variable Antshrike *Thamnophilus caerulescens* Sedd eller hörd med 1-5 ex. under 14 dagar.

Spot-breasted Antwren *Dysithamnus stictithorax* (nt) 27/8 2 sj. Itatiaia, 28/8 1 par Fazenda Angelim, 29/8 1 par Folha Seca, 2/9 1 sj., 3/9 1 par Intervales.

Plain Antwren *Dysithamnus mentalis* 23/8 1 ♂ Serra da Canastra, 27/8 6 ex. Itatiaia, 29/8 5 ex., 30/8 4 ex. Folha Seca, 1/9 1 ex., 2/9 4 ex.+2 sj., 3/9 3 ex. Intervales.

Rufous-backed Antwren *Dysithamnus xanthopterus* 26/8 1 sj. ♂+1 sj. Agulhas Negras Rd.

Star-throated Antwren *Myrmotherula gularis* 2/9 1 par+1 sj., 3/9 1 ♂ Intervales.

Unicolored Antwren *Myrmotherula unicolor* (nt) 28/8 1 par Fazenda Angelim, 29/8 3 ex., 30/8 2 par Folha Seca.

Black-capped Antwren *Herpsilochmus atricapillus* 22/8 1 par Caraca.

Rufous-winged Antwren *Herpsilochmus rufimarginatus* 29/8 2 ex. Fazenda Angelim, 29/8 2 ex.+2 sj., 30/8 2 ex.+2 sj. Folha Seca.

Serra Antwren *Formicivora serrana* 21/8 1 par+1 sj. Caraca.

Black-hooded Antwren *Formicivora erythronotos* (EN) 28/8 1 ♂ Perequê. Denna art hade inte setts på över 100 år när den återupptäcktes 1987. Populationen beräknas till under 2 500 fåglar.

Paraná Antwren *Stymphalornis acutirostris* (EN) 6/9 1 par Itapoá. Beskriven 1995.

São Paulo Antwren *Stymphalornis* sp. nov. 31/8 1 par São José dos Campos. Kanon! Tyvärr kan populationen vara mycket liten, så när arten väl är beskriven kommer den att betraktas som EN eller kanske rentav CR.

Ferruginous Antbird *Drymophila ferruginea* 26/8 3 sj., 27/8 ca 5 ex.+ca 15 sj., 28/8 1 ex.+1 sj. Itatiaia, 29/8 3 sj. Fazenda Angelim, 1/9 2 ex.+5 sj., 2/9 4 sj., 3/9 1 ex.+1 sj. Intervalles.

Bertoni's Antbird *Drymophila rubricollis* 2/9 1 sj. ♂ Intervalles.

Rufous-tailed Antbird *Drymophila genei* (nt) 26/8 3 ex.+5 sj. Agulhas Negras Rd.

Ochre-rumped Antbird *Drymophila ochropyga* (nt) 22/8 1 par Caraca, 27/8 3 sj. Itatiaia, 1/9 1 sj. ♂, 2/9 1 sj. Intervalles.

Dusky-tailed Antbird *Drymophila malura* 31/8 1 sj. ♂ Campos do Jordão, 1/9 1 par, 2/9 2 sj., 3/9 1 sj. ♂ Intervalles.

Scaled Antbird *Drymophila squamata* 29/8 1 par+2 sj., 30/8 2 sj. Folha Seca.

Streak-capped Antwren *Terenura maculata* 27/8 1 sj. ♂ Itatiaia, 29/8 4 ex. Fazenda Angelim, 29/8 1 par, 30/8 1 par Folha Seca, 2/9 1 ex., 3/9 6 ex. Intervalles.

White-shouldered Fire-eye *Pyriglena leucoptera* 21/8 3 ♂, 22/8 1 ♂+2 sj. Caraca, 26/8 1 sj. Agulhas Negras Rd., 27/8 4 ex.+4 sj., 28/8 1 ♀ Itatiaia, 28/8 3 ex.+1 sj. Fazenda Angelim, 31/8 1 sj. Campos do Jordão, 1/9 2 sj., 2/9 1 sj., 3/9 1 sj. Intervalles, 6/9 1 ♂+3 sj. Volta Velha.

White-bibbed Antbird *Myrmeciza loricata* 28/8 1 sj. ♂ Itatiaia.

Squamate Antbird *Myrmeciza squamosa* 28/8 1 sj., 29/8 1 sj. Fazenda Angelim, 1/9 1 sj., 2/9 1 ♂+2 sj., 3/9 1 sj. Intervalles, 5/9 1 ♂+3 hörda, 6/9 1 sj. Volta Velha.

FORMICARIIDAE

Rufous-capped Antthrush *Formicarius colma* 29/8 3 sj. Folha Seca, 1 ex.+1 sj. Fazenda Angelim.

Short-tailed Antthrush *Chamaeza campanisona campanisona* 3/9 2 sj. Intervalles.

Rufous-tailed Antthrush *Chamaeza ruficauda* 26/8 1 ex.+3 sj. Agulhas Negras Rd., 27/8 1 sj. Itatiaia. Sedd av några, men det gällde att stå på rätt ställe!

Cryptic Antthrush *Chamaeza meruloides* 27/8 3 sj. Itatiaia.

GRALLARIIDAE

Speckle-breasted Antpitta *Hylopezus nattereri* 26/8 1 sj. Agulhas Negras Rd.

Variegated Antpitta *Grallaria varia* 29-30/8 1 sj. Folha Seca, 1/9 2 sj., 2/9 1 ex.+3 sj., 3/9 3 sj. Intervalles.

CONOPOPHAGIDAE

Black-cheeked Gnateater *Conopophaga melanops* 28/8 1 ♂ Fazenda Angelim, 29/8 2 ♂+1 sj. Folha Seca.

Rufous Gnateater *Conopophaga lineata* 22/8 1 ♂ Caraca, 26/8 1 ex. Agulhas Negras Rd., 2/9 2 ex., 3/9 1 ex. Intervalles.

RHINOCRYPTIDAE

White-breasted Tapaculo *Eleoscytalopus indigoticus* (nt) 2/9 2 ex.+2 sj. Intervales. En riktig snygging!

Mouse-colored Tapaculo *Scytalopus notatus* 26/8 3 ex.+2 sj. Agulhas Negras Rd., 1/9 2 sj. Intervales, 11/9 1 sj. Aparados da Serra.

Brasília Tapaculo *Scytalopus novacapitalis* (nt) 24/8 1 sj. Serra da Canastra.

Slaty Bristlefront *Merulaxis ater* (nt) 29-30/8 1 sj. Folha Seca, 1/9 1 ♂+2 sj. Intervales.

Spotted Bamboowren *Psilorhamphus guttatus* (nt) 28-29/8 1 sj. Ubatuba, 30/8 1 sj. ♂ Folha Seca, 2/9 1 sj. ♂, 3/9 1 sj. Intervales. En mästorskulkare!

TYRANNIDAE

Planalto Tyrannulet *Phyllomyias fasciatus* 22/8 2 ex. Caraca, 23/8 1 ex. Serra da Canastra, 31/8 4 ex. Campos do Jordão, 4/9 2 ex. Intervales.

Rough-legged Tyrannulet *Phyllomyias burmeisteri* 2/9 1 ex., 3/9 1 sj. Intervales.

Greenish Tyrannulet *Phyllomyias virescens* 31/8 2 ex. Campos do Jordão, 10/9 4 ex., 11/9 2 ex. São Francisco de Paula, 11/9 4 ex. Aparados da Serra.

Gray-capped Tyrannulet *Phyllomyias griseocapilla* (nt) 26/8 2 ex.+3 sj. Agulhas Negras Rd., 27/8 1 ex.+1 sj., 27/8 2 ex.+4 sj. Itatiaia, 28/8 2 ex., 29/8 1 ex. Fazenda Angelim, 1/9 1 ex., 2/9 1 ex. Intervales. Statusen som near-threatened verkar enligt mig något tveksam eftersom arten uppenbarligen är ganska vanlig.

Gray Elaenia *Myiopagis caniceps* 28/8 1 ♂ Fazenda Angelim.

Yellow-bellied Elaenia *Elaenia flavogaster* 22/8 2 sj. Caraca, 24/8 4 sj. Serra da Canastra.

Olivaceous Elaenia *Elaenia mesoleuca* 22/8 1 ex. Caraca, 23/8 1 ex. Serra da Canastra.

Plain-crested Elaenia *Elaenia cristata* 20/8 3 ex., 21/8 3 ex. Serra do Cipó, 24/8 2 ex. Serra da Canastra.

Highland Elaenia *Elaenia obscura* 21/8 3 ex., 22/8 2 ex. Caraca, 24/8 2 ex. Serra da Canastra, 31/8 1 hörd Campos do Jordão.

Southern Beardless-Tyrannulet *Camptostoma obsoletum* Noterad med 1-2 ex. under 14 dagar samt 8 ex. vid Serra do Cipó den 20/8.

Sooty Tyrannulet *Serpophaga nigricans* 21/8 2 ex. Caraca, 23/8 3 ex., 24/8 2 ex., 25/8 4 ex. Serra da Canastra, 31/8 2 ex. Campos do Jordão, 7/9 1 ex. Cassino, 8/9 3 ex. Taim.

White-crested Tyrannulet *Serpophaga subcristata* 24/8 3 ex. Serra da Canastra, 30/8 2 ex. Campos do Jordão, 11/9 1 ex. Tainhas.

Yellow Tyrannulet *Capsiempis flaveola* 28/8 1 ex. Fazenda Angelim.

Sharp-tailed Tyrant *Culicivora caudacuta* (VU) 24/8 7 ex. Serra da Canastra.

Gray-backed Tachuri *Polystictus superciliaris* (nt) 20/8 2 ex., 21/8 1 ex. Serra do Cipó, 24/8 2 ex. Serra da Canastra.

Tawny-crowned Pygmy-Tyrant *Euscarthmus meloryphus* 24/8 1 sj. Serra da Canastra.

Mottle-cheeked Tyrannulet *Phylloscartes ventralis* 22/8 2 ex. Caraca, 26/8 ca 5 ex. Agulhas Negras Rd., 27/8 2 ex. Itatiaia, 30/8 3 ex., 31/8 1 hörd Campos do Jordão.

Restinga Tyrannulet *Phylloscartes kronei* (VU) 5/9 2 ex., 6/9 1 ex. Volta Velha. Beskrevs 1992.

Bay-ringed Tyrannulet *Phylloscartes sylviolus* (nt) 1/9 5 ex., 3/9 4 ex. Intervales.

São Paulo Tyrannulet *Phylloscartes paulista* (nt) 30/8 2 ex. Folha Seca, 2/9 2 ex. Intervales.

Oustalet's Tyrannulet *Phylloscartes oustaleti* (nt) 1/9 3 ex., 2/9 2 ex., 3/9 3 ex. Intervales.

Serra do Mar Tyrannulet *Phylloscartes difficilis* (nt) 26/8 6 ex. Agulhas Negras Rd.

Sepia-capped Flycatcher *Leptopogon amaurocephalus* 27/8 1 ex. Itatiaia, 29/8 2 ex., 30/8 1 ex. Folha Seca, 3/9 3 ex. Intervales, 5/9 1 ex., 6/9 1 ex. Volta Velha.

Gray-hooded Flycatcher *Mionectes rufiventris* 22/8 1 ex. Caraca, 26/8 1 ex. Agulhas Negras Rd., 28/8 1 ex., 29/8 2 ex. Fazenda Angelim, 31/8 1 ex. Campos do Jordão, 3/9 1 ex. Intervales, 6/9 2 ex. Volta Velha.

Eared Pygmy-Tyrant *Myiornis auricularis* 27/8 2 ex. Itatiaia (LOS, SS), 1/9 4 ex., 2/9 2 ex.+2 hörda, 3/9 3 ex. Intervales.

Drab-breasted Bamboo-Tyrant *Hemitriccus diops* 27/8 2 ex.+1 sj. Itatiaia, 2/9 1 ex. Intervales.

Brown-breasted Bamboo-Tyrant *Hemitriccus obsoletus* 26/8 1 sj. Agulhas Negras Rd., 11/9 1 ex.+1 hörd Aparados da Serra.

Eye-ringed Tody-Tyrant *Hemitriccus orbitatus* (nt) 5/9 1 ex. Volta Velha.

Hangnest Tody-Tyrant *Hemitriccus nidipendulus* 22/8 1 ex. Caraca, 1/9 1 ex., 2/9 2 ex., 4/9 1 ex. Intervales.

Pearly-vented Tody-Tyrant *Hemitriccus margaritaceiventer* 20/8 1 ex.+1 sj. Serra do Cipó.

Kaempfer's Tody-Tyrant *Hemitriccus kaempferi* (EN) 6/9 1 ex. Volta Velha.

Fork-tailed Tody-Tyrant *Hemitriccus furcatus* (VU) 29/8 2 ex. Fazenda Angelim.

Ochre-faced Tody-Flycatcher *Poecilotriccus plumbeiceps* 28/8 1 ex. Perequê, 3/9 1 ex.+1 hörd Intervales, 5/9 1 ex.+1 hörd São José dos Pinhais.

Yellow-lored Tody-Flycatcher *Todirostrum poliocephalum* 22/8 2 ex. Caraca, 30/8 1 ex. Folha Seca (SS), 5/9 1 ex. Volta Velha.

Common Tody-Flycatcher *Todirostrum cinereum* 23/8 2 sj. Serra da Canastra, 27/8 1 sj. Itatiaia, 28/8 1 ex. Perequê. Magert.

Yellow-olive Flatbill *Tolmomyias sulphurescens sulphurescens* 22/8 3 ex. Caraca, 27/8 2 ex., 28/8 1 ex. Itatiaia, 29/8 3 ex., 30/8 1 sj. Folha Seca, 1-3/9 2-3 sj. dagligen Intervales.

White-throated Spadebill *Platyrinchus mystaceus cancomus* 26/8 2 ex. Agulhas Negras Rd., 27/8 1 ex. Itatiaia.

Bran-colored Flycatcher *Myiophobus fasciatus* 22/8 2 ex. Caraca, 24/8 1 ex. Serra da Canastra, 4/9 1 ex. Intervales.

Yellow-rumped Flycatcher *Myiobius (barbatus) mastacalis* 27/8 2 ex. Itatiaia, 29/8 2 ex., 30/8 1 ex. Folha Seca, 1/9 1 ex., 2/9 1 ex. Intervales. Splittas ibland från Whiskered Flycatcher.

Swallow Flycatcher *Hirundinea (ferruginea) bellicosa* 22/8 2 ex. Caraca, 26-27/8 2 ex., 28/8 1 ex. Itatiaia, 1-2/9 2 ex., 4/9 1 ex. Intervales.

Euler's Flycatcher *Lathrotriccus euleri* 24/8 1 sj. Serra da Canastra, 28/8 1 ex.+1 sj. Itatiaia.

Fuscou Flycatcher *Cnemotriccus fuscatus* 2/9 1 ex. Intervales.

Tropical Pewee *Contopus cinereus* 22/8 1 ex. Caraca, 28/8 1 ex. Perequê, 28-29/8 1 ex. Fazenda Angelim, 30/8 1 ex. Folha Seca, 1/9 1 ex., 3/9 1 ex. Intervales.

Spectacled Tyrant *Hymenops perspicillatus* 7/9 5 ♂, 2 ♀, 9/9 2 ♂, 1 ♀ Cassino, 8/9 ca 10 ex. Taim.

Blue-billed Black-Tyrant *Knipolegus cyanirostris* 26/8 1 ♂ Agulhas Negras Rd., 1 ♀ Itatiaia, 30-31/8 1 ♀ Campos do Jordão.

Crested Black-Tyrant *Knipolegus lophotes* 20/8 3 ex., 21/8 2 ex. Serra do Cipó, 24/8 5 ex., 25/8 4 ex. Serra da Canastra, 30/8 2 ex. Campos do Jordão.

Velvety Black-Tyrant *Knipolegus nigerrimus* 21/8 1 ♂, 22/8 2 ♂ Caraca.

Yellow-browed Tyrant *Satrapa icterophrys* 8/9 10 ex. Taim, 9/9 1 ex. Cassino.

Masked Water-Tyrant *Fluvicola nengeta* 21-22/8 1 ex. Caraca, 22/8 1 ex. Bom Despacho–Luz, 23/8 2 ex., 24/8 2 ex. Serra da Canastra, 28/8 3 ex. Angra dos Reis–Ubatuba, 30/8 1 ex. Ubatuba.

White-headed Marsh-Tyrant *Arundinicola leucocephala* 22/8 1 ♂ Bom Despacho–Luz.

Cock-tailed Tyrant *Alectrurus tricolor* (VU) 24/8 5 ♂ Serra da Canastra.

Gray Monjita *Xolmis cinerea* 20/8 1 ex. Guarulhos (SH), 24/8 5 ex. Serra da Canastra.

White-rumped Monjita *Xolmis velata* 20/8 2 ex., 21/8 2 ex. Serra do Cipó, 22/8 2 ex. längs med vägen, 23/8 6 ex., 24/8 ca 25 ex., 25/8 5 ex. Serra da Canastra, 26/8 1 ex. V Intervales.

White Monjita *Xolmis irupero* 7/9 4 ex. Porto Alegre–Cassino, 7/9 1 ex., 8/9 1 ex., 9/9 5 ex. Cassino, 8/9 1 ex. Taim.

Black-and-white Monjita *Xolmis dominicanus* (VU) 9/9 1 par Cassino, 10/9 10 ex. Cambará do Sul/ São Francisco de Paula, 11/9 1 par Aparados da Serra.

Streamer-tailed Tyrant *Gubernetes yetapa* 23/8 6 ex. Serra da Canastra.

Shear-tailed Gray Tyrant *Muscipipra vetula* 31/8 2 ex. Campos do Jordão, 4/9 1 hörd Intervales.

Long-tailed Tyrant *Colonia colonus* Sedd med 1-3 ex. under 13 dagar.

Cattle Tyrant *Machetornis rixosus* Sedd med 1-4 ex. under 8 dagar i norr; rätt allmän i söder 5-10/9.

Piratic Flycatcher *Legatus leucophaeus* 29/8 1 sj. Folha Seca.

Social Flycatcher *Myiozetetes similis* Sedd med 1-10 ex. under 13 dagar

Great Kiskadee *Pitangus sulphuratus* Tämigen allmän; observerad under 20 dagar.

Three-striped Flycatcher *Conopias trivirgata* 1/9 1 hörd, 2/9 5 ex. Intervales, 6/9 3 ex. Volta Velha.

Boat-billed Flycatcher *Megarynchus pitangua* 27/8 2 ex.+1 sj. Itatiaia, 28/8 1 ex. Perequê, 29/8 1 ex.+1 hörd Fazenda Angelim, 31/8 1 hörd São José dos Campos.

Tropical Kingbird *Tyrannus melancholicus* 22/8 2 ex. Bom Despacho–Luz, 28/8 1 ex. Angra dos Reis–Ubatuba. Fantastiskt fåtalig, men en stor del av populationen flyttar till Amazonas under sydvintern.

Fork-tailed Flycatcher *Tyrannus savana* 22/8 3 ex. Bom Despacho–Luz, 23/8 1 ex., 24/5 5 ex. Vargem Bonita.

Grayish Mourner *Rhytipterna simplex* 30/8 2 ex. Folha Seca.

Eastern Sirystes *Sirystes sibilator* 1/9 1 ex. Intervalles.

Swainson's Flycatcher *Myiarchus swainsoni* 21/8 2 ex. Caraca, 23/8 1 ex., 24/8 3 ex., 25/8 1 ex. Serra da Canastra.

Short-crested Flycatcher *Myiarchus ferox* 25/8 1 ex. Serra da Canastra, 27/8 1 ex. Itatiaia.

Large-headed Flatbill *Ramphotricon megacephala* 27/8 2 ex.+5 sj. Itatiaia, 1/9 1 ex., 2/9 1 ex., 3/9 1 sj. Intervalles.

Gray-hooded Attila *Attila rufus* 27/8 2 sj., 28/8 1 sj. Itatiaia, 28/8 1 ex.+1 sj. Perequê, 1/9 2 sj., 2/9 3 sj., 3/9 3 ex.+2 sj. Intervalles, 5/9 1 sj., 6/9 2 sj. Volta Velha.

OXYRUNCIDAE

Sharpbill *Oxyruncus cristatus* 29/8 1 ex. Folha Seca, 1/9 1 ex.+1 sj., 2/9 2 ex.+3 sj., 3/9 2 ex., 4/9 1 sj. Intervalles.

COTINGIDAE

Hooded Berryeater *Carpornis cucullatus* (nt) 1/9 1 ♂+6 sj., 2/9 1 ♂+5 sj., 3/9 3 ♂+10 sj., 4/9 2 sj. Intervalles.

Cinnamon-vented Piha *Lipaugus lanioides* (nt) 3/9 1 ex.+2 sj. Intervalles.

Black-and-gold Cotinga *Tijuca atra* (nt) 26/8 1 sj. ♂+5 sj. Agulhas Negras Rd.

Red-ruffed Fruitcrow *Pyroderus scutatus* 23/8 1 ex., 25/8 1 ex. Serra da Canastra, 27/8 1 ex. Itatiaia, 3/9 2 sj. Intervalles. Tyvärr fick inte alla se någon fruktkråka.

Bare-throated Bellbird *Procnias nudicollis* (VU) 27/8 2 sj., 28/8 1 sj. Itatiaia, 28/8 1 sj. Perequê, 29/8 1 ad. ♂+ca 10 sj., 30/8 3 sj. Folha Seca, 1/9 4 sj., 2/9 1 ad. ♂+4 sj., 3/9 1 ♀+6 sj., 4/9 1 sj. Intervalles, 5/9 2 sj., 6/9 3 sj. Volta Velha.

PIPRIDAE

Helmeted Manakin *Antilophia galeata* 23/8 3 ♂, 1 ♀, 25/8 1 sj. Serra da Canastra. Kanonobsar!

Blue Manakin *Chiroxiphia caudata* 21/8 1 juv. ♂, 22/8 1 ♀ Caraca, 26/8 2 ♀ Agulhas Negras Rd., 27/8 2 ♂, 28/8 6 ♂, 1 ♀ (spell!!!) Itatiaia, 29/8 ca 5 ex., 30/8 hörd Folha Seca, 31/8 hörd Campos do Jordão, 1/9 1 ♂+1 hörd, 2/9 3 ex.+ca 10 hörda Intervalles, 5/9 1 ♀ São José dos Pinhais, 5/9 1 ♀+1 hörd, 6/9 hörd Volta Velha. En av resans självklara höjdpunkter var det fantastiska manakinspelet vid Itatiaia!

Pin-tailed Manakin *Ilicura militaris* 21/8 1 ♂, 22/8 1 ♂, 1 ♀ Caraca, 29/8 1 sj., 30/8 1 sj. Folha Seca, 1/9 1 ♀, 3/9 1 ♀ Intervalles.

White-bearded Manakin *Manacus manacus* 28/8 5 ex. Perequê, ca 5 ex. Folha Seca, 29/8 ca 5 ex., 30/8 2 ♀ Fazenda Angelim.

Serra do Mar Tyrant-Manakin *Neopelma chrysolophum* 26/8 1 ex. Agulhas Negras Rd., 3/9 1 ex. Intervalles.

TITYRIDAE

Buff-throated Purpletuft *Iodopleura pipra* (nt) 28/8 2 ex., 29/8 3 ex. Fazenda Angelim, 30/8 1 ex. Folha Seca.

Chestnut-crowned Becard *Pachyramphus castaneus* 1-3/9 2 ex. dagligen, 4/9 1 ex. Intervalles.

Black-capped Becard *Pachyramphus marginatus* 29/8 1 sj., 30/8 1 ♂ Folha Seca.

Greenish Schiffornis *Schiffornis virescens* 26/8 1 sj. Agulhas Negras Rd., 27/8 1 ex., 28/8 1 sj. Itatiaia, 1/9 1 sj., 2/9 2 sj., 3/9 2 sj. Intervales, 5/9 1 sj., 6/9 1 sj. Volta Velha.

INCERTAE SEDIS

Swallow-tailed Cotinga *Phibalura flavirostris* (nt) 26/8 2-4 ex., 27/8 1 ex. Itatiaia, 31/8 3 ex. Campos do Jordão. Snyggt!

Wing-barred Piprites *Piprites chloris chloris* 1/9 2 ex.+1 sj., 2/9 1 sj., 3/9 1 ex.+1 sj. Intervales.

Black-capped Piprites *Piprites pileatus* (VU) 26/8 1 par Agulhas Negras Rd., 30/8 1 sj. Campos do Jordão. Vilken läckerbit!

VIREONIDAE

Red-eyed Vireo *Vireo olivaceus* 30/8 1 ex. Folha Seca.

Rufous-crowned Greenlet *Hylophilus poecilotis* 26/8 1 ex.+3 sj. Agulhas Negras Rd., 31/8 1 ex. Campos do Jordão, 1/9 1 ex., 2/9 5 ex., 3/9 3 ex. Intervales, 6/9 1 sj. Volta Velha.

Gray-eyed Greenlet *Hylophilus amaurocephalus* 21/8 1 ex., 22/8 1 ex. Caraca.

Rio de Janeiro Greenlet *Hylophilus thoracicus* 28/8 1 sj. Perequê, 1 ex. Fazenda Angelim.

Rufous-browed Peppershrike *Cyclarhis gujanensis* 21/8 1 ex.+1 sj. Serra do Cipó, 21/8 2 sj., 22/8 1 ex.+2 sj. Caraca, 26/8 2 ex.+1 sj. Agulhas Negras Rd., 27/8 3 sj. Itatiaia, 28/8 2 ex. Perequê, 31/8 1 sj. Campos do Jordão, 2/9 1 ex.+1 sj., 4/9 1 ex. Intervales, 5/9 2 sj., 6/9 2 sj. Volta Velha, 10/9 1 ex.+1 sj. São Francisco de Paula.

CORVIDAE

Azure Jay *Cyanocorax caeruleus* (nt) 6/9 ca 15 ex. Volta Velha, 9/9 1 ex., 10/9 2 ex. São Francisco de Paula.

Curl-crested Jay *Cyanocorax cristatellus* 24/8 10 ex., 25/8 1 ex. Serra da Canastra, 31/8 1 ex. Campos do Jordão.

Plush-crested Jay *Cyanocorax chrysops* 25/8 8 ex. Serra da Canastra, 30/8 2 ex. Campos do Jordão.

HIRUNDINIDAE

Blue-and-white Swallow *Pygochelidon cyanoleuca* Tämligen allmän—allmän, sedd dagligen.

Tawny-headed Swallow *Alopochelidon fucata* 21/8 1 ex. Serra do Cipó, 24/8 10 ex. Serra da Canastra, 7/9 2 ex., 9/9 2 ex. Cassino.

Southern Rough-winged Swallow *Stelgidopteryx ruficollis* Noterad i måttliga antal under 8 dagar, främst i cerradoregionen.

Gray-breasted Martin *Progne chalybea* 22/8 2 ex. längs med vägen, 23/8 5 ex. Serra da Canastra, 26/8 4 ex., 27/8 ca 10 ex. Itatiaia, 28/8 10-tals Angra dos Reis—Ubatuba, 2/9 ca 5 ex., 4/9 ca 5 ex. Intervales, 6/9 5 ex. Volta Velha, 7-9/9 1-5 ex. dagligen kring Cassino/Taim.

Brown-chested Martin *Progne tapera* 31/8 2 ex. Campos do Jordão.

White-winged Swallow *Tachycineta albiventer* 22/8 1 ex. Bom Despacho—Luz.

White-rumped Swallow *Tachycineta leucorrhoa* 23/8 3 ex., 24/8 ca 10 ex. Serra da Canastra, 31/8 ca 5 ex. Campos do Jordão, 1/9 4 ex., 2-4/9 3 ex. dagligen Intervales, 6-12/9 rätt allmän i södra Brasilien.

TROGLODYTIDAE

Long-billed Wren *Cantorchilus longirostris* 30/8 1 sj. ♂+1 sj. Folha Seca.

Southern House-Wren *Troglodytes musculus* Noterad under 22 dagar med 1-10 ex.

POLIOPTILIDAE

Long-billed Gnatwren *Ramphocaenus melanurus* 28-29/8 1 sj. ♂ Fazenda Angelim, 3/9 1 sj. Intervalles.

DONACOBIIDAE

Black-capped Donacobius *Donacobius atricapilla* 31/8 2 ex. São José dos Campos.

TURDIDAE

White-necked Thrush *Turdus albicollis* 26/8 1 ex. Agulhas Negras Rd., 29/8 1 hörd Folha Seca, 2/9 2 ex., 3/9 2 ex. Intervalles, 11/9 1 ex. São Francisco de Paula (BES).

Creamy-bellied Thrush *Turdus amaurochalinus* 26/8 1 ex. Agulhas Negras Rd., 29/8 1 ex. Fazenda Angelim, 2/9 5 ex., 4/9 ca 5 ex. Intervalles, 7/9 1 ex., 9/9 1 ex. Cassino, 8/9 3 ex. Taim.

Eastern Slaty-Thrush *Turdus (nigriceps) subalaris* 28/8 1 sj. Itatiaia.

Pale-breasted Thrush *Turdus leucomelas* 20/8 3 ex., 21/8 2 ex. Serra do Cipó, 23/8 4 ex., 24/8 1 ex., 25/8 1 ex. Serra da Canastra, 29/8 1 ex. S Folha Seca.

Yellow-legged Thrush *Turdus flavipes* 26/8 2 ♂+1 sj., 27/8 ca 10 ex., 28/8 2 ex. Itatiaia, 28/8 1 ♂ Perequê, 1/9 2 ex.+10 sj., 3/9 4 ex.+2 sj. Intervalles.

Rufous-bellied Thrush *Turdus rufiventris* Tämligen allmän; sedd under 17 dagar.

MIMIDAE

White-banded Mockingbird *Mimus triurus* 8/9 1 ex. Taim.

Chalk-browed Mockingbird *Mimus saturninus* 20/8 4 ex., 21/8 2 ex. Serra do Cipó, 24/8 ca 10 ex., 25/8 3 ex. Serra da Canastra, 31/8 1 ex. längs med vägen, 4/9 3 ex. Intervalles, 5/9 5-10 ex. São José dos Pinhais, 7/9 1 ex., 9/9 2 ex. Cassino, 10/9 4 ex., 11/9 6 ex. São Francisco de Paula–Cambará do Sul.

MOTACILLIDAE

Yellowish Pipit *Anthus lutescens* 23/8 1 sj. Serra da Canastra, 5/9 2 sj. São José dos Pinhais, 8/9 4 sj. Taim.

Correndera Pipit *Anthus correndera* 9/9 2 sj. Cassino.

Ochre-breasted Pipit *Anthus nattereri* (VU) 24/8 1 ex. Serra da Canastra.

Hellmayr's Pipit *Anthus hellmayri* 31/8 1 sj. ♂ Campos do Jordão, 10/9 2 ex. Cambará do Sul.

PARULIDAE

Tropical Parula *Parula pitiayumi* 23/8 2 ex. Serra da Canastra, 1/9 2 ex., 3/9 ca 5 ex. Intervalles, 6/9 3 ex. Volta Velha, 2 ex. São José dos Pinhais, 10/9 1 ex.+1 sj. São Francisco de Paula, 1 sj. Cambará do Sul, 11/9 1 ex. Tainhas.

Southern Yellowthroat *Geothlypis velata* 31/8 1 par Campos do Jordão, 1/9 1 par Intervalles, 5/9 2 ex., 6/9 1 ♂ São José dos Pinhais, 6/9 1 ♂ Volta Velha, 8/9 2 sj. Taim.

Golden-crowned Warbler *Basileuterus culicivorus* 23/8 1 ex. Serra da Canastra, 26/8 ca 10 ex. Agulhas Negras Rd., 27/8 5-10 ex., 28/8 1 ex. Itatiaia, 1-3/9 10-15 ex. dagligen, 4/9 1 sj. Intervalles, 5/9 1 ex., 6/9 3 ex. Volta Velha.

White-bellied Warbler *Basileuterus hypoleucus* 21/8 2 ex. Serra do Cipó, 22/8 ca 10 ex. Caraca, 23/8 3 ex., 25/8 3 sj. Serra da Canastra.

White-rimmed Warbler *Basileuterus leucoblepharus* 26/8 4 ex.+5 sj. Agulhas Negras Rd., 27/8 1 sj. Itatiaia, 30/8 1 sj., 31/8 2 sj. Campos do Jordão, 2/9 1 sj., 3/9 2 sj. Intervalles, 6/9 1 sj. Volta Velha, 10/9 4 ex.+2 sj., 11/9 1 ex.+3 sj. São Francisco de Paula, 11/9 3 sj. Aparados da Serra.

Riverbank Warbler *Phaeothlypis rivularis* 3/9 2 ex. Intervalles.

THRAUPIDAE

Brown Tanager *Orchesticus abeillei* (nt) 26/8 3 ex., 27/8 1 ex., 28/8 1 ex. Itatiaia, 29/8 1 ex. Fazenda Angelim, 1/9 2 ex., 3/9 1 ex. Intervalles.

Red-crested Cardinal *Paroaria coronata* 7/9 ca 15 ex. Porto Alegre–Pelotas, 8/9 ca 15 ex. Taim, 9/9 ca 25 ex. Pelotas–Porto Alegre.

Red-cowled Cardinal *Paroaria dominicana* 22/8 ca 15 ex. Bom Despacho–Luz.

Cinnamon Tanager *Schistochlamys ruficapillus* 20/8 2 ex., 21/8 2 ex. Serra do Cipó, 24/8 1 ex. Serra da Canastra.

Magpie Tanager *Cissopis leveriana* 22/8 6 ex. Caraca, 26/8 2 ex., 27/8 4 ex. Itatiaia, 1/9 2 ex. Intervalles.

Olive-green Tanager *Orthogonys chloricterus* 26/8 3 ex., 27/8 8 ex., 28/8 2 ex. Itatiaia, 29/8 ca 5 ex. Fazenda Angelim, 2/9 1 ex., 3/9 2 ex. Intervalles.

Orange-headed Tanager *Thlypopsis sordida* 28/8 1 ex. Perequê.

White-rumped Tanager *Cypsnagra hirundinacea* 21/8 2 ex. Serra do Cipó.

Black-goggled Tanager *Trichothraupis melanops* 21/8 1 par Caraca, 26/8 3 ex. Agulhas Negras Rd., 26/8 1 ex., 27/8 ca 10 ex., 28/8 2 ex. Itatiaia, 28/8 3 ex., 29/8 1 ex. Fazenda Angelim, 1-4/9 2-10 ex. dagligen Intervalles, 5/9 1 ex. Volta Velha.

Flame-crested Tanager *Tachyphonus cristatus* 29/8 3 par, 30/8 1 ♂ Folha Seca, 6/9 4 ex. Volta Velha.

Ruby-crowned Tanager *Tachyphonus coronatus* Tämligen allmän i anslutning till skog, sedd under 13 dagar med max. 15 ex. vid Intervalles den 4/9.

White-lined Tanager *Tachyphonus rufus* 21/8 1 par Serra do Cipó, 22/8 1 ♂ Caraca, 23/8 1 ♂ Serra da Canastra.

Brazilian Tanager *Ramphocelus bresilius* 28/8 7 ex. Perequê, 1 ex. Fazenda Angelim, 29/8 1 ex. Folha Seca, 4/9 1 juv. ♂ Intervalles.

Palm Tanager *Thraupis palmarum* 20/8 1 ex. Serra do Cipó, 22/8 3 ex. Caraca, 23/8 2 ex. Serra da Canastra, 26/8 1 ex. Itatiaia, 29/8 ca 5 ex. Folha Seca, 5/9 ca 10 ex., 6/9 ca 10 ex. Volta Velha.

Golden-chevroned Tanager *Thraupis ornata* 22/8 3 ex. Caraca, 26/8 5 ex. Agulhas Negras Rd., 27/8 ca 5 ex. Itatiaia, 29-30/8 1 ex. Folha Seca, 1-4/9 10-15 ex. dagligen Intervalles.

Sayaca Tanager *Thraupis sayaca* Tämligen allmän, sedd under 18 dagar.

Azure-shouldered Tanager *Thraupis cyanoptera* (nt) 29-30/8 1 ex. Folha Seca, 1/9 1 ex., 4/9 1 ex. Intervalles, 6/9 2 ex. Volta Velha.

Diademed Tanager *Stephanophorus diadematus* 26/8 ca 20 ex. Agulhas Negras Rd., 31/8 2 ex. Campos do Jordão, 1-4/9 1-5 ex. dagligen Intervalles, 5/9 2 ex. São José dos Pinhais, 8/9 1 ex. Taim, 10/9 3 ex., 11/9 1 ex. São Francisco de Paula, 11/9 4 ex. Aparados da Serra.

Fawn-breasted Tanager *Pipraeidea melanonota* 22/8 1 ♂ Caraca, 26/8 4 ex. Agulhas Negras Rd., 3/9 1 ex. Intervalles.

Burnished-buff Tanager *Tangara cayana* 20/8 ca 5 ex., 21/8 ca 5 ex. Serra do Cipó, 22/8 5 ex. Caraca, 23/8 2 ex., 25/8 6 ex. Serra da Canastra, 30/8 1 ex. Campos do Jordão.

Black-backed Tanager *Tangara peruviana* (VU) 6/9 3 ex. Volta Velha. Denna art rapporterades sällan tidigare, men vid Volta Velha ses den regelbundet.

Chestnut-backed Tanager *Tangara preciosa* 2/9 2 ex., 4/9 1 ex. Intervalles, 10/9 2 ex., 11/9 3 ex. São Francisco de Paula.

Green-headed Tanager *Tangara seledon* 26/8 8 ex., 27/8 ca 15 ex., 28/8 2 ex. Itatiaia, 29/8 ca 15 ex. Fazenda Angelim, 29/8 ca 15 ex., 30/8 ca 25 ex. Folha Seca, 1/9 2 ex., 2/9 4 ex., 3/9 2 ex. Intervalles, 6/9 ca 10 ex. Volta Velha.

Red-necked Tanager *Tangara cyanocephala* 29/8 2 ex., 30/8 2 ex. Folha Seca, 29/8 5-10 ex. Fazenda Angelim, 3/9 1 ex. Intervalles, 6/9 3 ex. Volta Velha.

Brassy-breasted Tanager *Tangara desmaresti* 26/8 10-15 ex. Agulhas Negras Rd., 27/8 4 ex. Itatiaia, 29/8 2 ex. Fazenda Angelim, 1/9 ca 10 ex., 3/9 2 ex. Intervalles.

Gilt-edged Tanager *Tangara cyanoventris* 22/8 ca 10 ex. Caraca.

Swallow Tanager *Tersina viridis* 20/8 5 ex. Serra do Cipó, 23/8 4 ex., 25/8 6 ex. Serra da Canastra, 28/8 4 ex. Perequê, 30/8 1 ♀ Folha Seca.

Blue Dacnis *Dacnis cayana* Tämigen allmän, sedd under 15 dagar med max. 20 ex. vid Folha Seca 29/8.

Green Honeycreeper *Chlorophanes spiza* 29/8 8 ex., 30/8 2 ♂ Folha Seca, 6/9 1 par Volta Velha.

Rufous-headed Tanager *Hemithraupis ruficapilla* 23/8 1 ♂ Serra da Canastra (BES), 29/8 6 ex., 30/8 1 par Folha Seca, 1/9 ca 5 ex., 2/9 1 ♂, 3/9 8 ex. Intervalles.

Chestnut-vented Conebill *Conirostrum speciosum* 28/8 1 par Perequê.

INCERTAE SEDIS

Bananaquit *Coereba flaveola* Tämigen allmän, sedd under 15 dagar. Den 29/8 sågs minst 50 ex. vid feeders kring Folha Seca.

Black-throated Grosbeak *Saltator fuliginosus* 29/8 1 ex. Folha Seca, 1/9 3 ex. Intervalles. Saltatorerna anses nu vara antingen tangaror eller sparvar och placerades tidigare i Cardinalidae.

Green-winged Saltator *Saltator similis* 20/8 1 ex. Serra do Cipó, 22/8 3 ex.+2 sj. Caraca, 28/8 1 ex. Perequê, 2/9 5 ex., 3/9 1 ex., 4/9 1 ex. Intervalles.

Thick-billed Saltator *Saltator maxillosus* 26/8 2 ex. Agulhas Negras Rd., 26/8 2 ex., 27/8 ca 5 ex. Itatiaia, 11/9 3 ex. Aparados da Serra.

Black-throated Saltator *Saltator atricollis* 24/8 5 ex., 25/8 1 ex. Serra da Canastra.

EMBERIZIDAE

Black-masked Finch *Coryphaspiza melanotis* 24/8 1 ♀ Serra da Canastra.

Gray Pileated-Finch *Coryphospingus pileatus* 22/8 2 ♂ Caraca.

Blue Finch *Porphyrospiza caerulescens* (nt) 20/8 1 ♂ Serra do Cipó.

Long-tailed Reed-Finch *Donacospiza albifrons* 30/8 2 ex. Campos do Jordão.

Bay-chested Warbling-Finch *Poospiza thoracica* 26/8 ca 10 ex. Agulhas Negras Rd.

Black-and-rufous Warbling-Finch *Poospiza nigrorufa* 5/9 2 ex., 6/9 1 ex. São José dos Pinhais, 8/9 2 ex. Taim.

Buff-throated Warbling-Finch *Poospiza lateralis* 26/8 ca 10 ex. Agulhas Negras Rd., 30/8 5 ex., 31/8 ca 10 ex. Campos do Jordão.

Gray-throated Warbling-Finch *Poospiza cabanisi* 4/9 2 ex. Intervalles, 6/9 2 ex. São José dos Pinhais, 10/9 ca 10 ex., 11/9 ca 10 ex. São Francisco de Paula/Aparados da Serra.

Blue-black Grassquit *Volatania jacarina* 21/8 1 ♀ Serra do Cipó, 22/8 2 ♂ Caraca, 3 ♂ längs med vägen, 23/8 ca 25 ex., 24/8 ca 50 ex., 25/8 ca 20 ex. Serra da Canastra, 28/8 1 ♂ Angra dos Reis–Ubatua, 6/9 1 ♂ Itapoá–Garuva.

Buffy-fronted Seedeater *Sporophila frontalis* (VU) 28/8 3 ex. Itatiaia, 1/9 1 ex. Intervalles (SS). En av flera nomadiska arter som är specialiserade på fröbärande bambu.

Plumbeous Seedeater *Sporophila plumbea* 24/8 ca 10 ex. Serra da Canastra.

Rusty-collared Seedeater *Sporophila collaris* 8/9 3 ♂, 4 ♀ Taim.

Yellow-bellied Seedeater *Sporophila nigricollis* 20/8 ca 10 ex., 21/8 2 ex. Serra do Cipó, 22/8 1 ♂ Caraca, 24/8 1 ♂ Serra da Canastra.

Dubois's Seedeater *Sporophila ardesiaca* 21/8 1 ♂, 22/8 ca 30 ex. Caraca. Betraktas som art av SACC, Clements och BirdLife, om än med vissa förbehåll. Det faktum att Yellow-bellied och Dubois's förekommer sympatriskt och att det inte bara rör sig om enstaka fåglar pekar dock på att det trots allt är en god art.

Double-collared Seedeater *Sporophila caerulescens* 20/8 4 ex. Serra do Cipó, 22/8 ca 5 ex. Caraca, 24/8 1 ♂, 25/8 1 ♂ Serra da Canastra, 26/8 2 ♀, 27/8 ca 10 ex., 28/8 1 ♀ Itatiaia, 30/8 5 ex. Campos do Jordão, 6/9 2 ♂ Volta Velha.

White-bellied Seedeater *Sporophila leucoptera* 23/8 2 ♂ Serra da Canastra.

Uniform Finch *Haplospiza unicolor* 26/8 1 ♂, 27/8 1 ♂, 4 ♀, 28/8 1 ♂ Itatiaia, 1/9 4 ex., 2/9 2 ex., 3/9 6 ex. Intervalles.

Saffron Finch *Sicalis flaveola* 20/8 3 ex., 21/8 3 ex. Serra do Cipó, 22/8 8 ex. Caraca, 23/8 ca 30 ex., 24/8 ca 10 ex., 25/8 ca 5 ex. Serra da Canastra, 28/8 3 ex. Fazenda Angelim, 5-6/9 minst 100 ex. Volta Velha, 8/9 ca 25 ex. Taim, 10/9 ca 5 ex. São Francisco de Paula, 11/9 ca 25 ex. Aparados da Serra.

Stripe-tailed Yellow-Finch *Sicalis citrina* 24/8 10 ex. Serra da Canastra.

Wedge-tailed Grass-Finch *Emberizoides herbicola* 24/8 ca 10 ex. Serra da Canastra, 11/9 1 ex. Aparados da Serra.

Lesser Grass-Finch *Emberizoides ypiranganus* 10/9 1 ex. Cambará do Sul.

Pale-throated Pampa-Finch *Embernagra longicauda* 21/8 2 sj. ♂ Serra do Cipó.

Great Pampa-Finch *Embernagra platensis* 24/8 1 sj. ♂+1 ex. Serra da Canastra, 5/9 2 ex. São José dos Pinhais, 7/9 3 ex., 9/9 5 ex. Cassino, 8/9 5 ex. Taim, 10/9 4 ex., 11/9 2 ex. Cambará do Sul.

Yellow Cardinal *Gubernatrix cristata* (EN) 7/9 1 ♀ Porto Alegre–Camaquã. Synnerligen öväntad!

Half-collared Sparrow *Arremon semitorquatus* 1/9 1 ♂ Intervalles.

Grassland Sparrow *Ammodramus humeralis* 20/8 3 ex. Serra do Cipó, 23/8 2 ex., 24/8 10 ex., 25/8 2 ex. Serra da Canastra.

Rufous-collared Sparrow *Zonotrichia capensis* Sedd dagligen, mestadels i smärre antal.

CARDINALIDAE

Lowland Hepatic-Tanager *Piranga flava* 20/8 1 par Serra do Cipó (SS).

Red-crowned Ant-Tanager *Habia rubica* 29/8 1 par, 30/8 1 par Folha Seca, 2/9 1 par, 3/9 1 ♀ Intervalles, 6/9 1 par Volta Velha.

ICTERIDAE

Saffron-cowled Blackbird *Xanthopsar flavus* (VU) 10/9 85 ex. N São Francisco de Paula. En av resans absolut finaste obsar var när denna flock i underbart kvällsljus leddes av ett par Black-and-white Monjitas. Flockar i den här storleken ses sällan nuför tiden!

Yellow-winged Blackbird *Agelasticus thilius* 7/9 1 juv. ♂, 9/9 5 ex. Cassino, 8/9 ca 20 ex. Taim.

Chestnut-capped Blackbird *Chrysomus ruficapillus* 7/9 ca 15 ex., 9/9 ca 20 ex. Cassino, 8/9 minst 3 000 ex. Taim. Förmodligen många fler.

White-browed Blackbird *Sturnella superciliaris* 7/9 5 ex. S Camaquã, 9/9 5 ex. Cassino.

Bay-winged Cowbird *Molothrus badius* 7/9 ca 5 ex. Porto Alegre–Camaquã, 8/9 ca 10 ex. Taim, 9/9 1 ex. längs med vägen.

Shiny Cowbird *Molothrus bonariensis* Tämligen allmän–lokalt allmän, sedd under 18 dagar.

Giant Cowbird *Molothrus oryzivorus* 23/8 4 ex. Serra da Canastra.

Golden-winged Cacique *Cacicus chrysopterus* 26/8 1 ex. Agulhas Negras Rd., 31/8 1 ex. Campos do Jordão, 1/9 2 ex., 2/9 2 ex., 4/9 ca 10 ex. Intervalles, 11/9 3 ex. Aparados da Serra.

Red-rumped Cacique *Cacicus haemorrhous* 26/8 ca 20 ex., 27/8 ca 30 ex., 28/8 2 ex. Itatiaia, 29/8 2 ex., 30/8 1 ex. Folha Seca.

Crested Oropendola *Psarocolius decumanus* 20/8 1 ex. Serra do Cipó, 21/8 1 ex.+1 sj., 22/8 ca 5 ex. Caraca, 23/8 ca 5 ex., 24/8 10 ex., 25/8 ca 30 ex. Serra da Canastra, 29/8 1 ex., 30/8 1 ex. Folha Seca.

Yellow-rumped Marshbird *Pseudoleistes guirahuro* 21/8 ca 10 ex. Serra do Cipó, 23/8 11 ex., 24/8 ca 20 ex., 25/8 7 ex. Serra da Canastra, 10/9 ca 10 ex. Cambará do Sul.

Brown-and-yellow Marshbird *Pseudoleistes virescens* 7/9 ca 25 ex., 9/9 ca 10 ex. Cassino, 8/9 6 ex. Taim.

Scarlet-headed Blackbird *Amblyramphus holosericeus* 7/9 2 ex. Camaquã–Pelotas, 8/9 2 ex. Taim, 9/9 1 ex. Cassino, 1 ex. Cassino–Pelotas.

Chopi Blackbird *Gnorimopsar chopi* 22/8 2 ex. Bom Despacho–Luz, 24/8 ca 10 ex., 25/8 3 ex. Serra da Canastra, 28/8 1 ex. Perequê, 30/8 2 ex. Campos do Jordão, 3/9 4 ex. Intervalles.

FRINGILLIDAE

Purple-throated Euphonia *Euphonia chlorotica* 20/8 3 hörda Serra do Cipó, 22/8 1 hörd Caraca, 23/8 1 hörd, 24/8 1 par+1 hörd, 25/8 1 hörd Serra da Canastra.

Violaceous Euphonia *Euphonia violacea* 29/8 4 ex., 30/8 5 ex. Folha Seca, 6/9 2-3 ex. Volta Velha.

Green-chinned Euphonia *Euphonia chalybea* (nt) 4/9 1 par Intervales.

Chestnut-bellied Euphonia *Euphonia pectoralis* 27/8 2 ♂ Itatiaia, 29/8 1 par, 30/8 5 ex. Folha Seca, 29/8 1 ♂ Fazenda Angelim.

Blue-naped Chlorophonia *Chlorophonia cyanea* 27-28/8 1 ♂ Itatiaia.

Hooded Siskin *Spinus magellanicus* 21/8 1 par Serra do Cipó, 31/8 1 ♂ Campos do Jordão, 4/9 3 ex. Intervales, 5/9 3 ex. São José dos Pinhais, 5/9 2 ex., 6/9 ca 20 ex. Volta Velha, 10/9 ca 5 ex., 11/9 2 ex. São Francisco de Paula, 11/9 5 ex. Aparados da Serra.

PASSERIDAE

House Sparrow *Passer domesticus* Noterad under 14 dagar, mestadels i smärre antal.

ESTRILDIDAE

Common Waxbill *Estrilda astrild* 30/8 ca 10 ex. Ubatuba, 5/9 ca 40 ex. São José dos Pinhais.

511 arter

Däggdjur

Giant Anteater *Myrmecophaga tridactyla* 24/8 2 ex. Serra da Canastra. Sooo coooool!!!

Black-tufted Marmoset *Callithrix penicillata* 21/8 1 ex. Serra do Cipó–Belo Horizonte, 23/8 3 ex. Serra da Canastra.

Black-fronted Titi *Callicebus nigrifrons* 23/8 3 ex. Serra da Canastra. Titi-komplexet har splittats i en mängd olika arter på senare år. Tidigare kallad Masked Titi *C. personatus*.

Black Capuchin *Cebus nigritus* 26/8 1 ex., 27/8 ca 10 ex. Itatiaia. Splittad från Brown Capuchin *C. apella* enligt modern systematik.

Brown Howler *Alouatta guariba* 27/7 hörd Itatiaia, 1/9 5 ex., 2/9 1 ex. Intervales.

Southern Muriqui *Brachyteles arachnoides* 3/9 3 ex. Intervales. Woolly Spider Monkey har splittats i Northern och Southern Muriqui, med totala populationer på 300 respektive 1 000 individer. En riktig raritet alltså, och precis som Rafael påpekade är det Nya världens största apa!

Pampas Deer *Ozotocerus bezoarcticus* 24/8 ca 10 ex. Serra da Canastra.

Red Brocket Deer *Mazama americana* 2/9 1 ex. Intervales.

Guianan Squirrel *Sciurus aestuans* 21/8 2 ex. Caraca, 27/8 1 ex., 28/8 1 ex. Itatiaia.

Capybara *Hydrochaeris hydrochaeris* 8/9 ca 70 ex. Taim.

Brazilian Guinea Pig *Cavia aperea* 2/9 2 ex. Intervales, 8/9 ca 20 ex. Taim.

European Hare *Lepus europaeus* 10/9 1 ex. Cambará do Sul.

Crab-eating Fox *Cerdocyon thous* 1/9 1 ex., 2/9 1 ex., 4/9 2 ex. Intervales.

Neotropical Otter *Lontra longicaudis* 31/8 1 ex. Campos do Jordão.