

UGANDA



Long-toed Lapwing Foto Lars Högström



Augur Buzzard Foto Lars Högström

29 januari – 19 februari 2011

Deltagare

Peter Berglin, Jönköping

Mikael Frost, Sollentuna

Stig Holmstedt, Gysinge, initiativtagare

Lars Högström, Gårdby

Sven Karlsson, Sundbyberg

Anders Lundquist, Gårdby

Jan Ohlsson, Nynäshamn

Jüri Seim, Stockholm

Per Ålind. Kalmar

Guide. Alfred Twinomujuni

Rapport:

Dagbok: Stig Holmstedt

Artlista: Anders Lundquist med bistånd
från Stig Holmstedt och Per Ålind.

Fotografer: Lars Högström

(<http://www.hogstrom.fotosidan.se>),

Sven Karlsson

Peter Berglin.



Alfred Twinomujuni hade inte bara exeptionellt goda ögon för fåglar. Paparazzi Lars Högström.



Vitvingade tärnor i massor – en av resans många höjdpunkter. Foto Peter Berglin

Program

1. Friday January 28 januari.

Departure from Stockholm /Arlanda at 07.10 with British Airways. In Heathrow at 09.00. From Heathrow at 10.45. Arrival in Entebbe at 22.10 Overnight at Golfview Inn.

2. Saturday January 29.

Mabamba Swamp (Shoebill). Drive to Masindi. Overnight at Masindi Hotel.

3. Sunday January 30

Budongo; Busingiro area, Lake Albert, The escarpment. Overnight at Masindi Hotel.

4. Monday January 31

Full day Budongo; Royal mile, Spinetail pond. .Overnight at Masindi Hotel.

5. Tuesday February 1

AM Kanyo Pabidi; PM Murchison Falls. After the dark drive to the airstrip for nightjars. Overnight at Nile Safari Camp.

6. Wednesday February 2

AM Game drive on the north side of the Nile. . PM boattrip to the falls. Overnight at Nile Safari Camp.

7. Thursday February 3

All day drive to Kibale. Overnight at Chimpanzee Guest House

8. Friday February 4

Full day Kibale forest with surroundings. Overnight at Chimpanzee Guest House

9. Saturday February 5

AM. Drive to Semliki NP. PM Birding around the hot springs. Overnight Vanilla Hotel

10. Sunday February 6

Full day Semliki NP. Overnight Vanilla Hotel

11. Monday February 7

AM. Drive to Queen Elisabeth NP. PM birding around the lodge. Overnight at Jacana Lodge

12. Tuesday February 8

Full day at QENP; AM game drive ,PM Boat trip on the Kazinga channel + another game drive north of Mbeya Lodge. Overnight at Jacana Lodge

13. Wednesday February 9

AM. Drive to the Ishasha sector of the QENP. PM Game and birding drive. Overnight at Ishasha Wilderness Camp

14. Thursday February 10

AM Fig tree loop. PM drive to Bwindi. Overnight at Buhoma Community Rest Camp

15. Friday February 11

Full day in Bwindi Impenetrable forest – one group gorilla tracking/the other birding. Overnight at Buhoma Community Rest Camp

16 Saturday February 12

Full day in Bwindi Impenetrable forest ; one group gorilla tracking/the other birding. Overnight at Buhoma Community Rest Camp.

17. Sunday February 13

Bwindi; Buhoma early morning, the Neck and towards Ruhiza. Overnight at Community Bandas

18. Monday February 14.

Bwindi; Full day Ruhiza, birding in the forest down to the Mubwindi Swamp. Overnight at Community Bandas

19. Tuesday February 15

Bwindi; Ruhiza bamboo area. PM Drive to Kisoro Stops at papyrus swamp and other sites. Overnight at Tourist Hotel.

20. Wednesday February 16.

AM Mghinga NP. PM Drive to Lake Mburo. Overnight at Mantana Tented Camp-

21. Thursday February 17.

AM Lake Mburo .PM Drive to Jinja. Overnight at Kingfisher Lodge.

22. Friday February 18.

Full day in Mabira Forest. Overnight at Kingfisher Lodge.

23. Saturday February 19


AM. Mabira Forest PM Drive to Entebbe. Boat trip in Mutemba Bay.

24. Sunday February 20.


Flight home with British Airways from Entebbe at 00.40. In Heathrow at 06.45. From Heathrow at 10.45, at Stockholm/Arlanda at 14.15.




Två pojkar från Bwindi. Bilden visar också på en gång bergsregnskogsbeklädda kullar i bakgrunden. En bråkdel av den ursprungliga skogen återstår idag. Den har fått ge vika för ett terrasserat jordbrukslandskap. Foto Sven Karlsson.



Tabell 1 Antalet arter per dag.



Tabell 2 Antalet nya arter per dag. Det styrs givetvis av antalet biotoper man rör sig genom en dag och dessutom ser man ganska lätt vilka dagar som var tunga resdagar. Den 10:e anlände vi till Bwindi och mötte högländsregnskog med en hel del nya arter.



Tabell 3 Samma som tidigare men ackumulerat dag för dag.



African Wood Owl som Alfred upptäckte på dagkvist inne i ett tätt snår. Det tog ett bra tag innan alla fixerat den trots att avståndet understeg 15 meter. Alfred hade fantastiska ögon och man får beundra hans tålamod med de "synsvaga" svenska gubbarna.

Dagbok

Fredag 28 januari. Efter en ca 14 timmar lång flygresa med British Airways via London landade vi vid 9-tiden på kvällen på flygplatsen i Entebbe. Vår guide, Alfred Twinomujuni från AvianWatchUganda, syntes dock dessvärre ingenstans så vi fick så småningom ta taxi till vårt förbokade hotell, Golfview Inn.

Lördag 29 januari. På morgonen dök Alfred upp med två Toyto Landcruisers, förda av våra tålmodiga chaufförer. Det visade sig att han trott att vi skulle komma med KLM, som hade landat någon timme tidigare föregående kväll. Förtreten var nu glömd och det skulle f.ö. visa sig att detta blev det i stort sett enda missödet på resan.



Först på långt håll sedan



närmare och närmare och närmare. Foton Peter Berglin

Vi körde snabbt ut mot Mahamba swamp, någon timme från stan, där våra ökstockar som skulle ta oss ut i papyrusträskan, väntade. Målarten var förstås *Shoebill* och det dröjde inte särskilt länge förrän en sådan upptäcktes.

Så småningom kom vi den så nära som bara ett tjugotal meter. Bengt Bergs legendariska Abu Markub hade sedan länge varit en drömmart för de flesta, varför kikare och kameror gick varma. Ytterligare ett exemplar av arten sågs på lite håll, men i övrigt var det inte så överdrivet mycket fågel här. Dock noterades bl.a. *African Darter*, *Spur-winged Goose*, *Yellow-billed Duck*, *Hooded Vulture* (är ganska ovanlig i Uganda utom i området strax norr om Lake Victoria), *Black Crake*, *African Jacana*, *Grey Crowned Crane*, *Long-toed Lapwing* (allmän), *Gull-billed Tern*, *Blue-breasted Bee-eater*, *Greater Swamp Warbler*, *Winding Cisticola*, *Swamp Flycatcher*, *Weyn's Weaver* och *Fan-tailed Widowbird*. *Red-chested Flufftail* och *Lesser Jacana* hördes. I omgivningarna blev vi visade på den ganska lokala *Orange Weaver* och vi såg bl.a. också *Lizard Buzzard*, *African Goshawk*, *Grey Kestrel*, *Scaly Francolin*, *Great Blue Turaco*, *White-throated Bee-eater*, *Broad-billed Roller*, *Black-and-white-casqued Hornbill*, *Angola Swallow*, *White-headed Saw-wing*, *Yellow-throated Longclaw*, *Sooty Chat*, *Brown-throated Wattle-eye*, *Violet-backed Starling* och *Slender-billed Weaver*.



Orange Weaver. Foton Peter Berglin

Efter denna lyckade start anträdde vi den långa bilfärden norrut mot Masindi. Som vi blivit förvarnade om var trafiksituationen i Kampala förskräcklig, men vi klarade oss till

slut genom staden efter att också ha förtärt en god lunch här. Arter längs vägen var bl.a. *African Hobby*, *Eastern Grey Plantain-eater*, *Striped*, *Grey-headed* och *Woodland Kingfisher*. *Abyssinian Roller* (den enda på resan) *Yellow-throated Greenbul*, *Spotted Flycatcher*, *White-shouldered Tit*, *Marico Sunbird*, *Black-headed Gonolek*, *Northern Puffback*, *Grey-headed Bush-Shrike*. *Piacpiac*, *African Black-headed Oriole*, *Yellow-fronted Canary* och *African Golden-breasted Bunting*. På kvällen tog vi in på det trevliga Masindi Hotel.

Söndag 30 januari. Tidigt på morgonen drog vi iväg mot Budongo Forest, där vi först skådade längs vägen i Busingiro-området. På ditvägen upptäcktes fem läckra *Brown Twinspots* i vägkanten.

När vi anlände till Busingiro-området var ropande *Chimpansees* på håll nästan det första vi fick höra. De syntes dock inte, varken nu eller senare på dagen, så vi fick nöja oss med de mindre aporna *Blue Monkey* och *Red-tailed Guenon*. Av fågel bjöd skogen först och främst på den av många eftersökta *Ituri Batis* som sjöng och syntes fint uppe i de höga träden. Vidare sågs *Crested Guineafowl*, *Great Blue* och *Black-billed Turaco*, *Chocolate-backed Kingfisher* (mycket efterlängtat synobs av denna lätthörda, men svårsedda skogsart), *African Dwarf Kingfisher*, *White-thighed Hornbill*, *Little*, *Slender-billed*, *Little Grey* och *White-throated Greenbul*, *Green* och *Lemon-bellied Crombec*, *Rufous-crowned Eremomela*, *Buff-throated Apalis*, *Grey-throated*, *Forest*, *Sooty* och *Chestnut-capped Flycatcher*, *African Shrike-flycatcher*, *Green-headed*, *Green-throated* och *Olive Sunbird*, *Western Black-headed Oriole* och *White-breasted Negrophinch*.

Efter denna givande skogsvandring ställde vi kosan ned till en liten by vid stranden av Lake Albert där vi började med att intaga medhavd lunch. Vid den efterföljande skådningen längs

stranden och ute på en liten udde sågs bl.a. *Pink-backed Pelican*, *Osprey*, *Red-necked Falcon*, *Allen's Gallinule* (en juv. fågel i en vasskant – mycket oväntat!), *Heuglin's* och *Lesser Black-backed Gull*, *Gullbilled* och *Whiskered Tern*, *African Reed Warbler* och *Marsh Tchagra*.



Vårt första möte med Abyssinian Ground-hornbill gjordes vid the Escarpment. Foto Peter Berglin.

Nästa programpunkter blev vandringar nedanför och uppe på the Escarpment, alltså den stora förkastningsslutningen ovanför Lake Albert. Arter här var *Abdim's Stork* (ca 70 ex i skruv), *Crested Francolin*, *Vinaceous Dove*, *Klaas's Cuckoo*, *Horus Swift*, *African Pygmy Kingfisher*, *Swallow-tailed Bee-eater*, *Green Wood-hoopoe*, *Black Scimitarbill*, *African Grey Hornbill*, *Abyssinian Ground-hornbill*, *Spot-flanked* och *Black-billed Barbet*, *Flappet Lark*, *Cliff Chat*, *White-browed Scrub-Robin*, *Spotted Morning-Thrush*, *Northern Crombec*, *Rattling Cisticola*, *Black-headed Batis*, *Silverbird*, *Beautiful* och *Western Violet-backed Sunbird*, *Chestnut-crowned Sparrow-Weaver*, *Little Weaver* och *Red-winged Pytilia*. Den stora attraktionen uppe på the Escarpment blev dock en orm av vid tillfället obestämd art som nyss dödat och slingrat sig om en *Striped Mouse*.

Måndag 31 januari. Efter ännu en natt på Masindi Hotel åkte vi ut till Budongo Forest igen och denna gång startade vi med den

klassiska vandringen längs den breda leden the Royal Mile. Det blev återigen ett mycket lyckat utbyte, särskilt längst bort på leden där vi vände. Vi noterade bl.a. *Grey Parrot*, *Red-chested Cuckoo* (fina närobsar), *Yellowbill*,



Blue-throated Roller betraktade oss obekymrat från sin utkicksplats. Foto Peter Berglin.

Blue-breasted, *Chocolate-backed*, *African Pygmy* och *African Dwarf Kingfisher*, *Blue-throated Roller*, *Hairy-breasted Barbet*, *Least Honeyguide*, *Brown-eared* och *Yellow-crested Woodpecker*, *Purple-throated Cuckoo-shrike*, *Cameroon Sombre* och *Spotted Greenbul*, *Rufous Flycatcher-Thrush*, *Uganda Woodland Warbler*, *Green Hylia*, *Grey Longbill*, *Black-capped Apalis*, *Ashy Flycatcher*, *Chestnut Wattle-eye*, *African* och *Red-bellied Paradise-flycatcher*, *Brown Illadopsis*, *Dusky Tit*, *Tit-Hylia*, *Copper* och *Superb Sunbird*, *Yellow-mantled Weaver* samt *Red-headed Malimbe*.



En av attraktionerna Cassin's Spinetail fångad precis när den ska dricka. Foto Peter Berglin.

På eftermiddagen besöktes en liten damm strax utanför skogen. De stora attraktionerna här var spinetails av tre arter som drack i flykten från dammens yta. Det var en *Mottled*, fem *Sabine's* och en eller två *Cassin's Spinetails*. Annat vid dammen var bl.a. en *Open-billed Stork*, två ad + två juv *Grey Crowned Cranes*, en *Shining-blue Kingfisher*, ca 30 *European Bee-eaters* och en *Rufous-chested Swallow*.

På kvällen avslutade vi med fyra *Nahan's Francolins* samt tre hörda *White-spotted Flufftails* vid vägen i Busingiroområdet.

Tisdag 1 februari. Vi startade morgonen i den fina lilla regnskogen Kanya Pabidi som ligger i södra delen av Murchison Falls National Park. Också här hörde vi *Chimpansees* på morgonen. Specialarten här är annars *Puvel's Illadopsis* med en isolerad östlig utpost. Naturligtvis letade Alfred fram två sådana åt oss. Som alla i sitt släkte är de skygga marklevande regnskogsfåglar, men med visst tålamod fick vi så småningom ganska bra obsar på dem.

I övrigt såg vi här *Crested Guineafowl*, *Afep Pigeon*, *Yellowbill*, *Narina Trogon*, *Yellow-billed Barbet*, *Western Nicator*, *Red-tailed* och *Green-tailed Bristlebill*, *Honeyguide Greenbul*, *Forest Robin*, *Fire-crested Alethe*, *White-tailed* och *Red-tailed Antthrush*, *Green Hylia*, *Green Crombec*, *Grey Longbill*, *Chestnut Wattle-eye*, *Brown Illadopsis* samt *Blue-throated Brown* och *Grey-headed Sunbird*.

Färden fortsatte nu in i Murchison Falls National Park. Det kom att bli ett spännande återseende för mig som varit i parken på min första Afrikaresa år 1968, d.v.s. före Idi Amin och hans härjningar bland människor och djur. Under hans tid sköts en stor del av nationalparkernas djur bort, men de påstås sedan ha återhämtat sig. Frågan var nu hur mycket. Jag blev lugnad på den punkten, vilket kommer att framgå nedan.



Spänningen är stor och det händer något vid varje stopp. Bilden är tagen en knapp kilometer från färjövergången söderifrån. Foto Peter Berglin.

Vi for in i parken söderifrån och precis som 43 år tidigare var det inte så mycket djur i den södra delen. Avsaknaden av elefanter har gjort vegetationen ganska tät där den inte, som på många ställen, brunnit. Av däggdjur såg vi bara talrikt med *Savannah Baboons*, en del *Vervet Monkeys* samt ett 40-tal *Kob Antelopes*, ett tiotal *Warthogs* och fyra *African Buffalos*. Bland fåglarna kan nämnas *White-backed Vulture*, *Black-chested Snake-Eagle*, *Dark Chanting-Goshawk*, *Shikra*, *Honey Buzzard*, *Grasshopper Buzzard*, *Wahlberg's Eagle* (i särklass den vanligaste Aquilan i Uganda), *Long-crested Eagle*, *Bateleur*, *Grey Kestrel*, *African Wattled Lapwing*, *Alpine och Eurasian Swift*, *Red-throated och Northern Carmine Bee-eater*, *Greater Honeyguide* och *Pale Flycatcher*. De flesta fåglarna sågs vid vattenfallen som gett parken dess namn och här tittade vi även på *Rock Pratincoles*, tre ex.

Vi tog sent på eftermiddagen in på Nile Safari Camp, ett lyxigt ställe med fin mat, god betjäning och fantastisk utsikt över Nilen och dess norra strand. På andra sidan floden gick ganska stora mängder däggdjur – ett 20-tal Hippopotamus, över 25 Giraffes, ca 15 Waterbucks och minst 120 African Buffalos. En kvällsrunda gav först och främst, och mycket oväntat, en *Shoebill* som stod på en jordkulle i papyrusen på andra sidan floden. Sedan såg vi också en specialart för platsen – två *Red-winged Grey Warblers*.

Onsdag 2 februari. På förmiddagen färjades vi över floden och gjorde en game drive norr om Nilen. På eftermiddagen fortsatte vi med en flodtur uppför Nilen till de stora fallen. Till min stora glädje blev siffrorna vad gällde de stora däggdjuren i flera fall ännu bättre än vid mitt förra besök här den 22 februari 1968

	22/2-1968	2/2-2011
Common Hippopotamus	200-300	400+
Common Warthog	30-40	100+
Giraffe	1	25
African Buffalo	300-400	500+
Bushbuck	1-2	4
Waterbuck	50-100	100+
Kob	400-500	600+
Oribi	ca 100	150+
Hartebeest	200-300	50 +
African Elephant	50-60	ca 20

Tabell 4. En jämförelse av antalet sedda individer däggdjursarter under en resa 1968 och vår resa 2011 till Muchison Falls.

Det var alltså mycket roligt att konstatera att stora däggdjur i nationalparker faktiskt kan komma tillbaka, även efter svåra reduktioner! Förutom däggdjur såg vi ett antal, ofta mycket stora krokodiler, men de var, lite förvånade, betydligt mindre talrika än vid besöket år 1968. Man hade ju hört att Idi Amin skulle ha sparat krokodilerna för att de skulle ta hand om de motståndare han slängde i Nilen.....

Fågelmässigt blev det också en hel del. Nya för resan var *Knob-billed Goose*, *White-faced och Fulvous Whistling-Duck*, *Montagu's och Pallid Harrier*, *Steppe Eagle*, *Lanner Falcon*, *Spotted och Senegal Thickknee*, *Black-headed och Senegal Lapwing*, *White-fronted och Caspian Plover*, *Collared Pratincole*, *Grey-headed Gull*, *African Skimmer* (200 ex i flock), *Bruce's Green Pigeon*, *Namaqua Dove*, *Great Spotted Cuckoo*, *Senegal Coucal*, *Giant Kingfisher*, *Little*

och *Blue-cheeked Bee-eater*, *European Roller*, *Grey Woodpecker*, *Wire-tailed Swallow*, *White-fronted Black Chat*, *Willow Warbler*, *Chiff-Chaff*, *Black-backed* och *Croaking Cisticola*, *Gambaga Flycatcher*, *Woodchat* och *Isabelline Shrike*, *Yellow-billed Oxpecker*, *Wattled Starling*, *Speckle-fronted* och *Yellow-backed Weaver*, *Red-billed Quelea*, *Yellow-Mantled Widowbird* och *Bar-breasted Firefinch*. Nedanför fallen sågs minst 30 *Rock Pratincoles*.



Rock pratincole en vadarsvala som håller till framförallt vid forsande vatten - kanske inte samma beteende som strömstjärnor men definitivt samma miljö. Foto Peter Berglin.

På kvällen gjorde vi en nattskärretur till flygfältet söder om parken. Det blev en verklig fullträff med drömbosar på den minst sagt märkliga *Standard-winged Nightjar* (fem hannar och åtta honor!) samt två *Denham's Bustards*. På tillbakavägen upptäckte jag plötsligt en orm, en typisk vipera, framför bilen. Vi lyckades undvika att köra på den, men den andra bilen träffade tyvärr bakkroppen. Det visade sig var en ganska liten *Gaboon Viper*, alltså den orm som har de absolut längsta gifttänderna. Det var en sorglig syn att se den mödosamt ta sig ut från vägen med inälvorna hängande ut ur den krossade bakkroppen.



Vi fick riktig närkontakt med en lejonhona med två ungar i nationalparken. Hon tittade barskt på oss innan hon försvann in bland buskarna med sina ganska stora ungar. Foto Sven Karlsson

Torsdag 3 februari. Denna dag blev det en lång och mödosam heldagstransport från Murchison Falls National Park till Kibale National Park. Vi gjorde förstås några skådarstopp längs vägen, det första i savannterräng inte så långt söder om Murchison Falls NP. Här noterade vi bl.a. *Swallow-tailed Bee-eater*, *Brown-backed Woodpecker*, *White-browed Robin-Chat*, *Olivaceous*, *Icterine*, *Barred* och *Buff-bellied Warbler*, *Zitting Cisticola*, *Grey-capped Warbler*, *Brubru*, *Vitelline*, *Masked*, *Spectacled*, *Holub's Golden* och *Little Weaver* samt *White-rumped Seedeater*.

Nästa längre stopp var i en frodig skogsterräng och gav bl.a. *Woolly-necked Stork*, *White-spotted Flufftail* (hörd), *Crowned Hornbill*, *Yellow-rumped Tinkerbird*, *White-browed Scrub-Robin*, *Black-and-white Shrike-flycatcher*, *Orange-tufted Sunbird* och *Grey-headed Oliveback*.

Några resnya arter i övrigt längs vägen var *Eastern Chanting-Goshawk*, *Black-bellied Bustard*, *Cinnamon-chested Bee-eater*, *Rock Martin*, *Common Stonechat*, *Pied Wheatear*, *Northern Black Flycatcher*, *Brown Babbler* och *Purple-headed Starling*.

Framme vid nordkanten av Kibale NP gjorde vi en vandring längs en ganska hårt trafikerad

väg som dock visade sig mycket givande. Nya arter för resan här blev *Dusky Long-tailed Cuckoo*, *Grey-throated Barbet*, *Black Saw-wing*, *Mountain Wagtail*, *Joyful Greenbul*, *Chubb's Cisticola*, *White-chinned Prinia*, *Cassin's Grey Flycatcher*, *Yellow White-eye*, *Little Green Sunbird* samt *Lüdher's* och *Many-coloured Bush-shrike*.

Vi tog in på det ganska enkla men trevliga Chimpanzee Guest House.

Fredag 4 februari. På förmiddagen gjorde vi en vandring inne i nationalparkens regnskog. Det var förvånansvärt lite fågel här och framför allt uteblev *Green-breasted Pitta* trots mycket tappra eftersök av både Alfred och en lokal guide. Nya fåglar blev *Toro Olive Greenbul*, *Brown-chested Alethe* samt *Bocage's Bush-shrike*, de senare tvså endast hörda.

Den stora begivenheten i Kibale var dock *chimpanserna* och efter mycket letande kom vi till sist i kontakt med en flock om ca 30 djur som så smångom medgav utomordentliga observationer, både i träden och på marken. Särskilt minnesvärd var en gammal hanne som behagfullt lade sig på rygg på marken, lade ena armen under huvudet och ena benet över det andra alltmedan han tittade på oss med sina stora svarta ögon. En annan ny apa för resan var *Grey-cheeked Mangabey*, två ex.

När det gällde fågel var det betydligt bättre i de kulturpåverkade marker som vi besökte vid lunchen och på eftermiddagen. Nya arter blev *African Crowned Eagle*, *African Wood Owl*, *White-rumped Swift*, *Black Bee-eater*, *Grassland Pipit*, *Grey-winged Robin-Chat*, *Black-necked Weaver* och *Black-bellied Seedcracker*.



Black-bellied Seedcracker, hona. Foto Peter Berglin

På kvällen åsåg några av oss en föreställning till förmån för naturskydd som framfördes av skolungdomar från trakten. I samband med detta uppvisade Peter oanade talanger i afrikansk dans...

Lördag 5 februari. Vår färd fortsatte nu mot Semliki National Park, ett stort regnskogsområde på gränsen till Kongo. För att komma till denna avlägsna nationalpark fick vi runda det stora bergsmassivet Ruwenzori på dess norra sida varifrån utsikten in mot Kongo var synnerligen storslagen. Nya resarter längs vägen, de flesta i och kring ett papyrusträsk rätt nära Kibale, var *Speckle-breasted Woodpecker*, *White-winged Warbler* (Papyrus Endemic, PE), *Siffling Cisticola*, *African Dusky Flycatcher*, *Olive-bellied Sunbird*, *Mackinnon's Fiscal*, *Papyrus Gonolek* (PE), *Black-crowned Waxbill*, *Brimstone Canary*, *African Citril* och *Papyrus Canary* (PE).



Papyrus Gonolek, som namnet antyder, förekommer endast i papyrusvassar. Foto Peter Berglin.

I Semliki gjorde vi en kortare vandring kring de heta källorna i parkens nordöstra del. Här fanns en del vadare, bl.a. *Three-banded* och *Little Ringed Plover*, *Ruff*, *Marsh Sandpiper* och *Little Stint*. I skogen blev det också en del nya arter – *Western Bronze-naped Pigeon* (hörd), *Black-casqued Wattled Hornbill*, *Cassin's Honeybird*, *Yellow-throated Nicator* (hörd) och *Grey Ground-Thrush* (hörd).

På kvällen tog vi in på Vanilla Hotel i en liten närbelägen by. Hotellet var förvånansvärt bra för att ligga så avsides, men tyvärr saknade tillfälligt (?) de flesta rummen rinnande vatten så rapportskrivaren fick ställa upp med sitt badrum.

Söndag 6 februari. Hela denna dag ägnades en vandring längs Kiruma Trail i Semliki National Park. Att skåda här ger många arter som man annars måste resa till farliga Kongo eller, i några fall dyra Gabon, för att få se. Vi noterade följaktligen en lång rad nya arter för resan, flera av dem karimatiska och efterlängtrade – *Hartlaub's Duck*, *Yellow-throated Cuckoo*, *Black-throated Coucal* (tämligen nyupptäckt här, endast hörd), *White-bellied Kingfisher*, *African Pied*, *Piping*, *Red-billed Dwarf* (hörd) och *Black Dwarf Hornbill*, *Red-rumped Tinkerbird*, *Willcox's*

Honeyguide, *Xavier's Greenbul*, *Green-tailed Bristlebill*, *Yellow Longbill*, *Olive-green Camaroptera*, *Blue-headed Crested-Flycatcher*, *Sooty Boubou*, *Crested Malimbe*, *Chestnut-breasted Negrofinch* samt *Red-fronted Antpecker*,

Andra trevliga arter var *Black Bee-eater*, *Blue-throated Roller*, *Black-and-white-casqued*, *White-thighed* och *Black-casqued Wattled Hornbill* (totalt såg vi sju arter hornbills), *Least Honeyguide*, *Yellow-crested Woodpecker* och *Yellow-throated Nicator* (sedd denna gång).

Ännu en natt tillbringades på Vanilla Hotel.

Måndag 7 februari. Nu förflyttade vi oss söderut mot Queen Elisabeth National Park. Vi började dock med en del skådning i utkanten av Semliki. Utbytet blev bl.a. *Ross's Turaco* (hörd), *Leaf-love*, *Wood Warbler*, *Red-faced Cisticola*, *Lead-coloured Flycatcher*, *Red-headed Quelea*, *Black Bishop* och *Orange-cheeked Waxbill*, den sistnämnda tämligen nyupptäckt här, långt från det angivna utbredningsområdet.

Längs vägen genom den antagligen rikaste delen av Uganda – öster om Ruwenzori – sågs inget anmärkningsvärt, men när vi kom in i Queen Elisabeth NP trillade några nya arter för resan in – *Black-shouldered Kite*, *Eurasian Hobby*, *Common Scimitarbill* och *White-headed Barbet*.

Vi tog in på Jacana Lodge vid en liten kratersjö. Lodgen var jättefin (gigantiska och lyxiga stugor!) och maten utmärkt, men den låg tyvärr lite off-side, åtminstone för större däggdjur. Kvällskådning i omgivningarna gav dock en del nya fågelarter – *Little Grebe*, *Augur Buzzard*, *Yellow-spotted Barbet*, *Red-capped Robin-Chat*, *Splendid Starling* och *Grosbeak Weaver*.

Tisdag 8 februari. Hela denna dag tillbringades i Queen Elisabeth National Park. Vi började

med en game drive i parkens viltrikaste del, väster om den stora vägen. På vägen dit såg de som åkte i den andra bilen resans enda *Spotted Hyena*. Av andra däggdjur sågs sedan relativt gott om *Warthogs*, *African Buffalos* och *Kob Antelopes*. Även fyra *lejon* noterades.

Nya fågelarter blev *White-faced Whistling-Duck*, *Lappet-faced Vulture* (hela åtta ex!), *Brown Snake-Eagle*, *African Marsh Harrier*, *Gabar Goshawk*, *Red-necked Spurfowl* (allmän!), *Common Quail*, *African Crake*, *Red-headed Lovebird*, *Common Cuckoo*, *Square-tailed* och *Black-shouldered Nightjar* (båda arterna nattskärror strax före gryningen på utvägen från Jacana Lodge), *Rufous-naped Lark*, *Black-lored Babbler*, *Sulphur-breasted Bush-Shrike*, *Compact Weaver* och *Red-collared Widowbird*.

Vi återvände till lodgen för lunch och vid skådning i omgivningarna i samband därmed noterades bl.a. *Ross's Turaco* och *Shining-blue Kingfisher* (två ex).



White-throated Bee-eater inte ovanlig i Queen Elisabeth NP-
Foto Peter Berglin.

Eftermiddagens båttur på Kazinga Channel blev mycket givande. Stränderna kantades av mängder av större däggdjur och vattenbundna fåglar. Vi uppskattade bl.a. minst 40 *African Elephants*, 300+ *Hippos*, 200+ *African Buffalos*

och 30+ *Waterbucks*. Nya fågelarter blev *Great White Pelican*, *Yellow-billed Stork*, *African Spoonbill*, *Water Thick-Knee* (ca 70 ex.!), *Temminck's Stint*, *Curlew Sandpiper*, *Common Black-headed Gull*, *White-winged Tern*, *Plain Martin*, *Northern Brown-throated Weaver* (allmän vid stränderna) samt *Southern Red Bishop*. Vid ett drinkstop på Mbeya Lodge, som vi från början skulle varit inbokade på, noterade vi att den hade en fantastisk utsikt och storviltrika omgivningar – mycket av storviltet kunde f.ö. ses direkt från lodgen. Den var dock jättestor och full av folk och dessutom saknades fin skog som det ju fanns vid den mindre och trivsammare Jacana Lodge.

Vi gjorde en eftermiddags/kvällstur i omgivningarna av Mbeya Lodge och fick då bl.a. *Lanner Falcon*, *Temminck's Courser*, *Spotted Eagle-Owl*, *Red-capped Lark*, *Red-throated Pipit* och *Trilling Cisticola*. Vi letade också efter Giant Hog och Leopard, som båda sägs var ganska lätta att se i detta område, men hittade ingen. När det mörknat såg vi *Slender-tailed* och *Swamp Nightjar* samt höll på att köra på en *Spitting Cobra*.

Onsdag 9 februari. Vi lämnade Jacana Lodge på morgonen och for söderut genom Queen Elisabeth NP till Ishasha-sektorn av parken. Längs vägen var terrängen ganska sluten beroende på brist på betande större djur, något som i sin tur berodde på långvarigt tjuvskytte. Av fåglar var det mest minnesvärda ett bo av *African Crowned Eagle* alldeles nära vägen, till på köpet med båda fåglarna närvarande. Fantastiskt med så nära obsar av denna Afrikas svar på sydamerikas Harpya. Nya arter var *Bare-faced Go-away-bird*, *Black Cuckoo-Shrike* (en hona som inte såg riktigt frisk ut låg på vägen!), *African Moustached Warbler*, *Scarlet-chested Sunbird* och *Fawn-breasted Waxbill*.

Nere i Ishasha-sektorn blev landskapet öppnare och här fanns det också en hel del större däggdjur, framför allt *African Buffalo*, *Kob Antelope* och *Topi*, den senare ny för resan. Vi tog in på det mycket lyxiga Ishasha Wilderness Camp. Skådning häromkring och vid en tur ned till stranden av Lake Edward gav som nya arter *Ayre's Hawk-Eagle*, *Martial Eagle*, *Common Button-Quail* och *Levaillant's Cuckoo*.

Torsdag 10 februari. I gryningen såg vi två *lejon* som lunkade parallellt med vår väg. Vi körde sedan the Fig Tree Loop för att söka få se trädklättrande sådana också. Tyvärr uteblev de dock utan vi fick nöja oss med nya fågelarter som *White-headed Vulture* (de enda på resan), *Tawny Eagle* (också den enda på resan), *Blue Quail* (endast sedd av Lasse), *Black-winged Pratincole*, *Pearl-spotted Owlet*, *White-tailed Lark* (ett ex – mycket roligt eftersom vi trott att arten var körd efter att ha missat den i norra delen av Queen Elisabeth NP), *Plain-backed Pipit* samt *African Penduline-Tit*. Vi hittade också resans fjärde farliga giftorm i form av en *Puff Adder* – även denna sågs lyckligtvis endast från bilen.

På eftermiddagen förflyttade vi oss mot Bwindi. Intet nytt sågs på resan som gick genom ganska tätbebyggda trakter, men vid och kring vårt övernattningställe, Buhoma Community Rest Camp, fick vi som nya resarter *Little Sparrowhawk*, *Olive Long-tailed Cuckoo* (endast hörd), *Cabani's Greenbul*, *White-eyed Slaty Flycatcher*, *Northern Double-collared Sunbird* och *Bocage's Bush-shrike*.

Fredag 11 februari. Denna dag delades gruppen i en hälft som ägnade sig åt gorilla tracking och en som skådade med Alfred längs en väg in i Bwindi Impenetrable Forest. Gorillagänget, tillsammans med en norsk grupp, kördes en ganska kort bit åt norr och öster och fick sedan gå några kilometer uppför en sluttning genom idel kulturmarker fram till

det skarpa brynet mot nationalparken. Här fick vi sitta en god stund innan våra spanare lyckades lokalisera områdets gorilla-flock. Ganska tidigt såg vi dock en skymt av en silveryggad gorillahanne, men det visade sig vara en lös individ. Till slut fick vi klartecken och vi mer klättrade än gick uppför en ganska kort men mycket brant sluttning upp till en dunge i kanten av den sammanhängande skogen. När vi nådde upp dit hördes ett brak i snåren och ut kom den löse gorillahannen farande, sannolikt bortjagad av flockens ledarhanne. I hastigheten krockade han nästan med Janne som fick en smärre chock.

Nu följde en timme som för många av oss blev resans höjdpunkt. Vi tillbringade den i sällskap med 19 gorillor, flera på bara meterhåll. Den stora silveryggen var oerhört imponerande där han gick på alla fyra och höll ett vakande öga på sin flock. Flera gånger reste han sig upp och trummade på bröstet – en förvånansvärt snabb virvel. Och vid flera tillfällen fick han anledning att jaga iväg sin utmanare. Det var ett synnerligen nöjt gäng som så småningom återträdde vandringen mot bussen.



Purple Sunbird sågs bland annat i Bwindi. Foto Peter Berglin
Vi hade som sagt koncentrerat oss på gorillorna och några speciella fåglar såg vi inte under mötet med våra stora släktingar. Medan vi väntade på att få komma upp till dem noterade vi dock några arter som var nya för

resan – *Scarce Swift*, *Mackinnon's Fiscal*, *Brown-crowned Tchagra* och *Yellow Bishop*.

Fågelskådargruppen kunde bidra med en lång rad av reskryss, varav flera s.k. Albertine Rift Endemics (ARE) – *Barred Long-tailed Cuckoo*, *Bar-tailed Trogon*, *Western Green Tinkerbird*, *Dwarf Honeyguide* (ARE), *Buff-spotted Woodpecker*, *Petit's Cuckoo-shrike*, *Shelley's* och *Ansorge's Greenbul*, *Equatorial Akalat*, *Blue-shouldered* och *White-bellied Robin-Chat*, *Blackcap*, *Red-faced Woodland* (ARE) och *Short-tailed Warbler* (ARE), *White-browed Crombec*, *Black-faced Rufous Warbler*, *Yellow-browed Camaroptera*, *Grey*, *Black-throated* och *Mountain Masked Apalis* (ARE), *Dusky-blue Flycatcher*, *Mountain*, *Pale-breasted* och *Grey-chested Illadopsis*, *Green Sunbird*, *Mountain Black Boubou*, *Pink-footed Puffback*, *Velvet-mantled Drongo*, *Montane Oriole*, *Stuhlman's*, *Narrow-tailed* och *Waller's Starling* samt *Brown-capped Weaver*.



Bar-tailed Trogon endast sedd i Bwindi. Foto Peter Berglin.

Lördag 12 februari. Nu bytte grupperna plats – gårdagens fågelskådargång fick träffa gorillor och vice versa. Gorillagruppen fick åka till en annan familjgrupp betydligt längre bort, men blev också oerhört nöjda med sina upplevelser.

Fågelskådarna gick samma skogsväg som den andra gruppen gått och såg ungefär samma arter. Nya var dock *Bat Hawk*, *Handsome Francolin*, *Olive Pigeon*, *White-headed Wood-Hoopoe*, *Tullberg's* och *Elliot's Woodpecker*, *Yellow-streaked Greenbul*, *Red-throated Alethe*, *White-bellied Crested-flycatcher*,

Slender-billed Starling, *Green-backed Twinspot* och *Magpie Mannikin*. Den sistnämnda arten finns lite varstans i Afrika, men är överallt svår att hitta.

Söndag 13 februari. Vi gjorde en relativt kort förflyttning från Buhoma upp till Ruhiza på högre höjd via "The Neck", en smal korridor av Bwindi Impenetrable National Park på ömse sidor om vägen.

Fågellivet vid the Neck var inte så väldigt imponerande, men vi fick i alla fall några nya arter – *Black Cuckoo*, *Thick-billed Honeyguide*, *Tiny Sunbird* och *Black-billed Weaver*. Vid andra stopp längs vägen tillkom dock flera mer spännande arter – *Red-throated Wryneck*, *African Hill-babbler*, *Doherty's Bush-shrike* (snygg!), *Sharpe's Starling*, *Dusky Twinspot*, *Yellow-bellied Waxbill* och *Yellow-crowned Canary*.



Red-throated wryneck är den göktyteart som häckar söder om Sahara. Foto Peter Berglin.

I Ruhiza tog vi in på Community Bandas med inkvartering i tält, som dock var försedda med sängar. En rundvandring på kvällen gav bl.a. de resnya *Great Sparrowhawk*, *Grey Cuckoo-shrike*, *White-starred Robin*, *Chestnut-throated Apalis*, *Chinspot* och *Rwenzori Batis* (Albert Rift Endemic), *Stripe-breasted Tit* (ARE) samt *Variable* och *Regal Sunbird* (ARE). Här såg vi också ytterligare fyra *Sharpe's Starlings*.

Måndag 14 februari. Natten blev kall och jag frös som en hund i tältet. Förtretet glömdes dock så småningom vid den långa och fina vandringen i höghöjdsskogen. Vi skulle avsluta med att leta bl.a African Green Broadbill nere i ett papyrusträsk, men här spärrades vår väg av en hjord elefanter så det var tyvärr bara att vända. Vi fick trösta oss med ett antal andra fina fåglar. Nya var *Mountain Greenbul*, *Olive Thrush*, *Mountain Yellow Warbler*, *Banded Prinia*, *Collared Apalis* (ARE), *Yellow-eyed Black Flycatcher* (ARE), *Blue-headed Sunbird* (ARE), *Lagden's Bush-shrike* och *Strange Weaver* (ARE). Andra fina fåglar var *African Crowned Eagle*, *Handsome Francolin* (som nu alla fick se, ARE) samt *White-headed Wood-hoopoe* (flock om ca tio ex.).



Lagden's Bush-shrike hördes på långt håll men Alfred lockade fram den så alla fick se den bra. Foto Peter Berglin.

På kvällen hörde vi flera och såg en *Rwenzori Nightjar* (ARE).

Tisdag 15 februari. Denna dag förflyttade vi oss ytterligare söderut, ned till staden Kisoro invid Virunga-vulkanerna nära den Kongolesiska och Ruandiska gränsen. Vi gjorde givetvis flera stopp på vägen för att skåda. Ett stort papyrusträsk var mycket givande och gav som nya arter *Papyrus Yellow Warbler* (Papyrus Endemic- PE), *Greater Swamp Warbler*, *Sedge Warbler*, *Carruther's Cisticola* samt *Brimstone Canary*. *Papyrus Canary* (PE) sågs också, nu mycket bättre än vid det förra tillfället nära Kibale. Här fanns också en koloni av vävare som ännu inte finns beskrivna i

någon litteratur. Provisoriskt kan vi kalla dem *Entebbe Weavers*.

I en annan våtmark kryssade vi *African Marsh Harrier* och *Grauer's Rush Warbler* (ARE) och i övrigt såg vi längs vägen de resnya *Cinnamon Bracken Warbler*, *Grauer's Warbler* (ARE), *White-naped Raven* och *Dusky Crimsonwing* (tre ex., ARE)). Den sistnämnda ansågs nog allmänt ha varit dagens art – den är både snygg och svårfunnen. *Barred Long-tailed Cuckoo*, som förut bara hörts, sågs nu och därtill nära och bra!

I Kisoro tog vi in på det ganska stora Tourist Hotel.

Onsdag 16 februari. Morgonen och förmiddagen ägnades en vandring upp i Mzinga Gorilla Sanctuary, dock ej för att få se gorillor denna gång, utan för att hitta ytterligare två Albertine Rift Endemics. *Rwenzori Double-collared Sunbird* hittade vi raskt i flera ex, men för *Rwenzori Turaco* fick vi gå uppför i flera timmar, till en ravin nära trädgränsen. Här såg vi dock minst tre ex. mycket fint. Andra nya arter för resan under vandringen blev *Mountain Buzzard*, *Dusky Turtle Dove*, *Brown Woodland Warbler* och *White-tailed Crested-flycatcher*.

Vi förflyttade oss sedan med bil en tämligen lång sträcka till Mburo National Park, där vi tog in på ännu en lyxig och mysig förläggning – Mantana Tented Camp.

Torsdag 17 februari. Vi började med en båttur på Mburo Lake. På vägen till båtplatsen upptäcktes en av parkens specialiteter – en *Red-faced Barbet*. Båtturen blev också utomordentligt lyckad – vi hittade snabbt de båda målarterna *African Finfoot* och *White-backed Night-Heron* i fyra respektive två ex. Andra arter som var nya för resan var *Little Bittern*, *Black-crowned Night-Heron*, *Banded Martin* och *Northern Brown-throated Weaver*

Mburo National Park är ganska rik på storvilt och är den enda i Uganda med *Impala*, *Plains Zebra* och Common Eland. Vi såg de två första i uppskattningsvis ett hundratal ex vardera. Vidare noterade vi ca 30 *Common Hippos*, 80 *Common Warthogs*, 40 *African Buffalos*, en *Bushbuck*, 10 *Waterbucks*, två *Bohor Reedbucks* och minst 20 *Topis*. Nya fågelarter vid rundkörningen i parken var *Brown Parrot*, *Lilac-breasted Roller* och *Bearded Woodpecker*.



Grey Parrot sågs vid några tillfällen och då oftast flygande bland annat här i Mabira Forest. För de som fotograferade var det svårt att hinna med men denna fastnade ändå på bild. Foto Peter Berglin.

På den långa resetappen mot Jinja, på andra sidan den kaotiska Kampala (som var ännu mer kaotisk så här två dagar före det allmänna valet), noterade vi som nytt *Golden-backed Weaver* samt *Spotted-necked Otters*, de senare i minst tre ex i en liten damm nära vägen.

Till Jinja kom vi inte förrän det var mörkt och efter visst irrande hittade vi till slut vårt hotell, Kingfisher Lodge, fint beläget i stor trädgård vid stranden av Lake Victoria. (som vi dock märkte först nästa morgon).

Fredag 18 februari. En heldag i Mabira Forest strax väster om Jinja. Denna stora regnskog är ett reservat av något slag, dock påverkat av att

det här och var finns byar ute i den. Fågellivet är i alla fall rikt, men eftersom vi redan tillbringat så många timmar i olika regnskogar så blev det inte så många nya arter. De vi såg var *Forest Wood Hoopoe* (dock bara av ett fåtal) och *Red-headed Bluebill*.

Det blev däremot en hel rad arter som vi bara sett eller hört ett fåtal gånger på resan som *African Crowned Eagle*, *Crested Guineafowl*, *White-spotted Flufftail* (nästan alla fick se denna superskulkare nu), *Yellowbill* (två ex), *Yellow-spotted Barbet*, *Purple-throated Cuckoo-shrike* (åtta ex), *Fire-crested Alethe*, *Blue-shouldered Robin-Chat* (två hörda mkt nära), *Grey Longbill*, *Yellow-browed Camaroptera*, *Jameson's Wattle-eye* (nu äntligen sedd), *Splendid Starling* och *Yellow-mantled Weaver*.

Vi tillbringade ännu en natt på Kingfisher Lodge.

Lördag 19 februari. Detta var finaldagen på resan. Några ytterligare morgontimmar i Mabira Forest blev ganska givande med *Cassin's Hawk-Eagle* som ny art. Favoriter i repris var *Nahan's Francolin* (två+två ex.), *Grey Parrot*, *Sabine's Spinetail*, *Blue-throated Roller*, *Forest Wood-Hoopoe* (nu fick alla se den fint!), *Rufous Flycatcher-Thrush*, *Black-and-white Shrike-flycatcher*, *Weyn's Weaver*, *Green-backed Twinspot* och *Magpie Mannikin* (tio ex.!).

Resans sista skådande skedde från båt ute på Mutemba Bay strax utanför Entebbe. Platsen är känd för att hysa en jättelik ansamling av *White-winged Terns* och vi såg säkert 100 000 sådana! Nya arter var *Glossy Ibis*, *Garganey*, *Spotted Redshank*, *Black-tailed Godwit* och *Eurasian Reed Warbler*.

Det slutliga antalet fågelarter på resan blev 627.

Artlista observerade fågelarter



African Skimmer. Foto Peter Berglin

1. **Great White Pelican** *Pelecanus onocrotatus*
Tio vid Kazinga Channel, QENP 8.2, en längs vägen 17.2
2. **Pink-backed Pelican** *Pelecanus rufescens*
Sex vid Lake Albert 30.1, en i MF 2.2, en längs vägen förbiflygande MF 3.2, fem vid Kazinga Challel, QENP 8.2, sammanlagt 21 Ishasha Wilderness Camp och längs vägen 10.2
3. **Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis* Två vid Mweya Safari Lodge 7.2, nio på samma plats 8.2, sex längs vägen 15.2 och två på samma plats 16.2
4. **Great Cormorant** *Phalacrocorax carbo*
Sedd vid de större sjöarna och vattnen. Sex obsdagar med som flest 110 utefter Kazinga Channel 8.2.
5. **Long-tailed Cormorant** *Phalacrocorax africanus* Sju obsdagar. Exempelvis tämligen allmän vid flodturen på Nilen i MF 2.2.
6. **African Darter** *Anhinga rufa* Fem obsdagar med som flest 20 i MF 2.3.
7. **African Finfoot** *Podica senegalensis* Fyra i Lake Mburo 17.2.
8. **Little Bittern** *Ixobrychus minutus* En på nära håll i papyrusen i Lake Mburo 17.2.
9. **Black-crowned Night-Heron** *Nycticorax nycticorax* En i Lake Mburo 17.2.
10. **White-backed Night-Heron** *Gorsachius leuconotus* Två sågs på mycket nära

avstånd i Lake Mburo 17.2. Kamerorna smattrade förnöjsamt.



White-backed Night Heron en svårsedd art som i huvudsak är nattaktiv (se det stora ögat). Det krävs guider som vet exakt vilka träd de tillbringar sin "dagkvist". Foto Lars Högström

11. **Cattle Egret** *Bubulcus ibis* Allmän där det finns vilda eller tama större djur. Sedd alla dagar utom högre upp i bergen.
12. **Common Squacco Heron** *Ardeola ralloides*
Åtta obsdagar. Förekommer efter flodstränder och i papyrus, som flest åtminstone tio vid flodturen på Nilen i MF 2.2.
13. **Striated Heron** *Butorides striatus* Fem obsdagar med totalt 7 exemplar.
14. **Little Egret** *Egretta garzetta* Åtta obsdagar med som flest uppskattningsvis 30 exemplar vid Kingfisher lodge, Jinja 19.2.
15. **Intermediate Egret** *Mesophyx intermedia* Tre obsdagar med som flest minst fem i MF 2.2.
16. **Great Egret** *Casmerodius albus* Fyra obsdagar med som flest uppskattningsvis 10 utefter Kazinga Channel 8.2.



Ägretthäger Foto Lars Högström

17. **Goliath Heron** *Ardea goliath* Totalt åtta med som mest fyra utefter Kazinag Channel 8.2.
18. **Purple Heron** *Ardea purpurea* Totalt tio, flest, åtminstone fem, i papyrusen i Lutemba Bay 19.2.
19. **Grey Heron** *Ardea cinerea* Åtta obsdagar med minst 37 ex totalt.
20. **Black-headed Heron** *Ardea melanocephala* Vanlig med 18 obsdagar. Sågs ofta längs vägen och då företrädesvis i anslutning till eller i byar och städer.
21. **Hamerkop** *Scopus umbretta* Även denna art var vanlig men den är mer knuten till vatten. Åtminstone 100 individer sedda totalt under 15 obsdagar.
22. **Yellow-billed Stork** *Mycteria ibis* Endast sedd med åtminstone fem individer utefter Kazinga Channel 8.2.
23. **Abdim's Stork** *Ciconia abdimii* Åtta obsdagar med flera stora flockar som skruvade förbi på lite högre höjd. Allra flest sågs vid Semliki NP där åtminstone 200 skruvade i termiken efter den västra bergsidan av Ruwenzori Mountains.

Noterbart är att det var ytterligare tre obsdagar med 100 eller fler sedda.

24. **Woolly-necked Stork** *Ciconia episcopus* Totalt fem vid tre tillfällen - vid Kibale 3-4.2 och i QENP 8.2.
25. **African Open-billed Stork** *Anastomus lamelligerus* Sparsam med någon eller några få under tio obsdagar, dock minst 15 den 19.2 både längs vägen och vid Lutemba bay.
26. **Saddle-billed Stork** *Ephippiorhynchus senegalensis* Totalt sex individer under fyra obsdagar. Tre sågs vid båtturen på Nilen i MF 2.2. Utanför MF sedd i QENP.
27. **Marabou Stork** *Leptoptilos cruminiferus* Allmän vid bebyggelse men förekommer även i nationalparkerna. Inga observationer på högre höjd i bergen.
28. **Shoebill** *Balaeniceps rex* Två vid Mabamba Swamp 29.1. En av dem på riktigt nära håll. Verkar helt säker på den lokalen. Lite överraskande upptäckte Sven K en träskonäbb vid Nile River Lodge, MF, 1.2. Alfred bedömde den som en ungfågel och enligt honom hade arten inte setts lokalt på flera år.



Träskonäbb - en fågel med ett märkligt utseende och en av de viktigaste målarterna i Uganda. Foto: Lars Högström

29. **Sacred Ibis** *Threskiornis aethiopicus* Åtta obsdagar med som flest åtminstone 15 ex utefter Kazinga Channel 8.2.
30. **Hadada Ibis** *Bostrychia hagedash* Totalt 18 obsdagar. Trots att den ibland är högljudd ses den inte så ofta. Förmodligen går man förbi den eftersom den är ganska diskret när den näringssöker eller vilar i träd.
31. **Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus* Fem vid Lutemba Bay 19.2.
32. **African Spoonbill** *Platalea alba* Två utefter Kazinga Channel 8.2.
33. **Egyptian Goose** *Alopochen aegyptiacus* Sex obsdagar med flest sedda under båtturerna.
34. **Spur-winged Goose** *Plectropterus gambensis* Fem vid Mabamba Swamp 29.1 och fler än 20 i MF 8.2
35. **Knob-billed Goose** *Sarkidiornis melanotos* Sex i MF 29.1 och fyra utefter Kazinga Channel 8.2.
36. **Hartlaubs Duck** *Pteronetta hartlaubi* En liten överraskning i en korvsjö vid rastplatsen Semliki Forest 6.2. Den upptäcktes av Lars H när den stod och sov i dunklet invid en trädrot på högst 20 meters avstånd och stod på samma plats under åtminstone den timme vi var i närheten.
37. **White-faced Whistling-Duck** *Dendrocygna viduata* Fyra obsdagar. Flest utefter Nilen i MF 2.2 med omkring 30 individer.
38. **Fulvous Whistling-Duck** *Dendrocygna bicolor* Endast sedd vid Murchinson Falls 2.2 med 20 individer.
39. **Yellow-billed Duck** *Anas undulata* Sedd med tio vardera vid Mabamba Svamp 29.1 och Lutemba Bay 19.2, båda lokalerna vid Victoriasjön. Dessutom sedd med 5-6 individer vid en liten göl vid vägen 15-16.2.



Det vimlade inte av simänder; Förutom Yellow-billed duck sågs endast en årthane! Foto: Lars Högström

40. **Garganey** *Anas querquedula* Den enda Anas-anden förutom Yellow-billed Duck. En hanne sågs vid Lutemba Bay 19.2.
41. **Yellow-billed Kite / Black Kite** *Milvus aegyptius/migrans* Båda formerna/arterna sedda men bara några enstaka Black Kites medan Yellowbilled är allmän förutom högre upp i bergen.
42. **Black-shouldered Kite** *Elanus caeruleus* Två obsar i QENP av enstaka individer 7 . 2 respektive 10.2.
43. **African Fish Eagle** *Haliaeetus vocifer* Karaktärsart vid större vatten.



African Fish Eagle. Foto: Lars Högström.

44. **Palm-nut Vulture** *Gypohierax angolensis* Elva obsdagar med som flest tio sedda vid Semliki NP 5.2. På den platsen fanns även ett häckande par i ett högt torrt träd på bergsidan.
45. **Osprey** *Pandion haliaetus* Sex obsdagar med sammanlagt åtta individer.
46. **Hooded Vulture** *Necrosyrtes monachus* Totalt 26 individer under fem obsdagar.
47. **White-headed Vulture** *Trigoneiceps occipitalis* Enda observationen gjordes vid

QENP 10.2 av två adulta och en subadult individ.

48. **African White-backed Vulture** *Gyps africanus* Sammanlagt knappt 100 individer med som flest i uppskattningsvis 50 individer i QENP 9.2.
49. **Lappet-faced Vulture** *Torgos tracheliotus* Femton individer med som mest åtta samtidigt i QENP 8.2
50. **Black-chested Snake-Eagle** *Circaetus pectoralis* Sedd vardera två gånger i MF respektive QENP.
51. **Short-toed Snake-Eagle / Beaudouin's Snake-eagle** *Circaetus gallicus/ beaudouini* Två noterade 8.2 i QENP.
52. **Brown Snake-Eagle** *Circaetos cinereus* En noterad 8.2 och två 9.2 i QENP.
53. **Western Banded Snake-Eagle** *Circaetus cinerascens* Två obsdagar med sammanlagt tre individer efter vägen.
54. **African Marsh Harrier** *Circus ranivorus* En ad i en våtmark utan papyrus (mer likt säv) efter vägen 15.2.
55. **Eurasian Marsh Harrier** *Circus aeroginosus* Sammanlagt 20 ex under 11 obsdagar, i huvudsak i anslutning till papyrusvassar.
56. **Montagu's Harrier** *Circus pygargus* Två hannar med en vardera i MF och QENP
57. **Pallid Harrier** *Circus macrourus* Fem i QENP 8.2.
58. **Eastern Chanting-Goshawk** *Melierax poliopterus* En längs vägen några mil på väg från MF 3.2.
59. **Dark Chanting-Goshawk** *Melierax metabates* Fem under tre obsdagar. En sågs i MF och de andra efter vägen 1-4.2.
60. **Gabar Goshawk** *Micronisus gabar* Fyra under lika många dagar i QENP.
61. **Lizard Buzzard** *Kaupifalco monogrammicus* Sju individer under fyra obsdagar.
62. **Shikra** *Accipiter badius* Två obsar av enstaka individer. Dock sågs ytterligare

några obestämda *Accipiter* som förmodligen var Shikras.

63. **African Goshawk** *Accipiter tachiro* Fem obsar längs vägen, spridda under resan.
64. **Rufous-breasted Goshawk** *Accipiter rufiventris* Två observationer av två i Ruhiza 14.2 samt en hane i samma område 15.2.
65. **Little Sparrowhawk** *Accipiter minullus* En hane i Bwindi 10.2.
66. **Great Sparrowhawk** *Accipiter melanoleucus* En i Ruhiza 13.2.
67. **Bat Hawk** *Macheirampus alcinus* En i Bwindi 12.2.
68. **African Harrier-Hawk** *Polyboroides typus* Minst 20 individer sags under 12 obsdagar. En relativt vanlig art och ganska lätt att se. Vid ett par tillfällen sågs fåglarna vid födosök och då vek den inte undan särskilt mycket.
69. **European Honey-Buzzard** *Pernis apivorus* Sammanlagt fyra obsar av enstaka individer.
70. **Grasshopper Buzzard** *Butastur rufipennis* Enda observationen gjordes vid MF 1.2 av två exemplar.



Grasshopper Buzzard Foto Lars Högström.

71. **Augur Buzzard** *Buteo augur* Minst 25 sedda under sju obsdagar, de flesta på högre höjd.

72. **Mountain Buzzard** *Buteo oreophilus* Två individer sedda högt upp i Mghinga NP 16.2.
73. **Common Buzzard** *Buteo buteo* Sammanlagt minst 15 individer under sex obsdagar.
74. **Tawny Eagle** *Aquila rapax* En adult i Ishasha sector av QENP 10.2.
75. **Steppe Eagle** *Aquila nipalensis* Sedd med tre ex i MF 2.2 och ytterligare en efter vägen därifrån dagen efter.
76. **Wahlberg's Eagle** *Aquila walhbergi* Tolv obsdagar med minst 31 individer visar att arten är relativt vanlig.
77. **Spotted Eagle** *Aquila clanga* En 3k -fågel i MF 2.2.



Större skrikörn Foto Lars Högström

78. **Ayres's Hawk-Eagle** *Hieraaetus ayresii* Två i Ishasha sector av QENP 9.2.
79. **Cassin's Hawk-Eagle** *Spizaetus africanus* En på mycket nära håll i Mabira Forest 19.2.
80. **Bateleur** *Terathopius ecaudatus* Minst 38 under sju obsdagar. Sedd främst i savann/sahel biotop där arten är tämligen allmän.
81. **Long-crested Eagle** *Lophaetus occipitalis* Minst 42 noterade under 12 obsdagar. Vanlig.
82. **Martial Eagle** *Polemaetus bellicosus* Två observationer i Ishasha sector av QENP 9.2. Förmodligen samma individ.

83. **African Crowned Eagle** *Stephanoaetus coronatus* Två ex över Kibale forest 4.2, ett par vid bo nära vägen 9.2 i QENP, två sedda under vandringen från Mubwindi swamp 14.2 och slutligen en i Mabira Forest 18-19.2.



En mäktig syn med en familj African Crowned Eagle sittande på bara 75 meters avstånd lugnt betraktande oss. Foto Lars Högström

84. **Common Kestrel** *Falco tinnunculus* Tre observationer totalt.
85. **Grey Kestrel** *Falco ardosiaceus* Sju obsdagar med sammanlagt nio individer. Fina observationer gjordes 30.1 i och runt palmer vid Lake Albert.
86. **African Hobby** *Falco cuvieri* Sedd första dagen med ett ex och sista dagen med två ex från samma restaurant i Kampala. Det var god utsikt och mat!
87. **Eurasian Hobby** *Falco subbuteo* Tre observationer av enstaka individer.
88. **Red-necked Falcon** *Falco chicquera* Två vid Lake Albert 30.1.
89. **Lanner Falcon** *Falco biarmicus* En vardera i MF 2.2 och QENP 8.2.
90. **Peregrine Falcon** *Falco peregrinus* En i Semliki NP 6.2.
91. **Helmeted Guineafowl** *Numida meleagris* Åtta obsdagar med fler än 75 individer totalt.



Hjälmpärlhönsen vistas mest på marken men kan fly upp i träden när de känner sig störda. Foto Lars Högrström

92. **Crested Guineafowl** *Guttera pucherani* Fler än 25 individer under fyra obsdagar.
93. **Scaly Francolin** *Francolinus squamatus* Två "längs vägen-obsar" med en respektive 15 sedda samt tre i Budongo 30.1
94. **Nahan's Francolin** *Francolinus nahani* Fyra i Budongo 31.1 och likaså fyra i Mabira Forest 19.2.
95. **Handsome Francolin** *Francolinus nobilis* Albertine Rift Endemic. En i Bwindi 12.2, tre i Ruhiza 14.2 samt två i Mghinga NP 16.2. Svårседda eftersom de snabbt försvann in i undervegetationen.
96. **Crested Francolin** *Francolinus sephaena* Fyra obsdagar med sammanlagt minst 12 individer.
97. **Red-necked Spurfowl** *Francolinus afer* Mycket allmän i QENP och dessutom sedd med åtminstone fem individer i Mghinga NP 17.2.
98. **Common Quail** *Coturnix coturnix* Totalt fem i QENP under tre obsdagar.
99. **Blue Quail** *Coturnix adansonii* En uppskrämd av bilen, men den kunde inte eftersökas p.g.a två elefanthanar som var sura på varandra på håll. Guiderna vågade inte lämna bilen och ville komma bort från området så fort som möjligt.
100. **Common Button-quail** *Turnix sylvatica* Fem ex sedda från bilen i QENP 9.2. Dessa skulkare sågs bra ur ett helikopterperspektiv från takluckorna på bilarna när de sprang undan i det kortbetade torra gräset. Alla i gruppen fick bra obsar på en svårседd art.
101. **White-spotted Flufftail** *Sarothrura pulchra* Minst åtta hörda. Alfred gjorde sitt bästa för att vissla fram dem och de kom nära många gånger men vände utan att visa sig. Det dröjde ända till den näst sista dagen innan vi äntligen fick en skynt av denna smygande skogsart. Äntligen visade då två upp sig och de flesta i gruppen fick åtminstone någon liten glimt av dem.
102. **Red-chested Flufftail** *Sarothrura rufa* En hördes i Mabamba Swamp 29.1.
103. **African Crane** *Crex egregia* Åtminstone tre sedda i QENP 8.2
104. **Black Crane** *Amaurornis flavirostris* Minst 13 sedda under sex obsdagar med som flest fem i QENP 8.2.
105. **Allen's Gallinule** *Porphyrio alleni* En ungfågelvid Lake Albert 30.1. Öväntad här.
106. **Red-knobbed Coot** *Fulica cristata* Minst fem i en sjö på lite högre höjd i Mghinga-området 15-16.2.
107. **Common Moorhen** *Gallinula chloropus* Fyra individer 15-16.2 i samma sjö efter vägen som kamsöthönsen.
108. **African Jacana** *Actophilornis africanus* Allmän med förekomst i de flesta våtmarkerna och efter flodstränder.
109. **Lesser Jacana** *Microparra capensis* Två hörda men tyvärr osedda trots intensiv spaning i Mabamba Swamp 29.1.
110. **Grey Crowned Crane** *Balearica regulorum* Tämligen allmän med 13 obsdagar, trandans och som flest en flock på över hundra i en våtmark efter vägen söder om Kampala 17.2.
111. **Denham's Bustard** *Neotis denhami* Två plus en i MF 2-3.2.



Black-bellied Bustard hona, samma som ovan. Foto Sven Karlsson

112. **Black-bellied Bustard** *Eupodotis melanogaster* Tre observationer varav två i QENP.

113. **Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus* Förekom på lämpliga platser med som flest, åtminstone 50, vid Lutemba Bay 19.2.

114. **Spotted Thick-knee** *Burhinus capensis* Fyra i MF 2.2 och två i QENP 8.2.

115. **Water Thick-knee** *Burhinus vermiculatus* Minst 70 i QENP 8.2 och hörd i Ishasha sector, QENP 10.2.

116. **Senegal Thick-knee** *Burhinus senegalensis* Minst 25 i MF 2.2.

117. **Temminck's Courser** *Cursorius temminckii* En i QENP 8.2

118. **Rock Pratincole** *Glareola nuchalis* Endast sedd vid fallen i MF 2-3.2 med minst 30 individer.

119. **Collared Pratincole** *Glareola pratincola* Åtta individer vid fyra observationstillfällen i MF och QENP.

120. **Black-winged Pratincole** *Glareola nordmanni* Tre 10.2 i QENP.

121. **Spur-winged Lapwing** *Vanellus spinosus* Allmän efter floder och sjöstränder med totalt sex obsdagar.

122. **Long-toed Lapwing** *Vanellus crassirostris* Allmän i Mabamba Swamp 29.1, fyra i MF 2.2 och fler än tio vid Lutemba Bay 19.2.

123. **African Wattled Lapwing** *Vanellus senegallus* Minst 42 under sex obsdagar. Fler än 20 i QENP 8.2.

124. **Black-headed Lapwing** *Vanellus tectus* Två i MF 2.2.

125. **Senegal Lapwing** *Vanellus lugubris* Två i MF 2.2 och fler än fem i QENP 9-10.2.



Knappast dystra men sväruptäckta i sin stengrå fjäderdräkt men stilistisk perfektion när man får ögonen på dem – Senegal Lapwing. Foto Lars Högström.

126. **Kittlitz's Plover** *Charadrius pecuarius* Sedd i QENP med åtta ex. 8.2 och minst 20 (där flera hade häckbeteende) 9.2.

127. **White-fronted Plover** *Charadrius marginatus* En i MF 2.2.

128. **Three-banded Plover** *Charadrius tricollaris* Två vid vid heta källorna i Semliki NP 5.2 och 1 + 2 i QENP 10.2.

129. **Common Ringed Plover** *Charadrius hiaticula* Fyra i QENP 8.2 och fyra vid Lutemba Bay 19.2.

130. **Little Ringed Plover** *Charadrius dubius* En vid de varma källorna i Semliki NP 5.2.

131. **Caspian Plover** *Charadrius asiaticus* En flock på 15 ex 2.2 i MF och tre småflockar med sammanlagt 18 ex i QENP.

132. **Ruff** *Philomachus pugnax* Minst 36 under fyra obsdagar. Flest vid Lake Victoria 19.2.

133. **Common Sandpiper** *Tringa hypoleucos* Tio obsdagar med allt från enstaka fåglar till betecknad som allmän. Vanlig efter floder och sjöstränder. Använde ofta flodhästar som födosökshabitat.

134. **Wood Sandpiper** *Tringa glareola* Minst 27 under sex obsdagar.

135. **Green Sandpiper** *Tringa ochropus* Nio under sex obsdagar.
136. **Common Greenshank** *Tringa nebularia* Femton under sex obsdagar.
137. **Marsh Sandpiper** *Tringa stagnatilis* Sex under fyra obsdagar.
138. **Spotted Redshank** *Tringa erythropus* En vid Lutemba Bay 19.2.
139. **Little Stint** *Calidris minuta* Minst 21 under fyra obsdagar. Flest vid de varma källorna i Semliki NP.
140. **Temminck's Stint** *Calidris temminckii* Två i QENP 8.2 och fem vid Lutemba Bay 19.2.
141. **Curlew Sandpiper** *Calidris ferruginea* Tre längs Kazinga Channel, QENP 8.2 och en vid Lutemba Bay. 19.2
142. **Black-tailed Godwit** *Limosa limosa* En vid Lutemba Bay 19.2.
143. **Common Snipe** *Gallinago gallinago* Minst elva under sex obsdagar.
144. **Grey-headed Gull** *Larus cirrocephalus* En i MF 2.2 och 20 längs Kazinga Channel, QENP 8.2.
145. **Common Black-headed Gull** *Larus ridibundus* Två vid Kazinga Channel 8.2 och en i Lutemba Bay 19.2.
146. **Lesser Black-backed Gull** *Larus fuscus* Tre Lake Albert 30.1. Omkring 15 vid Kazinga Channel. QENP 8.2 och åtta i Lutemba Bay 19.2.
147. **Heuglin's Gull** *Larus heuglini* En adult Lake Albert 30.1 och flera, minst fem, Kazinga Channel 8.2.



Denna trut har karaktärer för en Heuglin's Gull. Foto Anders Lundquist.

148. **Gull-billed Tern** *Sterna nilotica* Tre i MF-området, 29-30.2, uppskattningsvis 30 individer vid Kazinga Channel, QENP 8.2 och fler än 30 vid Lutemba Bay 19.2.

149. **African Skimmer** *Rynchops flavirostris* Stora flockar med minst 200 individer i Nilen, i MF 2.2 och ca 250 i Kazinga Channel, QENP 8.2.



Saxnäbbarna, African Skimmer, lyfte när båtarna kom för nära. Foto Lars Högström.

150. **White-winged Tern** *Chlidonias leucopterus* Allmän vid Kazinga Channel, QENP 8.2 och sanslöst många vid Lutemba Bay 19.2. Vi uppskattade 100 000+ men det kan ha varit mångdubbelt fler. Det var moln som lyfte till ett eget mångtusenhövdad vingbrus. För de flesta av oss var nog detta en av de största massupplevelser av fåglar vi haft. Det är en upplevelse i klass med både gorillor och lejon som man inte får missa om man åker till Uganda vid den här tiden.



Ett ofattbart myller av vitvingade tärnor. Foto Lars Högström



Det är svårt att uppskatta antalet individer. Guiderna talade om att miljontals räknats in. Så många var det dock inte enligt vår uppfattning. Foto Lars Högström

151. **Whiskered Tern** *Chlidonias hybridus* Fler än 30 vid Lake Albert 30.1, fler än fem i MF 2.2 samt en bland alla vitvingade i Lutemba Bay 19.2.
152. **African Green-Pigeon** *Treron calva* Minst 80 under tio obsdagar. Med andra ord ganska vanlig.
153. **Bruce's Green-Pigeon** *Treron waalia* Två i MF 2.2.
154. **Western Bronze-naped Pigeon** *Columba iriditorques* Två sedda och tre hörda i Bwindi 11-12.2.
155. **Speckled Pigeon** *Columba guinea* En i Kampala 29.1 samt minst 30 efter vägen 15-18.2.
156. **Afep Pigeon** *Columba unicincta* Fem sedda och en hörd under fyra obsdagar.
157. **Olive Pigeon** *Columba arquatrix* Ganska vanlig i bergsområdena runt Bwindi. Uppskattningsvis 50 sedda under fyra obsdagar.

158. **Feral Pigeon** *Columba livia* Sedd med enstaka individer vid bebyggelse i större byar/städer med totalt sex obsdagar. Således inte särskilt vanlig.
159. **Blue-spotted Wood-Dove** *Turtur afer* Åtta individer under fyra obsdagar.
160. **Black-billed Wood-Dove** *Turtur abyssinicus* Endast sedd i nordväst under tre dagar i MF där fler än 15 ex sågs.
161. **Tambourine Dove** *Turtur tympanistria* Tämligen allmän med 18 obsdagar och som flest fem individer på en dag.
162. **Namaqua Dove** *Oena capensis* Endast en sedd i MF 2.2.
163. **Ring-necked Dove** *Streptopelia capicola* Allmän i QENP. I övrigt bara ytterligare två obsar.
164. **Red-eyed Dove** *Streptopelia semitorquata* Tretton obsdagar där arten vissa dagar fick betecknas som allmän.
165. **African Mourning Dove** *Streptopelia decipiens* Två i MF 2.2.
166. **Vinaceous Dove** *Streptopelia vinacea* Endast sedd i nordväst med upp till 20 individer i MF 2.2.
167. **Laughing Dove** *Streptopelia senegalensis* Sedd i MF och QENP samt efter vägen vid ett tillfälle. I QENP var arten tämligen allmän.
168. **Dusky Turtle Dove** *Streptopelia lugens* Minst tre i Mghinga NP 16.2. Bra obsar i tubkikare.
169. **Brown Parrot** *Poicephalus meyeri* En flock om ca 10 i Lake Mburo NP 17.2 samt en förbiflygande vid Kingfisher lodge, Jinja 19.2.
170. **Grey Parrot** *Psittacus erithacus* Sedd i Budongo-området med 4-6 ex per dag 30-31.1 och i Mabira Forest 18-19.2 med ungefär lika många. Arten var inte lätt att se utan det rörde sig mest om flygande individer.

171. **Redheaded Lovebird** *Agapornis pullarius*
Två observationer från QENP med en 8.2 och sju den 10.2.

172. **Great Blue Turaco** *Corythaeola cristata*
Ganska vanlig med fler än 30 noterade av denna rätt häftiga art. Totalt 13 obsdagar.



Great Blue T lämnar ingen oberörd och arten var förhållandevis vanlig. Foto Lars Högström

173. **Ross's Turaco** *Musophaga rossae* Sju under fyra obsdagar, de flesta i QENP.

174. **Rwenzori Turaco** *Tauroco johnstoni*
Albertine Rift Endemic..En "höghöjdsart" i Mghinga (16.2) som det krävdes uppåt-promenerande till en hel del smågnäll. Det tar 30 minuter sa Alfred. Men det blev tre timmar västerländsk tid. Det är ljuvligt med tids- och avståndsoptimismen hos våra afrikanska vänner. Men det var inte förgäves för dem som orkade med gavs det fantastiska obsar på en vacker fågel i bergsravinerna i ett fint förmiddagssolljus.

175. **Black-billed Turaco** *Tauroco schuetti* Totalt cirka 15 sedda under sex obsdagar. Hörd många gånger innan alla fick se arten.

176. **Bare-faced Go-away-bird** *Corythaixoides concolor* En i QENP 9.2 och en i "skogen" vid Lake Mburo 17.2.

177. **Eastern Grey Plantain-eater** *Crinifer zonurus* Totalt 26 under åtta obsdagar.

178. **Great Spotted Cuckoo** *Clamator glandarius* En i MF 2.2.

179. **Levaillant's Cuckoo** *Oxylopus levaillantii*
Två QENP 9.2 och en Bwindi 11.2.

180. **Common Cuckoo** *Cuculus canos* Fyra obsdagar om sex individer.

181. **Red-chested Cuckoo** *Cuculus solitarius*
Sjutton obsdagar av 1-2 individer visar att arten är sparsam men med vidsträckt utbredning i landet.

182. **Black Cuckoo** *Cuculus clamosus* En hörd och en sedd 13.2 i Bwindi.

183. **Barred Long-tailed Cuckoo** *Cercococcyx montanus* Tolv hörda och en sedd under fyra obsdagar på högre höjd i Bwindiområdet.

184. **Olive Long-tailed Cuckoo** *Cercococcyx olivinus* Hörd med sammanlagt tre exemplar 10-11.2 Bwindi.

185. **Dusky Long-tailed Cuckoo** *Cercococcyx mechowii* Tolv hörda och en sedd med som sju som mest 12.2 Bwindi.

186. **Diederick Cuckoo** *Chrysococcyx caprius*
Totalt 13 noterade under åtta obsdagar.

187. **Klaas's Cuckoo** *Chrysococcyx klaas* Fem under tre obsdagar i nordväst 29.1-1.2.

188. **African Emerald Cuckoo** *Chrysococcyx cupreus* 14 ex., alla enbart hörda, under sex obsdagar.

189. **Yellow-throated Cuckoo** *Chrysococcyx flavigularis* En sedd bra i Semliki NP 6.2.

190. **Yellowbill** *Ceuthmocharus aereus* Fyra individer under tre obsdagar.

191. **White-browed Coucal** *Centropus superciliosus* Tämligen allmän; minst 53 noterade med som mest uppskattningsvis 30 ex i Ishasha sector QENP 9.2.

192. **Blue-headed Coucal** *Centropus monachus*
Totalt fem individer under lika många dagar. Knuten till fuktigare områden, swamps.

193. **Black-throated Coucal** *Centropus leucogaster* En hörd i Semliki NP. Västafriskans art som relativt nyligen upptäckts förekomma här.

194. **Senegal Coucal** *Centropus senegalensis*
Två i MF 2.2 och två i Semliki NP 7.2

195. **African Wood Owl** *Strix woodfordii* En sedd i dagsljus i Budongo 4.2.
196. **Spotted Eagle-Owl** *Bubo africanus* En sedd mycket bra i skymningen i QENP 8.2. Satt i högre busktoppar.
197. **Pearl-spotted Owlet** *Glaucidium perlatum* En i QENP Ishasha sector 8.2.
198. **Square-tailed Nightjar** *Caprimulgus fossii* Totalt nio noterade i QENP, i huvudsak i strålkastarsken från bilarna när de satt på vägen.
199. **Slender-tailed Nightjar** *Caprimulgus clarus* Två i strålkastarsken i QENP 8.2.
200. **Swamp Nightjar** *Caprimulgus natalensis* Totalt minst tolv noterade. Flest (sju) i QENP. Även hörd.
201. **Rwenzori Nightjar** *Caprimulgus ruwenzorii* Albertine Rift Endemic. Tre hörda och minst en sedd i Ruhiza på kvällen 14.2.
202. **Black-shouldered Nightjar** *Caprimulgus nigriscapularis* En i QENP 8.2.
203. **Standard-winged Nightjar** *Macrodipteryx longipennis* Fem hannar och åtta honor av denna speciella art flög omkring oss vid flygplatsen och efter vägen i MF 2.2.
204. **Little Swift** *Apus affinis* Minst 110 ex i noteringarna men även betecknad som allmän med totalt elva obsdagar. En vanlig fågel med andra ord.
205. **White-rumped Swift** *Apus caffer* Totalt 44 under åtta obsdagar. Förmodade häckningar, där fåglar flög in under tak, vid Chimpanzee Guest House, Kibale, 4.2.
206. **Horus Swift** *Apus horus* Totalt fyra bestämda under tre obsdagar i Budongo och Ishasha sector, QENP.
207. **Mottled Swift** *Apus aequatorialis* En vid Ruhiza, Community Bandas 14.2.
208. **Alpine Swift** *Apus melba* Totalt mer än 50 sedda under fem obsdagar.
209. **African Black Swift** *Apus barbatus* Artbestämd vid två tillfällen. De flesta "tornsvalorna" uppfattade vi dock vara europeiska.
210. **Eurasian Swift** *Apus apus* Mer än 40 artbestämda under sex obsdagar.
211. **Scarce Swift** *Schoutedenapus myoptilius* Sedd dagligen vid Buhoma Community Rest Camp 11-13.2. Kom i småflockar på kvällarna och flög nedför dalen.
212. **African Palm Swift** *Cypsiurus parvus* Allmän där det finns palmer.
213. **Mottled Spinetail** *Telecanthuna ussheri* En i Budongo 31.1.
214. **Sabine's Spinetail** *Rhipidura sabini* Sju sedda i Budongo 30-31.1..
215. **Cassin's Spinetail** *Neafrapus cassini* En, möjligen två, i Budongo 31.1.
216. **Speckled Mousebird** *Colius striatus* Sedd alla dagar utom två och betecknad som allmän under många av dessa dagar. En av de arter vi såg flest individer av under resan.
217. **Blue-naped Mousebird** *Colius macrourus* Åtta obsdagar med minst 50 individer totalt. Flest i MF och QENP - savann-/sahelart.
218. **Narina Trogon** *Apaloderma narina* Två i Kanyo Pabidi 1.2.
219. **Bar-tailed Trogon** *Apaloderma vittatum* En sedd av halva gruppen i Bwindi 11.2 och tre hörda av den andra halvan på samma plats 12.2.
220. **Pied Kingfisher** *Ceryle rudis* Nio obsdagar varav flera då arten fick betecknas som allmän, då företrädesvis vid större vatten, kanaler, sjöar etc.
221. **Striped Kingfisher** *Halcyon chelicuti* Sammanlagt tio, dock flest (fem) i Lake Mburo NP 17.2.
222. **Grey-headed Kingfisher** *Halcyon leucocephala* Totalt över 20 individer, endast i nordväst ned till QENP.

223. **Giant Kingfisher** *Halcyon maxima* Endast en sedd från båt på Nilen i MF 2.2. Dock mycket fin obs.



Den enda Giant Kingfisher som sågs på resan. Foto Lars Högström

224. **Woodland Kingfisher** *Halcyon senegalensis* Sedd under 10 obsdagar med minst 18 individer.

225. **Blue-breasted Kingfisher** *Halcyon malimbica* Sju individer under sex obsdagar i den nordvästra delen av resrutten.

226. **Chocolate-backed Kingfisher** *Halcyon badia* En art högt upp på önskelistorna med en sedd och en hörd av denna svårsedda kungsfiskare som håller till i trädkronorna i riktigt högstammig skog. Bägge obsarna i Budongo 30-31.2. Alfreds skarpa ögon hjälpte oss till fina tubkikarobsar.

227. **Malachite Kingfisher** *Alcedo christata* Mellan 30 och 40 sedda, framförallt vid sjöar med öppna vattenytor. Sju obsdagar.

228. **African Pygmy Kingfisher** *Ispidina picta* Totalt tretton noterade under fyra obsdagar med flest (nio) i Budongo.

229. **African Dwarf Kingfisher** *Ispidina lecontei* Två sedda med vardera ett ex. i Budongo 30-31.1.

230. **White-bellied Kingfisher** *Alcedo leucogaster* En sedd och hörd av några alerta i gruppen i Semliki NP 6.2. Den dök upp under ett lunchbreak och alla var inte riktigt på tårna!

231. **Shining-blue Kingfisher** *Alcedo quadribrachys* Tre obsdagar med sammanlagt fem individer i MF och QENP.

232. **Little Bee-eater** *Merops pusillus* Sedd i MF och i QENP. Flest i den sistnämnda parken med 15 av 16 observerade.

233. **Cinnamon-chested Bee-eater** *Merops oreobates* Närmare 30 under sex obsdagar.

234. **Blue-breasted Bee-eater** *Merops variegates* Tolv i Mabamba Swamp 29.1.

235. **White-throated Bee-eater** *Merops albicollis* Över 150 noterade och dessutom noterad som allmän under flera dagar, främst i MF och QENP.

236. **Swallow-tailed Bee-eater** *Merops hirundineus* Fyra längs vägen 30.1 och en likaledes 3.2.

237. **Black Bee-eater** *Merops gularis* Fler än tio under fem obsdagar.



Black Bee-eater är en skogsart. Foto Lars Högström

238. **European Bee-eater** *Merops apiaster* Över 100 under fem obsdagar.

239. **Blue-cheeked Bee-eater** *Merops persicus* Totalt 29 under fem obsdagar, flest i QENP.

240. **Red-throated Bee-eater** *Merops bullocki* Allmän i MF 2.2.

241. **Northern Carmine Bee-eater** *Merops nubicus* Fyra sedda i MF 1-2.2.

242. **Broad-billed Roller** *Eurystomus glaucurus* Mer än 40 totalt på spridda ställen under resan, mest som "trådfågel".

243. **Blue-throated Roller** *Eurystomus gularis* Åtta sedda under fyra obsdagar, enbart i skogsbiotoper.

244. **Lilac-breasted Roller** *Coracias caudata* Tre i Lake Mburo NP 17.2.

245. **Abyssinian Roller** *Coracias abyssinica* En längs vägen 29.1

246. **European Roller** *Coracias garrulus* Två i MF 2.2 och en i QENP 8.2.

247. **Green Wood-hoopoe** *Phoeniculus purpureus* Fyra vid Albert Escarpment 30.1 och tre i Lake Mburo NP 17.2.

248. **Forest Wood-Hoopoe** *Phoeniculus damarensis* En i Mabira Forest 18.2 och 19.2

249. **White-headed Wood-Hoopoe** *Phoeniculus bollei* Totalt minst 27 med en flock om minst tio på väg mot Mubwindi Swamp 14.2. Fyra obsdagar.

250. **Eurasian Hoopoe** *Upopa epops* Nio under fem obsdagar, som sydligast i QENP.

251. **Common Scimitarbill** *Rhinopomastus cyanomelas* Totalt sju i QENP.

252. **Black Scimitarbill** *Rhinopomastus aterrimus* Två observationer längs vägen 30.1 respektive 3.2.

253. **African Grey Hornbill** *Tockus nasutus* Närmare 30 under fem obsdagar bland annat i MF, QENP och Lake Mburo NP.

254. **Crowned Hornbill** *Tockus alboterminatus* Omkring 20 under fem obsdagar, bland annat i QENP och Lake Mburo NP.



Crowned Hornbill. Foto Lars Högström.

255. **African Pied Hornbill** *Tockus fasciatus* Fyra i Semliki NP 7.2.

256. **Piping Hornbill** *Bycanistes fistulator* Sedd med sammanlagt närmare 20 individer i Semliki NP 6-7.2.

257. **Red-billed Dwarf Hornbill** *Tockus camurus* Endast hörd i Semliki NP 6.2.

258. **Black Dwarf Hornbill** *Tockus hartlaubi* Två i Semliki NP 6.2.

259. **Black-and-white-casqued Hornbill** *Bycanistes subcylindricus* Allmän med 13 obsdagar och i vissa fall fler än 20 individer per dag.

260. **White-thighed Hornbill** *Bycanistes cylindricus* Minst sammanlagt 22 i Budongo, Kanyo Pabidi och Semliki NP.

261. **Black-casqued Wattled Hornbill** *Ceratogymna atrata* Minst tolv i Semliki NP 5-6.2.

262. **Abyssinian Ground-hornbill** *Bucorvus abyssinicus* Ett par vid Albert Escarpment 30.1 och fem i MF 1.2.

263. **Yellow-rumped Tinkerbird** *Pogoniulus bilineatus* Åtta obsdagar, varav betecknad som allmän vid bland annat vandringen mot Mubwindi Swamp 14.2.

264. **Yellow-throated Tinkerbird** *Pogoniulus subsulphureus* Elva obsdagar och betecknad som allmän under flera av dessa.

265. **Red-rumped Tinkerbird** *Pogoniulus atroflavus* Två i Semliki NP 6.2.

266. **Western Green Tinkerbird** *Pogoniulus coryphaeus* Totalt tio i Bwindi-området under tre obsdagar.

267. **Speckled Tinkerbird** *Pogoniulus scolopaceus* Minst 24 under nio obsdagar.

268. **Grey-throated Barbet** *Gymnobucco bonepartei* Minst 24 under sju obsdagar. Flest noterade i Bwindi.

269. **Yellow-fronted Tinkerbird** *Pogoniulus chrysoconus* Fyra obsdagar med fem som flest, i Bwindi 11.2.

270. **Spot-flanked Barbet** *Tricholaema lacrymosa* Sju under fem obsdagar, bland annat i MF och QENP.
271. **Hairy-breasted Barbet** *Tricholaema hirsuta* Totalt sex under fem obsdagar med bland annat två vid Lake Mburo NP.
272. **Yellow-spotted Barbet** *Buccanodon duchaillui* En i QENP 7.2.
273. **White-headed Barbet** *Lybius leucocephalus* Sammanlagt fyra sedda i QENP.
274. **Black-billed Barbet** *Lybius guifsobalito* Tre sedda, bland annat i MF 2.2.
275. **Red-faced Barbet** *Lybius rubrifacies* En sedd i Lake Mburo NP 17.2.
276. **Double-toothed Barbet** *Lybius bidentatus* Tre obsdagar med som mest sju i Lake Mburo NP 17.2.
277. **Yellow-billed Barbet** *Trachylaemus purpuratus* Sedd vid tre tillfällen och hörd vid ytterligare två, bland annat i Mabira Forest.
278. **Greater Honeyguide** *Indicator indicator* Fyra obsdagar med sammanlagt sex individer, varav tre sedda och tre hörda.
279. **Dwarf Honeyguide** *Indicator pumilio* Albertine Rift Endemic. NT enligt IUCN. Fem individer i Bwindi under fyra obsdagar.
280. **Thick-billed Honeyguide** *Indicator conirostris* Endast noterad i Bwindi; en vardera 13 och 15.2.
281. **Willcox's Honeyguide** *Indicator willcocksi* Två i Semliki NP 6.2 och tre i Bwindi 11-12.2.
282. **Least Honeyguide** *Indicator exilis* En i respektive Budongo 31.1, Semliki NP 6.2 och Bwindi 14.2.
283. **Cassin's Honeybird** *Prodotiscus insignis* Två i Semliki NP 5.2.
284. **Red-throated Wryneck** *Jynx ruficollis* Två längs vägen i Bwindi 13.2.
285. **Tullberg's Woodpecker** *Campethera tullbergi* Sammanlagt tre i Bwindi 12-13.2.
286. **Buff-spotted Woodpecker** *Campethera nivosus* En i Bwindi 11.2.
287. **Brown-eared Woodpecker** *Campethera caroli* En i Budongo 31.1.
288. **Nubian Woodpecker** *Campethera nubica* Fyra under tre obsdagar, bland annat i QENP.
289. **Cardinal Woodpecker** *Dendropicus fuscescens* Totalt 10 under sju obsdagar. Den mest spridda och lättsedda hackspettarten.
290. **Brown-backed Woodpecker** *Dendropicus obsoletus* En längs vägen mot Kibale 3.2.
291. **Elliot's Woodpecker** *Dendropicus elliotii* Ett par i Bwindi 12.2 och en vid the Neck, Ruhiza 13.2.
292. **Speckle-breasted Woodpecker** *Dendropicus poecilolaemus* Två längs vägen mot Semliki NP 5.2.
293. **Bearded Woodpecker** *Dendropicus namaquus* En i Lake Mburo NP 17.2.
294. **Yellow-crested Woodpecker** *Dendropicus xantholophus* Totalt fyra obsdagar med sammanlagt sex individer.
295. **Grey Woodpecker** *Dendropicus goertae* Ett par i MF 2.2 och två i QENP 10.2.
296. **Rufous-naped Lark** *Mirafraga africana* Minst tio i QENP.
297. **Flappet Lark** *Mirafraga rufocinnamomea* Minst 25 under sex obsdagar med flest sedda i QENP.
298. **White-tailed Lark** *Mirafraga albicauda* Tre i Ishasha sector, QENP 10.1.
299. **Red-capped Lark** *Calandrella cinerea* Fem sedda i QENP 8-10.2.
300. **Rock Martin** *Hirundo fuligula* Fler än tolv sammanlagt under fyra obsdagar.
301. **Plain Martin** *Riparia paludicola* En i QENP 8.2.

302. **Sand Martin** *Ripara ripara* Allmän, förutom på högre höjd i Bwindi, med 16 obsdagar.
303. **Banded Martin** *Ripara cincta* Tre den 17.2 i Lake Mburo NP 17.2 och tre vid Lutemba Bay 19.2.
304. **Common House Martin** *Delichon urbica* Inte särskilt vanlig med sammanlagt bara 15 under fyra obsdagar.
305. **Red-rumped Swallow** *Hirundo daurica* Tre i Semliki NP 5.2 och minst 15 på väg från Mubwindi Swamp 14.2 samt fem i Mghinga NP 15.2.
306. **Mosque Swallow** *Hirundo senegalensis* En längs vägen 29.1 och två i QENP 8.2.
307. **Rufous-chested Swallow** *Hirundo semirufa* En i Budongo 31.1 och två i MF 2.2.
308. **Lesser Striped Swallow** *Hirundo abyssinica* Hyfsat vanlig med 16 obsdagar.
309. **Barn Swallow** *Hirundo rustica* Allmän under de flesta dagarna. Det var endast på högre höjd i Bwindi som arten inte noterades.
310. **Angola Swallow** *Hirundo aethiopica* Tio obsdagar varav sju med fler än 10 sedda.
311. **Wire-tailed Swallow** *Hirundo smithii* I MF sågs uppskattningsvis 20 individer 2.2 och längs vägen mot QENP 15 individer 7.2.



Wire-tailed Swallow har stjärtspröt som man oftast får anstränga sig ordentligt för att se. Foto Lars Högström

312. **Black Saw-wing** *Psalidoprocne holomelas* Sju obsdagar.
313. **White-headed Saw-wing** *Psalidoprocne albiceps* Nio obsdagar. Ungfåglarna svåra att skilja från Black saw-wing. Alfred menade att det endast fanns White-headed Saw-wing på lägre höjd och att de

vi trodde var Black S-w på lägre nivå i själva verket var ungfåglar av W-h S-w.

314. **African Pied Wagtail** *Motacilla aguimp* Noterad alla dagar utom 30.1. Spridd, i huvudsak vid vatten.
315. **Mountain Wagtail** *Motacilla clara* Två i Kibale 4.2.
316. **Cape Wagtail** *Motacilla capensis* Tre vid Nyanumii Papyrus swamp 15.2 och fyra längs vägen 16.2.
317. **Grey Wagtail** *Motacilla cinerea* Totalt sex individer under fyra obsdagar.
318. **Yellow Wagtail** *Motacilla flava* Tretton obsdagar med flera där arten var allmän. Flera raser involverade.
319. **Yellow-throated Longclaw** *Macronyx croceus* Fem obsdagar. Allmän i QENP.
320. **Grassland Pipit** *Anthus cinnamomeus* Sex obsdagar med flest individer, allmän, i QENP.
321. **Plain-backed Pipit** *Anthus leucophrys* Två på landningsbanan i Ishasha sector, QENP 10.1.
322. **Tree Pipit** *Anthus trivialis* Resans enda ex. sågs vid Albert Escarpment 30.1
323. **Red-throated Pipit** *Anthus cervinus* Fyra sedda i QENP 8-9.2.
324. **Black Cuckoo-shrike** *Campephaga flava* En skadad individ hittades påkörd av bil i södra delen av QENP 9.2



Honfärgad Black Cuckoo-shrike som låg och flämtade mitt på vägen. Janne flyttade den till en säkrare plats en bit in bland buskarna. Foto Lars Högström

325. **Purple-throated Cuckoo-shrike** *Campephaga quiscalina* En hona i

- Budongo 31.1 och åtta i Mabira Forest 18.2 samt två, hane och hona, i samma område 19.2
326. **Petit's Cuckoo-shrike** *Campephaga petiti* Sammanlagt 18 i Bwindi 11-13.2.
327. **Grey Cuckoo-shrike** *Corosina caesia* Sex individer i Bwindi 13-15.2.
328. **Western Nicator** *Nicator cloris* Sju individer under fyra obsdagar. Flest i Semliki NP, tre, 6.2.
329. **Yellow-throated Nicator** *Nicator vireo* Två sedda och två hörda i Semliki NP 5-7.2.
330. **Common Bulbul** *Pycnonotus barbatus* Allmän. Noterade alla dagar utom en, för det mesta som allmän.
331. **Yellow-whiskered Greenbul** *Andropadus latirostris* Tolv sedda totalt i Bwindi, Mghinga NP och Mabira Forest.
332. **Little Greenbul** *Andropadus virens* Flera än 20 totalt med flest i Bwindi 12.2.
333. **Mountain Greenbul** *Andropadus nigriceps* Sedd i Bwindi med omkring 20 individer.
334. **Slender-billed Greenbul** *Andropadus gracilirostris* Totalt 16 individer under sju obsdagar.
335. **Shelley's Greenbul** *Andropadus masukuensis* Fyra i Bwindi 11-12.2.
336. **Yellow-streaked Greenbul** *Phyllastrephus flavostriatus* Två vid the Neck, Ruhiza, 13.2.
337. **Cabanis's Greenbul** *Phyllastrephus cabanisi* Två i Bwindi 10.2.
338. **Little Grey Greenbul** *Andropadus gracilis* Totalt 15 i bland annat Budongo och Mabira Forest. Fyra obsdagar.
339. **Toro Olive Greenbul** *Phyllastrephus hypochloris* Nio sedda och en hörd i Semliki NP, Bwindi och Mabira Forest.
340. **Cameroon Sombre Greenbul** *Andropadus curvirostris* Tretton under sex obsdagar; Budongo, Semliki NP, QENP och Mabira Forest.
341. **Ansorge's Greenbul** *Andropadus ansorgei* Fler än tio i Bwindi 11-12.2.
342. **Xavier's Greenbul** *Phyllastrephus xavieri* Två i Semliki NP 6.2.
343. **Leaf-love** *Pyrrhurus scandens* Två i Semliki NP 7.2.
344. **Joyful Greenbul** *Chlorocichla laetissima* Tre i Kibale 3.2.
345. **Red-tailed Bristlebill** *Blenda syndactyla* Endast hörd i Kanyo Pabidi 1.2 och i Mabira Forest 18.2.
346. **Green-tailed Bristlebill** *Blenda eximia* En sedd i Semliki NP 6.2 och en hörd i Mabira Forest 18.2.
347. **Red-tailed Greenbul** *Criniger calurus* Sex obsdagar med minst 20 totalt; Semliki NP, Bwindi och Mabira Forest.
348. **White-throated Greenbul** *Phyllastrephus albigularis* Totalt 15 noterade; Budongo, Semliki NP och Mabira Forest.
349. **Yellow-throated Greenbul** *Chlorocichla flavicollis* Tolv längs vägen 29.1.
350. **Honeyguide Greenbul** *Baeopogon indicator* Minst 18 under sju obsdagar; Budongo, Bwindi och Mabira Forest.
351. **Spotted Greenbul** *Ixonotus guttatus* Närmare 25 i Budongo 31.1.
352. **White-starred Robin** *Pogonochla stellata* Elva sedda i Bwindi.
353. **Equatorial Akalat** *Sheppardia aequatorialis* En hörd och två sedda i Bwindi.
354. **Forest Robin** *Stiphrornis erythrothorax* En i Kanyo Pabidi 31.1.
355. **Brown-chested Alethe** *Alethe poliocephala* Totalt nio noterade; Kibale Forest, Semliki NP och Bwindi.
356. **Red-throated Alethe** *Alethe poliophrys* Albertine Rift Endemic. Två i Bwindi 12.2.

357. **Fire-crested Alethe** *Alethe diademata* Fyra i Kanyo Pabida, tre i Semliki NP och en hörd i Mabira Forest.



Fire-crested Alethe. Foto Lars Högrström.

358. **White-browed Robin-Chat** *Cossypha heuglini* Två i Kibale och omkring tio noterade i QENP.
359. **Blue-shouldered Robin-Chat** *Cossypha cyanocamptor* Två i Bwindi 11.2 och 13.2 och tre hörda i Mabira Forest 18-19.2.
360. **Snowy-headed Robin-Chat** *Cossypha niveicapilla* Två hörda intill Nile Safari Camp, MF 1.2.
361. **Red-capped Robin-Chat** *Cossypha natalensis* En sedd och två hörda i QENP 7.2.
362. **Grey-winged Robin-Chat** *Cossypha polioptera* En hörd Kanyo Pabida 4.2 och en hörd och en annan sedd i Bwindi 11-12.2.
363. **Archer's Robin-Chat** *Cossypha archeri* Albertine Rift Endemic. Två hörda och två sedda i Bwindi 14 och 16.2.
364. **White-bellied Robin-Chat** *Cossyphicula roberti* Sju noterade i Bwindi.
365. **Olive Thrush** *Turdus olivaceus* En i Ruhiza 14.2 och en 15.2
366. **African Thrush** *Turdus pelios* Sex obsdagar med totalt 16 ex.
367. **Grey Ground-Thrush** *Zoothera princei* En hörd i Semliki NP 5.2.

368. **White-tailed Ant-Thrush** *Neocossyphus poensis* Hörd i Kanyo Pabidi 1.2 och i Semliki NP 4.2.

369. **Red-tailed Ant-Thrush** *Neocossyphus rufus* En i Budongo 31.1, en i Kanyo Pabidi 1.2 och en hörd i QENP 7.1.

370. **Rufous Flycatcher-Thrush** *Stizorhina fraseri* Två i Budongo 31.1, en i Kanyo Pabidi 1.2, två i Semliki NP 6.2 samt fyra vid Jacana Lodge, QENP 7.2.

371. **Sooty Chat** *Myrmecocichla nigra* Elva obsdagar med flest i QENP - noterad som allmän i Ishasha exempelvis.



Sooty chat är sällskaplig och näringssöker gärna på och efter vägar. Foto Lars Högrström

372. **Cliff Chat** *Myrmecocichla cinnamomeiventris* En vid Albert Escarpment 30.1.
373. **White-fronted Black Chat** *Myrmecocichla albifrons* Fem sedda i MF 2.2.
374. **Common (African) Stonechat** *Saxicola torquata/torquatus* Totalt tolv sedda, stort sett alla längs vägen. Svenska TK har inte splittat arten. Om den splittas får den afrikanska arten artnamnet torquatus och den europeiska får heta rubicola.
375. **Whinchat** *Saxicola rubetra* Tio obsdagar där arten exempelvis noterades som tämligen allmän i QENP.
376. **Northern Wheatear** *Qenanthe oenanthe* Sedd under den nordliga delen av resrutten och betecknad som tämligen allmän i MF.
377. **Isabelline Wheatear** *Qenanthe isabellina* Två nedanför Albert Escarpment 30.1 och en i MF 2.2.

378. **Pied Wheatear** *Qenanthe pleschanka* En längs vägen utmed Lake Albert 3.2.

379. **White-browed Scrub-Robin** *Cercotricas leucophrys* Sammanlagt tre sedda vid Albert Escarpment 30.1 samt 3.2.

380. **Brown-backed Scrub-Robin** *Cercotricas hartlaubi* En i Kibale 5.2 och en längs vägen den 13.2.

381. **Spotted Morning-Thrush** *Cichladusa guttata* Två längs vägen 30.1, en i MF 2.2 och en längs vägen 3.2.

382. **Mountain Yellow Warbler** *Chloropeta similis* Fler än fem i Ruhiza 14.2, tre i samma område 15.2 och fem hörda i Mghinga NP 16.2.

383. **Papyrus Yellow Warbler** *Chloropeta gracilirostris* Papyrus endemic; en i Nyanumio papyrusträsk 15.2.



Papyrus Yellow Warbler. Foto Lars Högström

384. **Greater Swamp Warbler** *Acrocephalus rufescens* En sjungande i Mabamba Swamp 29.1 och två i Nyanumio papyrusträsk 15.2.

385. **African Reed Warbler** *Acrocephalus baeticatus* En sjungande vid Lake Albert 30.1.

386. **Eurasian Reed Warbler** *Acrocephalus scirpaceus* En sjungande i Lutemba Bay 19.2.

387. **Sedge Warbler** *Acrocephalus schoenobaenus* En i trädgården till Vanilla Hotel nära Semliki NP 5.2 och en i Mghinga NP 15.2.

388. **White-winged Warbler** *Bradypterus carpalis* Papyrus Endemic. Två hörda i papyrusträsk nära Kibale 5.2, en sedd i

Nyanumio papyrusträsk 15.2 samt två hörda i Lake Mburo 17.2.

389. **Cinnamon Bracken Warbler** *Bradypterus cinnamomeus* Tre i Ruhiza 15.2 och upp till fem i Mghinga NP 16.2.

390. **Evergreen Forest Warbler** *Bradypterus lopezi* Tre i Ruhiza 14.2.

391. **Grauer's Rush Warbler** *Bradypterus graueri* Albertine Rift Endemic enligt IUCN. En i våtmark, Muchuya swamp, nära vägen 15.2.

392. **Olivaceous Warbler** *Hippolais pallida* Cirka 20 under fem obsdagar. Flest i Semliki NP och QENP.

393. **Icterine Warbler** *Hippolais icterina* En på väg från MF efter vägen 3.2.

394. **Barred Warbler** *Sylvia nisoria* Tre vid samma stopp som ovan.

395. **Blackcap** *Sylvia atricapilla* Totalt nio noterade, flest, fyra, i Mghinga NP.

396. **Buff-bellied Warbler** *Phyllolais pulchella* Två längs vägen från MF 3.2 och två i QENP 8-9.2.

397. **Willow Warbler** *Phylloscopus trochilus* Sju individer under sex obsdagar.

398. **Chiffchaff** *Phylloscopus collybita* En i MF 2.2.

399. **Wood Warbler** *Phylloscopus sibilatrix* En i Semliki NP, en i Bwindi och en i Lake Mburo NP.

400. **Uganda Woodland Warbler** *Phylloscopus budongoensis* Två sågs (som sig bör enligt det latinska artnamnet) i Budongo 31.1.

401. **Brown Woodland Warbler** *Phylloscopus umbrovirens* Två högt upp i Mghinga NP. 16.2

402. **Red-faced Woodland Warbler** *Phylloscopus laetus* Albertine Rift Endemic.. Minst tio i Bwindi och en i Mghinga NP.

403. **Green Hylia** *Hylia prasina* Minst elva totalt; Budongo, Semliki NP, Bwindi och Mabira Forest.
404. **Short-tailed Warbler** *Hemitesia neumanni* Albertine Rift Endemic. En, som sågs av halva gruppen, i Bwindi 12.2. (medan den andra halvan gorilla-treckade).
405. **White-browed Crombec** *Sylvietta leucophrys* Tre sedda i Bwindi 11-12.2.
406. **Green Crombec** *Sylvietta virens* Minst 14 under sex obsdagar. Flest, fem, i Kanyo Pabidi 1.2.
407. **Lemon-bellied Crombec** *Sylvietta denti* En sedd i Budongo 30.1 och två hörda i Semliki NP 6-7.2.
408. **Yellow Longbill** *Macrosphenus flavicans* En i Semliki NP 6.2.
409. **Grey Longbill** *Macrosphenus concolor* Två i Budongo 31.1, minst tre i Kanyo Pabidi 1.2 samt två i Mabira Forest 18-19.2.
410. **Northern Crombec** *Sylvietta brachyura* Fyra under tre obsdagar. Bland annat sedd i QENP och MF.
411. **Rufous-crowned Eremomela** *Eremomela badiceps* Sex i Budongo 30.1.
412. **Black-faced Rufous Warbler** *Bathmocercus rufus* Framför allt hört, men även några gånger sedd, med totalt 11 ex vid The Neck Ruhiza Bwindi 11-12.2



Black-faced Rufous Warbler är sällan så här bussig utan håller sig oftast dold i skogens undervegetation. Foto Lars Högström.

413. **African Moustached Warbler** *Melocichla mentalis* Två i QENP 9.2.
414. **Grauer's Warbler** *Graueria vittata* Albertine Rift Endemic. Fyra i Ruhiza 15.2
415. **Zitting Cisticola** *Cisticola juncidis* En längs vägen 3.2 samt betecknad som allmän i QENP.
416. **Black-backed Cisticola** *Cisticola eximus* En i MF 2.2.
417. **Croaking Cisticola** *Cisticola natalensis* Två i MF 2.2 och två i QENP 9.2.
418. **Rattling Cisticola** *Cisticola chiniana* Fler än fem efter vägen 30.1.
419. **Winding Cisticola** *Cisticola galactotes* Sju obsdagar av tolv individer. Flest, fem, i Mabamba Swamp 29.1.
420. **Carruther's Cisticola** *Cisticola carruthersi* Fem i Nyanumio papyrusträsk 15.2.
421. **Red-faced Cisticola** *Cisticola erythrops* En i Semliki NP 7.2.
422. **Chubb's Cisticola** *Cisticola chubbi* Två i Kibale 3.2, två längs vägen 5.2 och tämligen allmän i Bwindi-Ruhiza -Mghinga NP .
423. **Trilling Cisticola** *Cisticola woosnami* Totalt sex noterade i QENP och i Lake Mburo NP.
424. **Siffling Cisticola** *Cisticola brachypterus* Fem på väg mot Semliki NP 5.2.
425. **Red-winged Grey Warbler** *Drymocichla incana* Två i MF 1.2.
426. **Tawny-flanked Prinia** *Prinia subflava* Minst 15 totalt med flest i QENP.
427. **White-chinned Prinia** *Prinia leucopogon* Minst 17 sedda; flest, sex, i Bwindi 13.2.
428. **Banded Prinia** *Prinia bairdii* Fler än sex Ruhiza 14-15.2.
429. **Grey-capped Warbler** *Emenia lepida* Två sågs bra i Kibale på morgonen 5.2. Ytterligare fyra obsdagar med enstaka individer.

430. **Grey-backed Camaroptera** *Camaroptera brachyra* Totalt 15 obsdagar. En relativt vanlig art med andra ord.
431. **Olive-green Camaroptera** *Camaroptera chloronota* Totalt fyra enstaka observerade; Semliki NP, Bwindi och Mabira Forest.
432. **Yellow-browed Camaroptera** *Camaroptera supercilialis* En vardera i Bwindi 11.2 och i Mabira Forest 18.2. Den sistnämnda sågs riktigt bra.
433. **Grey Apalis** *Apalis cinerea* Sedd 11-13.2 i Bwindi med upp till fler än 15 per dag.
434. **Chestnut-throated Apalis** *Apalis porphyrolaema* Tre sedda i Ruhiza 13-14.2.
435. **Buff-throated Apalis** *Apalis rufogularis* Totalt fler än 17 noterade under sju obsdagar. Flest i Bwindi med fler än fem 12.2.
436. **Collared Apalis** *Apalis ruwenzorii* Albertine Rift Endemic. Tre obsdagar omkring Ruhiza.
437. **Black-throated Apalis** *Apalis jacksoni* Tre sedda i Bwindi inkl. Ruhiza 12.2 och 15.2.
438. **Mountain Masked Apalis** *Apalis personata* Albertine Rift Endemic Sammanlagt ca 15 i Bwindi inkl. Ruhiza.
439. **Black-capped Apalis** *Apalis nigriceps* Två i Budongo 31.1.
440. **White-eyed Slaty Flycatcher** *Melaenornis fischeri* Sammanlagt sju under fyra obsdagar i Bwindi inkl. Ruhiza.
441. **Northern Black Flycatcher** *Melaenornis edolioides* Två sedda vid raster under biltransport 3.2 och 9.2.
442. **Yellow-eyed Black Flycatcher** *Melaenornis ardesiacus* Albertine Rift Endemic Två i Ruhiza 14.2.
443. **Pale Flycatcher** *Bradornis pallidus* Två vid rast under bilresan 1.2.
444. **Ashy Flycatcher** *Muscicapa caerulescens* Fyra i Budongo 31.1.

445. **Spotted Flycatcher** *Muscicapa striata* Två 29.1 och en 3.2. vid rast längs vägen
446. **Gambaga Flycatcher** *Muscicapa gambagae* Fem i MF 2.2.
447. **African Dusky Flycatcher** *Muscicapa adusta* Minst 22 med flest i QENP och Bwindi.
448. **Lead-coloured Flycatcher** *Myioparis plumbeus* En i Semliki NP 7.2, en på väg mot Bwindi 9.2 samt en i Bwindi 10.2.
449. **Grey-throated Flycatcher** *Myioparis griseigularis* En vardera i Budongo 30.1, Semliki NP 6.2 samt Bwindi 11.2.
450. **Swamp Flycatcher** *Muscicapa aquatica* Totalt över 20 sedda vid papyrusvassar där den inte var ovanlig. Flest med tio i Nyanumio papyrusträsk 15.2.



Swamp Flycatcher. Foto Lars Högström

451. **Cassin's Grey Flycatcher** *Muscicapa cassini* Sammanlagt fem noterade, bland annat i Kibale och QENP.
452. **Dusky-blue Flycatcher** *Muscicapa comitata* En i Bwindi 11.2 och 13.2.
453. **Sooty Flycatcher** *Muscicapa infuscatus* Totalt fyra med två i Budongo, en i Kibale och en i Bwindi.
454. **Forest Flycatcher** *Fraseria ocreata* Fyra i Budongo 30-31.1.
455. **Chin-spot Batis** *Batis molitor* En vardera dagen 13.2 och 14.2 i Bwindi.
456. **Black-headed Batis** *Batis minor* Två vid Albert Escarpment 30.1 och två par längs vägen 9.2.
457. **Rwenzori Batis** *Batis diops* Albertine Rift Endemic. Två 13.2 och en 15.2 i Ruhiza.

458. **Ituri Batis** *Batis ituriensis* En i Budongo 30.1.
459. **African Shrike-flycatcher** *Megabis flammulatus* Sammanlagt fler än tio i Budongo, Semliki NP, Bwindi och Mabira Forest.
460. **Black-and-white Shrike-flycatcher** *Bias musicus* En vid stopp längs vägen 3.2 och tre i Mabira Forest 18.2.
461. **Brown-throated Wattle-eye** *Platysteira cyanea* Totalt nio under sex obsdagar med flest i Bwindi; tre 12.2.
462. **Chestnut Wattle-eye** *Dyaphorophya castanea* Totalt tolv noterade med flest i Budongo och Semliki NP
463. **Jameson's Wattle-eye** *Dyaphorophya jamesoni* Två hörda i Budongo 31.1 och en sedd i Mabira Forest 18.2.
464. **African Paradise-flycatcher** *Terpisiphone viridis* Totalt elva med en i Budongo, två i Semliki NP och åtta i Bwindi-området.
465. **Red-bellied Paradise-flycatcher** *Terpisiphone rufiventer* Sammanlagt fyra med en i Budongo, två i Semliki NP och en i Mabira Forest.
466. **Silverbird** *Empidonax semipartitus* Fler än tre vid Albert Escarpment 30.1 samt noterad som tämligen allmän i MF 2-3.2.
467. **Blue-headed Crested-flycatcher** *Trochocercus nitens* Två i Semliki NP 6.2.
468. **White-tailed Crested-flycatcher** *Trochocercus albonotatus* En hörd i Mghinga NP 16.2.
469. **White-bellied Crested-flycatcher** *Trochocercus albiventris* Två i Bwindi 12.2.
470. **African Blue-flycatcher** *Elminia longicauda* En i Kibale 3.2 och en annan i samma område 4.2 samt en den 5.2 Chimpanzee Guest House, Kibale.
471. **White-tailed Blue-flycatcher** *Elminia albicauda* Fler än tolv i Bwindi inkl. Ruhiza 12-15.2.
472. **Chestnut-capped Flycatcher** *Erythrocerus mcallii* Fler än fem dagligen i Budongo 30-31.1.
473. **Scaly-breasted Illadopsis** *Illadopsis albipectus* Totalt åtta hörda och två sedda. Flest i Kibale och Bwindi.
474. **Mountain Illadopsis** *Illadopsis pyrrhoptera* Tre obsdagar i Bwindi omfattande totalt sex exemplar.
475. **Brown Illadopsis** *Illadopsis fulvescens* Två i Budongo 31.1, en i Kanyo Pabidi 1.2 och en hörd i Semliki NP 6.2.
476. **Pale-breasted Illadopsis** *Illadopsis rufipennis* Tre i Bwindi 11-12.2.
477. **Puvel's Illadopsis** *Illadopsis puveli* Två i Kanyo Pabidi 1.2.
478. **Grey-chested Illadopsis** *Illadopsis poliothorax* Två sedda och en hörd i Bwindi
479. **African Hill-babbler** *Pseudoalcippe abyssinica* Två hörda och två sedda i Bwindiområdet 11.2 och 14.2 samt flera i Mghinga NP.
480. **Brown Babbler** *Turdoides plebejus* Tre längs vägen utanför MF 3.2.
481. **Black-lored Babbler** *Turdoides sharpei* Fem totalt i QENP 8-10.2 och tre i Lake Mburo NP 17.2.
482. **Dusky Tit** *Parus funerus* Ett par i Budongo 31.1 och 15 sedda i Bwindi 11-12.2
483. **White-shouldered Tit** *Parus guineensis* Totalt fem varav två sågs vid Albert Escarpment 30.1 medan de tre andra observerades vid stopp längs vägen 29.1 och 1.2
484. **Stripe-breasted Tit** *Parus fasciiventer* Albertine Rift Endemic Totalt tolv sedda i Ruhiza-området 13-15.2.
485. **Tit-Hylia** *Pholidornis ruschiae* Två i Budongo 31.1 och en vid The Neck, Ruhiza 13.2.
486. **African Penduline-Tit** *Anthoscopus caroli* Två i Ishasha sector, QENP 10.2.

487. **Yellow White-eye** *Zosterops senegalensis* Tio obsdagar där arten betecknades som allmän, framförallt i Ruhiza.
488. **Bronze Sunbird** *Nectarinia kilimensis* Sedd bland annat i Kibale och Bwindi med totalt 17 exemplar.
489. **Green-headed Sunbird** *Cyanomitra verticalis* Fem individer, alla i Bwindiområdet.
490. **Blue-throated Brown Sunbird** *Cyanomitra cyanolaema* Totalt sju noterade under fem obsdagar. Flest, två, i Kanyo Pabidi 1.2.
491. **Blue-headed Sunbird** *Cyanomitra alinae* Albertine Rift Endemic. Fem observerade i Bwindi samt en i Mgahinga NP
492. **Northern Double-collared Sunbird** *Cinnyris preussi* Minst 26 noterade i Bwindiområdet.
493. **Olive-bellied Sunbird** *Cinnyris chloropygia* Två i Semliki NP 5.2 och 7.2 samt en i QENP 9.2.
494. **Tiny Sunbird** *Cinnyris minulla* Ett par vid The Neck, Ruhiza., 13.2.
495. **Rwenzori Double-collared sunbird** *Cinnyris stuhlmanni* Albertine Rift Endemic Minst tio i Mgahinga NP 16.2.
496. **Regal Sunbird** *Cinnyris regia* Albertine Rift Endemic Sex ex i Ruhiza 13-14.2 och två i Mgahinga NP 16.2. En av resans vackraste fåglar.
497. **Green-throated Sunbird** *Chalcomitra rubescens* Fem under fyra obsdagar, bland annat i Budongo och Bwindi.
498. **Green Sunbird** *Anthreptes recitrostris* Fler än tre vid stopp längs vägen 30.1 och två vid skilda datum i Bwindi.
499. **Olive Sunbird** *Cyanomitra olivacea* Sammanlagt 18 noterade i Budongo, Semliki NP och Bwindi.
500. **Little Green Sunbird** *Anthreptes seimundi* Totalt tio med flest i Semliki NP och Bwindi.
501. **Grey-headed Sunbird** *Deleornis axillaris* Två i Kanyo Pabidi 1.2 , fyra i Semliki NP 17.2, samt en i Mabira Forest 18.2.
502. **Copper Sunbird** *Cinnyris cuprea* En vid Royal Mile, Budongo 31.1.
503. **Superb Sunbird** *Cinnyris superba* Tre i Budongo 31.1.
504. **Marico Sunbird** *Cinnyris mariquensis* En vid stopp längs vägen 29.1 och minst sex i QENP.
505. **Orange-tufted Sunbird** *Cinnyris bouvieri* Ett par vid stopp längs vägen den 3.2.
506. **Scarlet-chested Sunbird** *Chalcomitra senegalensis* Tolv i QENP och fem vid Kingfisher Lodge, Jinja, 18.2.
507. **Beautiful Sunbird** *Cinnyris pulcella* Fem i Albert Escarpment 30.1 och en i MF 1.2.
508. **Red-chested Sunbird** *Cinnyris erythrocerca* Fyra obsdagar där den bl.a noterades som tämligen allmän vid Mabamba Swamp 29.1. Totalt sex noterade därtill.
509. **Variable Sunbird** *Cinnyris venusta* Minst tolv i Bwindi 13-15.2 och minst fem i Mgahinga NP 16.2.
510. **Collared Sunbird** *Hedydipna collaris* Nio obsdagar med som mest fyra i Semliki NP 6.2.
511. **Western Violet-backed Sunbird** *Anthreptes longuemarei* Två vid Albert Escarpment 30.1, två längs vägen 31.1 och en i Bwindi 10.2.
512. **Common Fiscal** *Lanius collaris* Sedd spritt med tolv längs vägen och med minst tio därtill under game drive i QENP 8.2.
513. **Grey-backed Fiscal** *Lanius excubitoroides* Nio obsdagar, bland annat noterad som allmän i MF och QENP.
514. **Mackinnon's Fiscal** *Lanius mackinnoni* Två sedda längs vägen 5.6, sju i och i närheten av Bwindi 11-14.2 samt två i Mgahinga NP 16.2
515. **Woodchat Shrike** *Lanius senator* Tre i MF 2.2

516. **Isabelline Shrike** *Lanius isabellinus* En i MF 2.2.

517. **Red-backed Shrike** *Lanius collurio* En längs vägen 30.1, två i MF 2.2 och en i QENP 7.2.

518. **Tropical Boubou** *Laniarius aethiopicus*
Hörd vid tre tillfällen; Kibale 5.6, längs vägen 10.2 och två i Mghinga NP 16.2.

519. **Lüdher's Bush-shrike** *Laniarius luehderi* En i Kibale 3.2, ett par längs vägen 10.2 och en i Ruhiza 15.2 samt en under transporten samma dag.

520. **Black-headed Gonolek** *Laniarius erythrogaster* Sju obsdagar. Denna häftiga art (både till utseende och läte) är vanlig i MF och QENP

521. **Papyrus Gonolek** *Laniarius mufumbiri*
Papyrus endemic; minst fyra vid ett papyrusträsk nära Kibale 5.2.



Papyrus Gonolek – en riktig färgklick i papyrusträsk. Foto Lars Högström.

522. **Mountain Black Boubou** *Laniarius poensis*
En i Bwindi 11.2, tre längs vägen 15.2 och tre hörda i Mghinga NP 16.2.

523. **Sooty Boubou** *Laniarius leucorhynchus* En hörd och en sedd i Semliki NP 6.2. Skulkig.

524. **Brubru** *Nilaus afer* En längs vägen 3.2.

525. **Northern Puffback** *Dryoscopus gambensis*
Fem obsdagar med totalt sju exemplar. Mest enstaka men tre vid Albert Escarpment 30.1

526. **Pink-footed Puffback** *Dryoscopus angolensis* Elva i Bwindiområdet under tre obsdagar.

527. **Brown-crowned Tchagra** *Tchagra australis*
En i Bwindi 11.2 och en annan här 13.2

528. **Black-crowned Tchagra** *Tchagra senegala*
Tre obsdagar med fler än 13 individer. Alla observationer gjorda under den nordligare delen av resan, bland annat i MF.

529. **Marsh Tchagra** *Tchagra minuta* En vid Lake Albert 30.1, en 8.2 och två 9.2 i QENP och en i Lake Mburo NP 17.2.

530. **Sulphur-breasted Bush-shrike** *Malaconotus sulfureopectus* Två den 8.2 och 9.2 i QENP och en i Lake Mburo NP 17.2.

531. **Grey-headed Bush-shrike** *Malaconotus blachoti* En hörd vid stopp längs vägen 29.1 och en hörd i MF 2.2.

532. **Lagden's Bush-shrike** *Malaconotus lagdeni*
En sjöng fint från en trädtopp efter stigen mot Mubwindi Swamp 14.2. Fina obsar i tuben tack vare Alfreds skarpa öron!

533. **Many-coloured Bush-shrike** *Malaconotus multicolor* En ungfågel i Kibale 3.2.

534. **Doherty's Bush-shrike** *Malaconotus dohertyi* Det suckades tungt när denna vackra fågel sjöng i en busktopp 40 meter från oss i Bwindi 13.2. Dessutom två hörda i Ruhiza 14.2 och en i Mghinga NP 15.2.



Doherty's Bush-shrike var nog en av de tre arter man hoppades mest på i förväg. Och man blev inte besviken. Foto Lars Högström.

535. **Bocage's Bush-shrike** *Malaconotus bocagei* En hörd i Kibale 4.2, fem sedda i Bwindi 10-13.2 och en sedd i Mabira Forest 18.2

536. **Fork-tailed Drongo** *Dicrurus adsimilis* Åtta obsdagar och betecknad som allmän i bland annat Ishasha sector, QENP.

537. **Velvet-mantled Drongo** *Dicrurus modestus*
Två vardera 11 och 12.2 i Bwindi samt en i
Mabira Forest 18.2.

538. **Piapiac** *Ptilostomus afer* Allmän i norr,
bland annat i MF. Den saknades helt i
söder, men sågs åter i Kampala på
tillbakavägen.

539. **Pied Crow** *Corvus albus* Allmän vid
bebyggelse Inte noterad från MF, men i
övrigt observerades arten dagligen.

540. **White-naped Raven** *Corvus albicollis*
Endast sedd 15.2 med fler än tio runt
Nyamuriro.

541. **Montane Oriole** *Oriolus percivali* Flera
observerade dagligen på högre i höjd i
Bwindi-området 11-16.2.

542. **Western Black-headed Oriole** *Oriolus
brachyrhynchus* Fler än 17 totalt i Budongo,
Kanyo Pabidi och QENP.

543. **African Golden Oriole** *Oriolus auratus* En
hanne vid stopp längs vägen 29.1.

544. **Yellow-billed Oxpecker** *Buphagus
africanus* Fler än 20 i MF 2.2 och fler än 45
i QENP 8-10.2.

545. **Stuhlman's Starling** *Peoptera stuhlmanni*
Minst 22 observerade i Bwindi-området
11-14.2.

546. **Narrow-tailed Starling** *Peoptera lugubris*
Totalt 11 noterade under tre obsdagar i
Bwindi-området 11-13.2.

547. **Waller's Starling** *Onychognathus walleri*
Totalt 18 i Bwindi-området 11-14.2.

548. **Slender-billed Starling** *Onychognathus
tenuirostris* Elva noterade i Bwindi-
området 12-14.2.

549. **Lesser Blue-eared Starling** *Lamprotornis
chloropterus* Sedd tämligen allmänt längs
vägen 29-31.1. Dessutom en den 3.2,
också den vid stopp längs vägen.

550. **Rüppel's Long-tailed Starling** *Lamprotornis
purpuropterus* Åtta obsdagar där arten var
allmän i MF och i Lake Mburo NP. Även
mellan fem och tio sedda per dag i QENP.



Rüppel's Long-tailed Starling. Foto Lars Högström

551. **Purple-headed Starling** *Lamprotornis
purpuriceps* Sex obsdagar med
sammanlagt omkring 30 individer. Flest vid
Mabira Forest 19.2 med uppskattningsvis
10 individer.

552. **Splendid Starling** *Lamprotornis splendidus*
En i QENP 7.2 och fem i Mabira Forest 18.2.

553. **Violet-backed Starling** *Cinnyricinclus
leucogaster* Fyra i Semliki NP 16.2, fler än
200 längs vägen 7.2, sju i QENP 9-10.2
samt två i Lake Mburo NP 17.2.

554. **Sharpe's Starling** *Cinnyricinclus sharpii* Ca.
fem per dag i Bwindi-området 13-15-2

555. **Wattled Starling** *Creatophora cinerea* Tre i
MF 2.2 och fler än 100 i Ishasha Sector,
QENP 9.2.

556. **Speckle-fronted Weaver** *Sporopipes
frontalis* Endast observerad i MF med fler
än 15 individer 2.2.

557. **Grey-headed Sparrow** *Passer griseus*
Totalt 14 obsdagar där den bedömdes som
allmän flera av dagarna. En vanlig fågel.

558. **Chestnut-crowned Sparrow-weaver**
Plocepasser superciliosus Endast sedd vid
Albert Escarpment 30.1.

559. **Black-headed Weaver** *Ploceus cucullatus*
Sju obsdagar där arten var allmän i bland
annat Ishasha sector, QENP.

560. **Lesser Masked Weaver** *Ploceus
intermedius* Fem i QENP 8.2 och fler än 20
i Lake Mburo NP 17.2.

561. **"Entebbe Weaver" Ploceus ???** I
Nyanumio papyrusträsk finns en
population av vävare som möjligen är
hybrider mellan Northern Brown-throated
och Yellow-backed Weaver. De var

allmänna där vid vårt besök 15.2. Se faktaruta nästa sida.

562. **Vitelline Masked Weaver** *Ploceus velatus*
Två vid stopp längs vägen 3.2.

563. **Spectacled Weaver** *Ploceus ocularis* Två
vid stopp längs vägen 3.2 och ett par i
Kibale 5.2.

De vackra vävarna i vassen

Normalt brukar det vara små, gråbrungröna pjoddar som ställer till med bestämningsproblem på utlandstripper. Men i Uganda hade vi svårt att sätta namn på flera vackert färgade vävare. Titta exempelvis på Lars Högströms bilder här intill från papyruskärret vid Nyamuriro.

En vackert färgad hanne *Ploceus*-vävare med ostreckat gulgrön rygg, gul nacke, svarta kinder, hjässa och strupe samt tydligt varm rödbrun ton på övre delen av bröstet. Borde vara lätta att bestämma till art. Men tji! Har läsaren av dessa rader något bra förslag? Välkommen i så fall med dem per mejl till per_alind@hotmail.com!

Vi har använt "Entebbe Weaver" som arbetsnamn på de här fåglarna. Liknande individer (om än med något mera rödbrunt på bröstet) noterade vi även vid Mbamba swamp, Lake Mburo och Kazinga Channel i QENP. "Entebbe Weaver", eller synonym "Lake Victoria Weaver", har visat sig vara en hybrid mellan å ena sidan Northern Brown-thoated Weaver *Ploceus castanops* och å andra sidan antingen Black-headed Weaver *P. melanocephalus* eller Golden-backed Weaver *P. jacksoni* (Handbook of the Birds of the World, Vol. 15)

Innan hybridiseringen blev klarlagd fick de här fåglarna även ett eget latinskt namn *Ploceus victoriae*. Vår eminente guide Alfred T. menade att dessa hybridsvärmar är ganska konstanta och platsbundna. Skulle det visa sig att hybriderna är så och dessutom fortplantar sig med livsduglig avkomma som följd finns möjligheter fört ett riktigt "soffkryss" i sinom tid!



564. **Black-necked Weaver** *Ploceus nigricollis*
Tio i Kibale 5.2, fyra i Bwindi 11.2, ett par vid The Neck Ruhiza 13.2 och tre i Mabira Forest 18.2.
565. **Baglafecht Weaver** *Ploceus baglafecht*
Fem i Kibale 5.2, en i Semliki NP 7.2 och som flest fem i byn Buhoma, Bwindi.
566. **Grosbeak Weaver** *Amblyospiza albifrons*
En i Semliki 6.2, tolv i QENP 7.2, en hona vid The Neck Ruhiza 13.2 samt en vid stopp längs vägen 16.2.
567. **Little Weaver** *Ploceus luteolus* En vid stopp längs vägen 30.1 och ett par i MF vardera dagarna 2.2 och 3.2.
568. **Slender-billed Weaver** *Ploceus pelzelni*
Fler än fyra vid Lake Victoria 29.1 och en i QENP 8.2.
569. **Golden-backed Weaver** *Ploceus jacksoni*
Två vid stopp längs vägen 17.2.
570. **Yellow-backed Weaver** *Ploceus melanocephalus* Tio i MF 2.2 och tio längs Kazinga Channel 8.2.
571. **Northern Brown-throated Weaver** *Ploceus castanops* Minst tio vid lunchstopp i en papyrussjö med öppna vattenytor 17.2. Födosökte på typ "näckrosblad". Även sedd med tio exemplar vid Lutemba Bay 19.2.
572. **Compact Weaver** *Ploceus superciliosus*
Fem i QENP 8-9.2.
573. **Holub's Golden Weaver** *Ploceus xanthops*
Ett par vid stopp längs vägen 3.2 och en i Lake Mburo NP 17.2.
574. **Orange Weaver** *Ploceus aurantius* Fyra exemplar vid Lake Victoria 29.1 vid en av Alfreds stakeouts.
575. **Weyn's Weaver** *Ploceus weynsi* Ganska vanlig i Mabamba Swamp 29.1. Dessutom två i Mabira Forest 19.2.
576. **Strange Weaver** *Ploceus alienus* Albertine Rift Endemic. Tre vid Ruhiza 14.2 och två i Mghinga NP 16.2.

577. **Brown-capped Weaver** *Ploceus insignis*
Två i Bwindi 11.2 och två i samma område 12.2.
578. **Yellow-mantled Weaver** *Ploceus tricolor*
Två i Budongo 31.1 och fyra i Mabira Forest 18.2.
579. **Black-billed Weaver** *Ploceus melanogaster*
Fler än fem vid The Neck, Ruhiza 13.2
580. **Vieillot's Black Weaver** *Ploceus nigerrimus*
Nio obsdagar och räknad som allmän bland annat vid Ishasha Lodge i QENP.
581. **Red-billed Quelea** *Quelea quelea* Fler än tio i MF 2.2.
582. **Red-headed Quelea** *Quelea erythrops* Tre i Semliki NP 7.2
583. **Red-headed Malimbe** *Malimbus rubricollis*
Minst sju i Budongo 31.1 samt tio i Bwindi 11-13.2.
584. **Crested Malimbe** *Malimbus malimbicus*
Fyra i Semliki NP 6.2.
585. **Red-collared Widowbird** *Euplectes ardens*
En i QENP 8.2 och fler än fem på samma plats 9.2.
586. **Fan-tailed Widowbird** *Euplectes axillaris*
Fem i QENP 9.2, tio på väg mot Mghinga NP 15.2 samt fyra respektive en vid stopp längs vägen 16-17.2.



Fan-tailed Widowbird. Lars Högström.

587. **Black Bishop** *Euplectes gierowii* Fem i Semliki NP 7.2 samt en i QENP 9.2.
588. **Yellow Bishop** *Euplectes capensis* En hane vid gorilla-trecking 11.2 och vid stopp längs vägen 15.2.

589. **Yellow-mantled Widowbird** *Euplectes macrourus* Två i MF 2.2.
590. **Southern Red Bishop** *Euplectes orix* En i QENP 8.2.
591. **Grey-headed Negrofinch** *Nigrita canicapilla* Nio obsdagar med minst 23 individer. Flest i Mabira Forest med fler än fem per dag.
592. **Chestnut-breasted Negrofinch** *Nigrita bicolor* Två i Semliki NP 6.2.
593. **White-breasted Negrofinch** *Nigrita fusconota* Fem obsdagar med totalt 15 individer, i Budongo och Bwindi.
594. **Red-fronted Antpecker** *Parmoptila woodhousei* En hane i Semliki NP 6.2, två i Bwindi 11.2 samt en i samma område.12.2.
595. **Red-winged Pytilia** *Pytilia phoenicoptera* En vid Albert Escarpment 30.1.
596. **White-collared Oliveback** *Nesocharis ansorgei* Två mellan Kibale och Fort Portal den 5.2
597. **Grey-headed Oliveback** *Nesocharis capistrata* Två vid stopp längs vägen 3.2.
598. **Brown Twinspot** *Clytospiza monteiri* Fem vid stopp längs vägen utanför Budongo Forest 30.1.
599. **Dusky Twinspot** *Euschistospiza cinereovinacea* Fyra vid stopp längs vägen i Ruhiza 13.2
600. **Green-backed Twinspot** *Mandingoa nitidula* Fem obsdagar med nio individer; dock mycket svårångade fåglar. Alfred var som vanligt till stor hjälp. Noterade i Semliki NP, Bwindi och Mabira Forest.
601. **Dusky Crimsonwing** *Cryptospiza jacksoni* Albertine Rift Endemic. Tre vid Ruhiza,15.2
602. **Red-headed Bluebill** *Spermophaga ruficapilla* Två QENP 7.2 och en hane i Mabira Forest 18.2.
603. **Black-bellied Seedcracker** *Pyrenestes ostrinus* Två i Kibale 4.2 , en 1k i Bwindi 10.2 samt två i Bwindi 12.2.

604. **Red-cheeked Cordon-bleu** *Uraeginthus bengalus* Fem obsdagar fram till den 5.2, därefter ingen noterad. Allmän i bland annat i MF.
605. **Red-billed Firefinch** *Lagonosticta senegala* Tämligen allmän vid stopp längs vägen 30.1 samt tre i Mghinga NP 15.2.
606. **Orange-cheeked Waxbill** *Estrilda melpoda* Två strax utanför Semliki NP6.2. Skall inte finnas här enligt litteraturen, men Alfred visste bättre....
607. **African Firefinch** *Lagonosticta rubricata* Två i Mabamba Swamp 29.1, tre i MF, sex i Semliki samt tämligen allmän i QENP.
608. **Yellow-bellied Waxbill** *Estrilda quartinia* Tio i Bwindi vardera dagarna 13.2 och 14.2.



Yellow-bellied Waxbill. Foto Lars Högström

609. **Fawn-breasted Waxbill** *Estrilda paludicola* Fler än 15 i QENP 9.2 och fem i Mghinga NP 15.2.
610. **Black-crowned Waxbill** *Estrilda nonnula* Fler än tio invid papyrusträsk papyruskärret mellan Kibale NP och Fort Portal 5.2.



Black-crowned waxbill. Foto Lars Högström

611. **Black-headed Waxbill** *Estrilda atricapilla*
Två vid stopp längs vägen 30.1, fyra Ruhiza
14-15.2 och tio i Mghinga NP 16.2.

612. **Black-faced Waxbill** *Estrilda erythronotos*
En vid Albert Escarpment 30.1.

613. **Bronze Mannikin** *Lonchura cucullata* Fem
obsdagar där den var allmän, bland annat i
QENP och Mghinga NP.

614. **Black-and-white Mannikin** *Lonchura*
bicolor Fyra obsdagar, men fler än 20 på
tre av dem tyder på att arten fläckvis är
allmän. Flest i Semliki NP och Bwindi.

615. **Magpie Mannikin** *Lonchura fringilloides*
Ett par med bo i Bwindi 12.2 och minst tio i
Mabira Forest 19.2.

616. **Pin-tailed Whydah** *Vidua macroura* Fem
obsdagar, någon med fler än 20 individer
en av dagarna i QENP.

617. **Village Indigobird** *Vidua chalybeata* Sedd
endast den 30.1 med fler än tio vid stopp
efter vägen.

618. **Brimstone Canary** *Serinus sulphuratus* En
vid stopp längs vägen 5.2 och ett par i
Mghinga NP 15.2.

619. **Yellow-fronted Canary** *Serinus*
mozambicus En vid stopp längs vägen 29.1
och en vid Albert Escarpment 30.1.

620. **Yellow-crowned Canary** *Serinus canicollis*
En i Ruhiza 13.2 och fyra i samma område
14.2 .

621. **Thick-billed Seedeater** *Serinus burtoni*
Åtta i Bwindi-området 11-15.2.

622. **African Citril** *Serinus citrinelloides* En vid
stopp längs vägen 5.2, två i Bwindi 11.2
samt tre i Mghinga NP 16.2.

623. **Papyrus Canary** *Serinus koliensis* Papyrus
endemic; en vid ett papyrusträsk nära
Kibale 5.2 och två i Nyanumio papyrusträsk
15.2 .



Papyrus Canary. Foto Lars Högström

624. **White-rumped Seedeater** *Serinus*
leucopygius Fler än fem vid stopp längs
vägen 3.2.

625. **Streaky Seedeater** *Serinus striolatus* En i
Bwindi 14.2, tre vid stopp längs vägen 15.2
och två i Mghinga NP 16.2.

626. **Cinnamon-breasted Rock Bunting**
Emberiza tahapizi Två i Albert Escarpment
30.1.

627. **African Golden-breasted Bunting** *Emberiza*
flaviventris En vid stopp längs vägen 29.1,
en i Bwindi 11.2 samt två i Bwindi 14.2.



Artlista större däggdjur

1. **Savannah Baboon** *Papio papio*
Tämligen allmän i norr samt i Queen Elisabeth NP. Sedd åtta dagar.



Savannah Baboon – de är lite småkaxiga. Foto Lars Högström

2. **Grey-cheeked Mangabey** *Lophocebus albigena* Tämligen allmän i Kibale, Semliki och Mabira. Sedd sex dagar.
3. **Vervet Monkey** *Cercopithecus pygerythrus* Spridda obsar under sju dagar.
4. **Blue Monkey** *Cercopithecus mitis* Enstaka ex i Budongo, Kibale, Semliki, Bwindi, Mzazinga och Mabira. De i Mzazinga var av den gula färgfasen, "Golden Monkey". Sedd 11 dagar.
5. **Patas Monkey** *Cercopithecus patas* Fyra ex. i Murchison Falls NP

6. **L'Hoests Guenon** *Cercopithecus l'hoesti* Sammanlagt ca 15 ex. i Bwindi.



L'Hoests Guenon är listad som "vulnerable". Foto Sven Karlsson.

7. **Red-tailed Guenon** *Cercopithecus (c) ascanius* Tämligen allmän i Budongo, Kanyo Pabidi, Semliki, Bwindi och Mabira



Red-tailed Guenon. Foto Lars Högström

8. **Central Red Colubus** *Philiocolubus oustaleti* Några ex. i Kibale-
9. **Guereza Black and White Colubus** *Colubus guereza* Tämligen spridd och allmän. Sedd 14 dagar.
10. **Chimpanzee** *Pan troglodytes* En familjegrupp om minst 27 ex. på närhåll i Kibale. Dessutom hörd i Budongo och Kanyo Pabidi.



Familjegruppens medlemmar som vi mötte i skogen var mycket oroliga och höll till i trädtopparna. Efter en stund kom dock denna schimpanshane ner på marken och la sig på rygg med händerna bakom nacken fullständigt laid-back. Körde de en turistshow? Fick de bananer när vi lämnat dem? Foto Lars Högström

11. **Gorilla** *Gorilla gorilla* En av resans absoluta toppar var mötena med gorillor på närhåll i Bwindi 11 och 12 februari. Lustigt nog var familjegrupperna nästan lika stora, 18 resp. 19 ex.
12. **Plains Zebra** *Equus quagga* 100 + ex. i Lake Mburo NP, f.ö. den enda park i Uganda där man kan finna arten.
13. **Common Hippopotamus** *Hippopotamus amphibius* 400+ ex. i Nilen inom Murchison Falls NP, 200+ ex. i Kazinga Channel i Queen Elisabeth NP, 20+ i Lake Mburo.
14. **Common Warthog** *Phacochoerus africanus* 100+ ex. i Murchison Falls

NP, 100+ ex. i Queen Elisabeth NP, 80+ i Lake Mburo NP

15. **Giraffe** *Giraffa camelopardalis* 50+ ex. i Murchison Falls NP.
16. **African Buffalo** *Syncerus caffer* 600+ ex. i Murchison Falls NP, 600 + ex. i Queen Elisabeth NP, 40+ex. i Lake Mburo NP.
17. **Bushbuck** *Tragelaphus scriptus* Fyra ex. i Murchison Falls NP, ett ex. i Lake Mburo NP.
18. **Waterbuck** *Kobus ellipsiprymnus* 100+ ex. i Murchison Falls NP, 30+ ex. i Queen Elisabeth NP, 10+ex. i Lake Mburo NP.
19. **Kob** *Kobus kob* 600+ ex. i Murchison Falls NP, 1100+ex. i Queen Elisabeth NP.
20. **Bohor Reedbuck** *Redunca redunca* Två ex. i Mburo NP
21. **Hartebeest** *Alcelaphus buselaphus* 50+ ex. i Murchison Falls NP



Hartebeest. Foto Lars Högström

22. **Topi** *Damaliscus lunatus* 100+ ex. i Queen Elisabeth NP, Ishasha sector.
23. **Impala** *Aepycerus melampus* 100 + ex. i Mburo NP, den enda park i Uganda där man kan finna arten.
24. **Oribi** *Oeribia oeribi* 150+ex. i Murchison Falls NP

25. **Black-fronted Duiker** *Cephalopus rufilatus* 1+1 ex i Bwindi

26. **Savannah Elephant** *Loxodonta Africana* Ca 20 ex. i Murchison Falls NP, 60+ ex. i Queen Elisabeth NP.

27. **Side-striped Jackal** *Canis adustus* Två ex. i Murchison Falls NP.

28. **Spotted-necked Otter** *Lutra maculicollis* Tre ex. i liten sjö väster om Lake Mburo NP

29. **African Civet** *Civettictis civetta* Ett ex. i Murchison Falls NP

30. **Genet** *Genetta genettata* ex. vid Jacana Lodge

31. **Spotted Hyena** *Crocuta crocuta* Ett ex. nära Jacana Lodge, Queen Elisabeth NP

32. **Lion** *Panthera leo* En hona med unge i Murchison Falls NP, fyra honor i Queen Elisabeth NP, två juv. hannar i Queen Elisabeth NP, Ishasha sector



De var stora, kanske fem meter, de största. Foto Peter Berglin

Artlista större reptiler

Nile Crocodile *Crocodylus niloticus*

Ca 20 ex., en del av dem mycket stora, längs Nilen i Murchison Falls NP. Även flera ex. i Kazinga Channel, Queen Elisabeth NP

Nile Monitor *Varanus niloticus* Flera sedda.



Denna Sudanska sandsnok upptäcktes för att en stackars Striped Grass Mouse (*Lemniscomys striatus*), som vi tror att det är, dödsrek. Ormen kramade först råttan som den omslingrade helt. Bara huvudet syntes då, men sedan vände den blixtnabbt råttan och tog greppet om nackan och började svälja den. Dock störd valde den att försvinna in under några klippblock. Foto Lars Högström

Northern Stripe-bellied Sand Snake *Psammophis sudanensis* Se foto ovan Albertine Rift i kvällningen 30 januari. Bilden föreställer *Psammophis sudanensis* - alltså Sudansk sandsnok.

(Syn. *Psammophis subtaeniatus sudanensis*; *Psammophis subtaeniatus*). Den hör till den stora gruppen snokar med bakre gifttänder, tidigare kallad Boiginae. Den anses dock ofarlig för människor och bitt ger inga eller ringa symptom. Den blir maximalt 130-140 cm, men många djur är mindre. Den lever främst av ödlor men tar även smågnagare, vilka den förutom att förgifta även slingrar sig runt på boaormsmaner. Den lever i lite torrare savannmiljö och hittas knappast i mer utpräglade regnskogsmiljöer. Många bilder på denna art utlagda på nätet är juvenila djur som har en lite avvikande teckning (förmodligen djur uppfödda i fångenskap). Källa: Torbjörn Pettersson.

Gaboon Viper *Bitis gabonica*

Ett ca en meter långt ex. observerades på grusvägen och påkördes sedan tyvärr nära flygfältet vid Murchison Falls NP på kvällen den 2 februari.

Puff Adder *Bitis arietans*

Ett ex, ca 80 cm långt, sågs från bilen i Ishasha-sektorn av Queen Elisabeth NP mitt på dagen.

Black-necked Spitting Cobra *Naja nigricollis*

Ett över en meter långt ex. sågs från bilen på kvällen i kanten av en mindre väg nära Mbeya Lodge.



Gorilla – det var tillsagt om ett säkerhetsavstånd på sju meter men det hade ingen berättat för gorillorna. Familjegruppen gick ganska obekymrat rakt igenom gruppen av oss besökande ekoturister på avstånd närmare än en meter. Foto Lars Högström