

Sulawesi – Halmahera – West Papua

Oktober 29 – november 20, 2019.

Text: Stig Holmstedt, Foto & Layout: Bengt Legnell



En av höjdpunkterna under resan var tiden vi tillbringade tillsammans med denna tilldragande "pole-dancer". Först arbetade han stenhårt med att sopa bort allt skräp – vissna löv och pinnar, som fallit ner på hans dansbana under natten - och som vår försåtliga lokale guide strött ut innan danskungen anlände i soluppgången. Sedan ett träningspass; allt måste ju klaffa om det blir skarpt läge – den runda, sol-gula nackskölden spänns ut tillsammans med den röda ryggmanteln. Vår kavaljer har klätt sig i en oemotståndlig, psykedelisk, kostym som få honor kan motstå. Till sist återstår att ropa ut att han är redo att uppträda...och hoppas på lite kvinnlig publik att dansa inför – och sedan, kanske, kanske, han får till det.

Wilson's Bird-of-Paradise, Waigeo, West Papua

Inledning

Wallacelinjen är en tänkt nord-sydlig linje i den indonesiska övärlden som delar den orientaliska (även kallad den indomalayiska) djurgeografiska regionen från den australasiatiska. Den går öster om Borneo och Bali. Det djurgeografiska området närmast öster om linjen kallas Wallacea.

Linjen har sitt namn från den brittiska biologen och forskningsresanden Alfred Russel Wallace, som under resor i området mellan åren 1854 och 1862 lade märke till att det rådde en distinkt skillnad mellan florán och faunan på vardera sidan linjen. Endast ett fåtal arter av orientalisk typ förekommer på östra sidan av linjen; vad gäller fåglar finns här exempelvis inga barbetter, trogoner eller skriktrastar och bara ett fåtal arter hackspettar, grönduvor, bulbyler och babblers. I gengäld


förekommer det exempelvis kakaduor och fruktduvor. De sistnämnda samt kungsfiskare och papegojor representeras av ett stort antal arter.

Skillnaderna mellan områdena beror på att de hade ett stort geografiskt avstånd i jordens förflutna. Australien tillhörde den södra superkontinenten Gondwana, medan Asien tillhörde den norra superkontinenten Laurasia. De två superkontinenterna separerades för 200 miljoner år sedan, och de utvecklade olika flora och fauna. Efter fragmenteringen av Gondwana har den australiensiska kontinentalsockeln flyttat norrut och Asien och Australien har därför närmat sig varandra. Under istiden var havsnivån lägre så att öarna väster om Wallacea hade en fastlandsförbindelse med Asien medan Nya Guinea var kopplat till Australien. Wallace-linjen går längs djupområden som aldrig har torrlagts.

Wallacea sträcker sig österut till mellan ögruppen Moluckerna och världens näst största ö, New Guinea. Här finns en ny djurgeografisk skiljelinje, den s.k. Lydekkerlinjen. Den är dock inte lika distinkt som Wallacelinjen.

De nämnda förhållandena innebär att Wallacea och New Guinea hyser ett mycket stort antal endemer i fågelfaunan, långt fler än exempelvis Madagaskar. Strävar man alltså efter en lång världslista så är en resa hit nödvändig.

Bengt Legnell och jag tog därför gemensamt initiativ till en resa med en vecka på vardera Nordöstra Sulawesi och Halmahera, den största ön i Moluckerna, samt med en tilläggsvecka på West Papua, där begränsad till den stora ön Waigeo nordväst om Papuas nordligaste del samt Nimbokrang på norra sidan av ön nära gränsen till Papua New Guinea.



Karta över området. I övre vänstra delen (väster) syns Kilimantan på Borneo. Halvön som sticker ut till höger (öster) är Nya Guinea. Inte långt söder om Nya Guinea (utanför kartbilden) ligger norra Australien och inte långt norr om Sulawesi – Halmahera (utanför kartbilden) ligger Filipinerna.

1. I detta område runt staden Manado gjordes all skådning på Sulawesi.
2. I detta område i centrala Halmahera gjordes all skådning på denna ö.
3. Nimbokrang ligger syd-väst om staden Jayapuri.
4. Man flyger till staden Sorong för att sedan ta båt över till ön Waigeo.

Resan genomfördes mellan den 29 oktober och 20 november 2019 och blev som reseberättelsen nedan visar mycket lyckad med bl.a. sju arter paradisfåglar, alla fyra i området förekommande arter pittor, 16 arter kungsfiskare, 22 arter papegojor och 30 arter duvor. Vädret var för årstiden oväntat bra med bara ett fåtal regnskurar. Det var dock mycket varmt och i Nimbokrang också fuktigt.

Reseberättelse

Den 30 oktober. Efter att ha flugit från Stockholm resp. Köpenhamn med sammanstrålade och byte av plan i Singapore anlände vi till Manado på norra Sulawesi tidigt på morgonen. Här möttes vi av vår guide Theo samt Bengt och deltagaren Tommy Löfgren som hade kommit en vecka i förväg för att snorkla. I Manado skimrades *Chestnut Munia*, *Javan Myna* och *Slenderbilled Crow* innan vi gav oss iväg mot resans första målområde, nationalparken Tangkoko, längst uppe i nordost på ön. Vid ett längre stopp längs vägen, vid en plats med bra utsikt över fin regnskog, började arterna trilla in. *Glossy Swiftlet*, *Black-billed Koel* (hörd), *Sultan's* och *White-faced Cuckoo-dove*, *Grey-cheeked Green Pigeon*, *Black-naped Fruit Dove*, *Green* och *Silver-tipped Imperial Pigeon*, *Knobbed Hornbill*, *Blue-backed Parrot* och *Great Hanging Parrot*, *Sulawesi Cicadabird*, *Black-naped Oriole*, *White-eyed Drongo*, *White-necked Myna* och *Olive-backed Sunbird*. Vi inkvarterades på en enkel men trevlig lodge, varifrån vi hörde en visslande *Sulawesi Scops Owl* när det blivit mörkt. Den lät närmast som en tveksam sparvuggla.



Sulawesi Lilac Kingfisher



Scaly Kingfisher



Green-backed Kingfisher




Sulawesi Dwarf-kingfisher

Hälften av de tolv arter kungsfiskare som finns på Sulawesi är endemiska för denna ö. Vi såg 5 av dessa - den 6:e finns på den södra delen av ön.

Anmärkningsvärt är även att dessa skogslevande kungsfiskare är mycket oskygga (fotografierna är inte tagna från gömslen, utan tillsammans med åtta – inte alltid helt tystlåtna, skådande svenskar på promenad i skogarna!)


Den 31 oktober. Vi gjorde skådarturer både på morgonen-förmiddagen och på sena eftermiddagen. Med oss hade vi då förutom Theo den lokale guiden Samuel och hans flickvän. Första stoppet var vid en stake-out för *Sulawesi Goshawk*, som programenligt satt på en lutande gren nära bilvägen. Det blev faktiskt den enda obsen av den arten på resan. I närheten satt lite oväntat en *Purple Heron* i ett lågt träd. En juv. *Rufous-bellied Eagle* flög över. Längre bort längs vägen gav vi oss ut på en stig i skogen. Före oss halvsprang Samuel, men vi hann ändå se några nya arter som *Uniform Swiftlet*, *Vinous-breasted Sparrowhawk*, *Lilac Kingfisher*, *Pied Cuckooshrike*, *Pale-blue Monarch* samt *Brown-*

throated, *Black* och *Crimson Sunbird*. Målet för vandringen var i första hand Sulawesi Pitta som Samuel nu organiserade något som liknade ett drev efter, genomfört av honom, hans flickvän och några lokala krafter till. Uppspelningar användes flitigt, vilket dock bara resulterade i något enstaka svar, på långt håll. Vi tyckte snart att det hela urartade – uppenbarligen var det en prestigesak för Samuel att få fram pittan. Till slut lyckades vi få stopp på processen och återvända till vägen för att åka tillbaka till lodgen för lunch och siesta.



Hackspettar finns på alla kontinenter utom Australien. Men endast två arter har klarat av att korsa Wallace-linjen. Båda dessa endemer finns endast på Sulawesi där de är ganska vanliga.

Ashy Woodpecker - hanne



Spangled Drongo, däremot, finns i olika arter och varianter runt större delen av Asien och Australien. Enbart i ö-grupperna i Wallacea finns 15 endemiska arter.

Den på Sulawesi har vitt öga – alla andra har mörkt/rött.
White-eyed Spangled Drongo


Eftermiddagsturen började vid tretiden då vi startade ganska nära lodgen för att i huvudsak skåda längs en väg som gick nära havsstranden. Här kryssade vi *Yellow-billed Malkoa*, *Barred Rail*, *Isabelline Bush-hen* (hörd), *Chinese* och *Spot-tailed Sparrowhawk*, 1+2 *Sulawesi Scops Owls* på dagkvist (bara hörd dagen innan), *Green-backed* och *Ruddy Kingfisher* samt *Grosbeak Myna*. Huvudmålarten var dock *Red-backed Thrush* som vi så småningom fick se mycket fint. På tillbakavägen fick några se *Isabelline Bush-hen* och alla fick sedan avnjuta spelande såväl endemiska *Sulawesi Nightjar* samt i Asien mer spridda *Great-tailed Nightjar*.

Den 1 november. Denna dag kom att domineras av en lång punktorientering mellan olika begivenheter i både fågel- och däggdjursfaunan. Vi gick upp och ner i terrängen och i den som vanligt starka hettan blev det en mycket svettig vandring. Som tur var mycket givande också med nya arter som *Phillipine Megapode*, *Grey-rumped Treeswift*, *Lesser Coucal*, *Dwarf Sparrowhawk*, *Ochre-bellied Boobook* (hanne och hona på dagkvist), *Sulawesi Dwarf Kingfisher*, *Ashy Woodpecker*, *Ornate Lorikeet*, *Ivory-backed Woodswallow* och *Sulawesi Babbler*. Roligt var också ett bo av *Knobbed Hornbill* där en av föräldrarna matade ungarna liggande raklång på en grov gren! Vi fick också se några intressanta endemiska däggdjur; en stor flock *Crested Macaques*, två märkliga *Bear Couscous* samt en *Sulawesi Tarsier* (spökdjur) i ett trädhål.

Den 2 november. Morgonen och förmiddagen tillbringade vi på en bra utkiksplats och det var mycket givande med en lång rad fina arter. Så spanade vi bl.a. in flera rovfågelarter som *Barred Honey Buzzard*, *Sulawesi Hawk Eagle* och våra första *Brahminy Kites*. Andra nya fåglar för resan var *Sulawesi Swiftlet*, *Pink-necked Green Pigeon*, *Sulawesi Hornbill*, *Collared Kingfisher*, *Sulawesi Pygmy Woodpecker*, *Golden-mantled* och *Yellow-breasted Racket-tail*, *White-rumped Cuckoshrike* och *White-rumped Triller*.



Stora som röda pandor, med en jättesvans och kraftiga bakfötter. Dessa endemiska pungdjur anses vara släkt med possums
Bear Cuscus



Endemisk och utrotningshotad har denna macaque en fristad i Tangkoko's skogar
Sulawesi Crested (eller Black) Macaque



Spökdjuren – Tarsiers, räknas numer till apsläktet. Dessa mycket små apor, de väger endast mellan 30- 170 gram, är utrotningshotade på de flesta håll. Det finns ca. 18 arter spridda runt Filipinerna, Borneo & Sulawesi.
Sulawesi (östlig) Tarsier



Kanske inte en eldsprutande flygande drake från sagornas värld. Inte kan den flyga heller, men denna decimeter-långa flygödlan har lånat sitt latinska namn från draken. Den kan glidflyga långa sträckor mellan trädstammarna.
Draco spilonotus eller Sulawesi Gliding Lizard

På eftermiddagen for vi ned till havet, till ett slags fiskeläge där stranden tyvärr var helt översållad av plastavfall och döda maneter. Härifrån for vi med två utriggare tvärs över en bukt och till mynningen av en liten flod där vi fick vänta på att vattnet skulle stiga innan båtarna kunde ta sig in. Under tiden

vadade vi över till flodens andra sida. Fåglar vi nu noterade var *Pied Imperial Pigeon*, *Whimbrel*, *Grey-tailed Tattler*, *Common Sandpiper*, *Black-naped Tern*, *Striated Heron* och *Pacific Reef Heron*. När vi kom in på floden såg vi snabbt turens främsta mållart *Great-Billed Kingfisher* mycket fint. Även en *Common Kingfisher* noterades.



Sulawesi Hornbill – hane



Knobbed Hornbill - hane

Det finns ungefär 54 arter näshornsfåglar i världen. De finns i södra och mellersta Afrika och i södra och östra delen av Asien. Fyra av dessa har vågat sig på att korsa Wallace-linjen. De två arterna ovan är Sulawesi-endemer.



Sulawesi Scops Owl *Otus manadensis*



Ochre-bellied Boobook *Ninox ochracea*

Det finns totalt ca. 45 arter av dvärguvar, *Otus*, några i Afrika och Europa, lite fler i Asien för att sedan bli som flest på öarna i Wallacea. Här finns 11 arter, $\frac{1}{4}$ av familjens arter. Endast en *Otus*-art återfinns öster om Wallacea, på den lilla närliggande ön Biak, Västra Papua. Det finns inga dvärguvar i Australien/Amerika

Ninox ugglor har en ännu märkligare utbredning. Av de drygt 25 arterna som beskrivits, återfinns hela 17 endemiska arter i Wallacea – $\frac{1}{4}$ av hela familjen. Ytterligare 6 arter återfinns på Nya Guinea. Endast en handfull *Ninox*- ugglor har letat sig ut ur dessa två områden; några till Australien och några till syd-sydost Asien och Filipinerna. En art finns också ändå uppe i Amurland i ryska Fjärran östern.

Nya arter av dessa två uggle-familjer upptäcks/återupptäcks nästan årligen på någon liten ö i detta område. Märkligt



Det finns fortfarande många stora, gamla träd i Tangkoko-skogen - området verkade vara orört och pristint.
Gunilla framför ett jätte-träd.



När tidvattnet dragit sig tillbaka hade stranden plötsligt förvandlats till en sopptip – plast och skräp, tillsammans med 1000-tals maneter låg uppspolade på stranden. Byns ungar startade snöbollskrig med brännmaneterna – man bränns om maneten landar med buken upp.



Great-billed Kingfisher



Ruddy Kingfisher

Den 3 november. Denna dag förflyttade vi oss mot sydväst på ön. Resan tog mycket lång tid, trots att vi på kartan inte kommit längre än till ungefär böjen på öns nordligaste halvö. Sulawesi är en stor ö och det lär ta tre långa kördagar att ta sig ned till staden Makassar i söder. Det blev inte mycket tid för skådning, men vi stannade i alla fall vid en våtmark där vi fann en lång rad för resan nya arter, i huvudsak dock inga endemer. De nya var *Sunda Teal*, *Red Turtle Dove*, *Zebra Dove*, *Pied Stilt*, *Pacific Golden Plover*, *Little Ringed Plover*, *Wood Sandpiper*, *Common Greenshank*, *Javan Pond Heron*, *Intermediate Egret*, *Little Egret*, *Zitting Cisticola*, *Black-faced* och *Scaly-breasted Munia* samt *Eastern Yellow Wagtail*.

Av intresse i övrigt under dagens transport var sammanlagt fem *Purple-Winged Rollers*. Vi inkvarterades på ett ganska lyxigt hotell i en stad som låg ca en timme från morgondagens mål där den främsta målartern var den legendariska Maleon, den stora endemiska och starkt hotade fågeln ur familjen storfothöns (Megapodes).



Henrik håller upp en skadad Sulawesi Roller.



...vid besök för 1½ år sedan fanns det gott om änder i sjön!

Den 4 november. Denna morgon startade vi extra tidigt eftersom färden till Tambun skulle ta lite tid. I Tambun har man ett projekt för att bevara Maleon, bl. a. genom att gräva upp de ägg de lagt i sand för att sedan kläcka och föda upp ungarna i voljärer för senare utsättning. Vi leddes in i skogen av en guide som ganska omgående fick syn på en *Maleo* på nattkvist högt uppe i ett träd. Senare på morgonen fick vi fler och bättre obsar och även foton av denna märkliga art. Andra för resan nya arter i maleons skog var *Little Bronze Cuckoo*, *Rusty-breasted Cuckoo*, *Oberholzer's Fruit Dove*, *Red-backed Buttonquail* och *Sulawesi Drongo*.

Det fanns en vingskadad *Purple-winged Roller* vid entrebyggnaden till reservatet och den höll man på att rehabilitera. Den blev givetvis mycket fotograferad.

Gert gick en liten runda utanför reservatet och såg då två *Wandering Whistling Ducks*. När vi med vår bil lämnade området upptäckte vi en subad. *Black Eagle* och sjungande *Black-crowned White-eye*. Vid ett översvämmat risfält gick en beckasin bland flera andra vadare. Det var antingen en *Siberian* eller en *Swinhoe's*, troligen den sistnämnda. Efter lunch och siesta på den homestay där det från början var meningen att vi skulle ha bott begav vi oss på eftermiddagen till nästa mål, ett reservat som hette Toraut. Vid infarten sprang två *Barred Rails* och häromkring sågs även ett antal stora seglare som vi så småningom enhälligt kunde bestämma till *Purple Needletails*. I luften noterades även ett tiotal *Black Kites* samt en *Spotted Kestrel* och i ett stort träd satt ett antal *Black-crowned Night Herons*. Efter att i omgångar färjats över en å på en bambuflotte gjorde vi en rundvandring i en regnskog. I dess bryn långt bort på vår vandringsslinga såg några en *Pygmy Hanging Parrot*.

Avslutningen på dagen blev magnifik när Theo lyckades få fram en *Sulawesi Masked Owl* till allas beskådande.



Maleon gräver ner de nästan strutsstora äggen ca ½ m. i den vulkaniskt varma marken som inkuberar äggen. Kycklingen gräver sig själv till ytan och är då flygfärdig.



Lite strapatser får man väl stå ut med? Här korsar gänget en flod i Toraut. Alla klarade sig torrskodda!

Den 5 november. På förmiddagen vandrade vi nedför en regnskogsomgiven väg, men vandringen blev en flopp från fågelsynpunkt. Nästan det enda roliga var att alla nu fick se näpna *Pygmy Hanging Parrots* samt att det seglade ett antal *White-throated Needletails* uppe i luften.

Därefter körde vi tillbaka i riktning mot Manado, men vek av upp mot bergen någon mil innan staden. Här besökte vi en sjö som hade vassbälten på några ställen och en rad intressanta arter hittades som förväntat. Nya för resan var *Buff-banded Rail*, *White-breasted Waterhen*, *Australasian Swamphen*, *Dusky Moorhen*, *Yellow Bittern* och *Oriental Reed Warbler*. Inte nya men ganska många var *Wandering Whistling Duck* (100+) och *Sunda Teal* (50+).

Vi tog in på en trevlig lodge i Tomohon och inkvarterades här i småstugor.

Den 6 november. Detta blev sista skådardagen på Sulawesi och den blev riktigt lyckad. Samuel, som guidat oss i Tangkoko, hade tillsammans med sin flickvän anslutit sig och då blev det förstås letande efter *Sulawesi Pitta* igen. Denna gång med succé för åtminstone de av oss som fick se fågeln riktigt nära och bra. På samma regnskogsvandring hittade vi också en annan mycket fin art; *Scaly-breasted Kingfishers*, ett par. Vidare såg vi *Superb Fruit Dove*, *Sulphur-vented Whistler*, *Citrine Canary-*



Superb Fruitdove



Citrine Canary-flycatcher



Scaly-breasted Kingfisher



Black-headed (Chestnut) Munia

Flycatcher, Sulawesi Leaf Warbler samt Sulawesi Blue och Turquoise Flycatcher. White-bellied Imperial Pigeon hördes frekvent, men visade sig inte. En stunds skådande vid vägens slut vid utgångspunkten för stigen mot en vulkankrater var det ovanligt gott om tättingar och här adderas till artlistan *Sulawesi Myzomela, Mountain Tailorbird, Streakheaded* och *Warbling Whiteeye* samt *Crimson-crowned Flowerpecker*.

Den 7 november. Vi lämnade lodgen i Tomohon och for till flygplatsen i Manado, varifrån vi sedan flög till Ternate. Från denna lilla ö färjades vi över till Halmahera med en bullrig liten båt med tre stora utombordare som inte gick helt i takt. Från båten spanade några efter fågel och hittade bl.a. ett tiotal *Red-necked Phalaropes*, två *Little Terns*, några *Greater Crested Terns* samt flera hundra *Lesser Frigatebords*, de sistnämnda kretsande på hög höjd över Halmaheras kustlinje. Vi steg iland i en by som hette Sidangoli och efter lunch där fortsatte vi i fyra timmar mot öns nordostliga utväxt, till byn Subaim där vi inkvarterades. Ön har en helt annan karaktär än Sulawesi med frodig grönska och ganska lite bebyggelse. Stora delar föreföll fortfarande täckta av tät regnskog. Vid några stopp konstaterade vi att det också verkade vara mycket fågel här. Vi noterade de nya arterna – de flesta endemer – *Halmahera Swiftlet, Goliath Coucal, Common Emerald Dove, Blyth's Hornbill, Blue-and-white Kingfisher, Great-billed Parrot, Red-flanked Lorikeet, White-bellied Cucko-shrike, Rufous-bellied Triller, Black-chinned Whistler, Willie Wagtail, Long-billed Crow, Northern Golden Bulbul* och *Metallic Starling*.

Den 8 november. Som vanligt startade vi tidigt och åkte i ca en timme upp till krönet av en bergsrygg i den skog som sades heta Uni-Uni. Strax efter att det hade ljusnat började en minst sagt imponerade fågelaktivitet. Småflockar eller enstaka fåglar korsade luftrummet kring vår observationsplats. Det var framför allt olika duvor och papegojor; *Sultan's* och *Great Cuckoo-Dove, Scarlet-breasted* och *Grey-headed Fruit Dove, Spectacled* och *Cinnamon-bellied Imperial Pigeon, White Cockatoo, Moluckan King, Eclectus, Red-cheeked, Great-billed* och *Moluckan Hanging Parrot, Chattering* och

Violet-necked Lory samt *Red-flanked Lorikeet*. Av andra större fåglar också *Blyth's Hornbill*, *Long-billed Crow*, *Paradise Crow* och ett par av paradisfågeln *Standardwing*. Här eller senare under dagen även *Dusky Megapode*, *Moustached Treeswift*, *Pygmy Eagle*, *Dusky Myzomela*, *Common Cicadabird*, *Halmahera Cuckoo-shrike*, *Drab Whistler*, *Dusky-brown Oriole*, *White-naped Monarch*, *Moluccan Flycatcher*, *Cream-throated White-eye* och *Halmahera Flowerpecker*.

På kvällen lockade Theo fram en *Moluccan Scops Owl* som kunde ses mycket fint i ficklampsken.



Goliath Coucal, en gigant på 70cm



Kakao-frukter växer på Halmahera



Red-flanked Lorikeet Foto: Tommy Löfgren



En annan av resans höjdpunkter var mötet med denna snygging. Vi hade hört den ett antal gånger i skogen, men så blev det slutligen dags att träffa Ivory-breasted Pitta. Detta är inte bara världens största pitta, nästan 30 cm, även färg-sättningen är unik för att vara en pitta. Som så mycket annat på Halmahera är den endemisk för denna ö.

Ivory-breasted Pitta

Den 9 november. Vi fortsatte att skåda längs vägen genom Uni-Uni-skogen med ett morgon-förmiddagspass och ett eftermiddags-kvällspass. På morgonen åkte vi tidigt till en spelplats för

Standardwing. Vi körde norrut i ungefär en timme och bytte till en fyrhjulsdriven pick-up som i två omgångar tog oss på en usel väg till en rastplats varifrån vi sedan gick någon kilometer till fåglarnas spelplats. Vid rastplatsen hörde i gryningen minst tre olika *Common Paradise Kingfishers*, men det gick inte att få syn på dem. Vid spelplatsen fanns det minst två hannar och en hona av *Standardwing* som alla visade stor aktivitet i över en timme. Vi såg dem fint, men de var svåra att fotografera eftersom de rörde sig snabbt mellan olika träd. Platsen passerades vid ett tillfälle av en *Invisible Rail* som dock var precis så osynlig som namnet säger. Den hördes dock desto mer.



Två arter tillhörande släktet paradisfåglar har smitit från Nya Guinea, över till Halmahera i Wallacea. Den kråk-
lika paradiskråkan och den märkliga Wallace's Standard-
wing med de två förvuxna täckarfjädrarna (fotot ovan).



Fågelfamiljerna på Halmahera är mycket olika sina släktingar i andra områden. Coucalen och pittan har helt andra färger och former jämfört med fåglar på t.ex Sulawesi. På fotot ännu ett exempel; Azure Roller

Under eftermiddagen i Uni-Uni-skogen blev de nya arterna *Azure Dollarbird* (våldigt vacker blå färg!), *Ivory-breasted Pitta* (hörd länge och nära, men omöjlig att få syn på), *White-streaked Friarbird*, *Moluccan Cuckoo-skrike* och *Moluccan Monarch*. På kvällen fick vi se en och höra ytterligare två *Moluccan Owlet Nightjars*.

Den 10 november. Även denna dag ägnades åt Uni-Uni-skogen i två pass. Det blev mest samma arter som dagarna innan, men vi fick ändå några riktigt fina nya. Bäst var de två *Gurney's Eagles* som vi under en lång stund såg kretsande på några kilometers avstånd.

Theo jobbade hårt på att få fram *Moluccan Goshawk*, men vi fick bara höra den. Däremot såg vi en *Variable Goshawk*. Vidare en *Sombre Kingfisher* samt inte mindre än tre *Gray's Grasshopper Warblers* (Större flodsångare), en art som jag missat vid båda mina Sibirienturer, sannolikt för att de anländer dit så sent, först i mitten av juni. Inte så konstigt eftersom de tydligt övervintrar så här långt bort.

På kvällen fick vi äntligen höra och se en *Halmahera Boobook*, en art som gäckat oss de två föregående kvällarna.

Den 11 november. Vi lämnade vårt hotell för gott tidigt på morgonen och körde söderut i några timmar till Ake Tajavi nationalpark.. Nära entrén stötte vi en *Accipiter* i vägkanten som visade sig vara den mycket eftersökta *Moluccan Goshawk*. I parken gick vi först någon kilometer till ett gömsle för att få se *North Moluccan Pitta*. Den svarade bra på uppspelningar, men ville inte visa sig. Efter en timme gav vi upp och förflyttade oss till ett annat gömsle. Nu gällde det *Ivory-breasted Pitta*, världens största i sin familj. Och den kom fram nästan direkt och lät sig väl smaka av den mat som lagts ut. En av resans höjdpunkter!

Efter en förgäves sökinsats efter *Moluccan Dwarf Kingfisher* i näst intill outhärdlig hetta åt vi lunch i parkens högkvarter innan vi for vidare till Sidangoli vid kusten. Här var målarten *Beach Kingfisher*.

Henrik hittade en sådan direkt! Det fanns också *Greater* och *Lesser Crested Tern*, *Whiskered Tern* samt *Striated Heron* i omgivningarna. Inne i staden påträffades också en stor flock *Moluccan Starlings*.

Nästa projekt blev att få se en *Common Paradise Kingfisher*. Vi försökte på två ställen och hörde fåglar på båda. Men de ville inte komma fram! Ett tröstpris för några av oss blev en *Moluccan Dwarf Kingfisher* som Gert upptäckte i ett hål i lövverket. Vi förflyttade oss nu söderut till en stad där vi åt middag och tog in för natten.



Moluccan Scops Owl har den största spridningen av dvärg-
uvarna inom Wallacea – Moluccas och Lesser Sunda. Den
kommer nog att "splittas".
Moluccan Scops Owl



Owlet-nightjars påminner lite om frogmouthes. 10 arter är
beskrivna – de flesta på Nya Guinea, ett par i Australien.
Moluccan Owlet-nightjar, endem för Halmahera, är den
enda i Wallacea.

Kakaduor är karaktärsarter
i Australien.

Några finns även i
Wallacea, bl.a. denna
Umbrella Cockatoo som
endast finns på Halmahera
För inte så länge sedan höll
nästan hela populationen
på att försvinna från ön –
handeln med burfåglar var
anledningen. Myndigheten
beslöt att konfiskera/köpa
alla fåglar de kunde hitta
och påbörjade ett avels-
program på Halmahera.
Programmet verkar att
fungera – vi såg flera
exemplar dagligen i de
skogar vi besökte.


Umbrella Cockatoo



Den 12 november. På morgonen skeppades vi över till Ternate, varifrån vi flög tillbaka till Maldonado. Här tog vi in på ett fyrstjärnigt hotell och åt en avskedsmiddag på en mycket bra fisk- och skaldjursrestaurang i hamnen. Oka, guiden för Papua-gänget anslöt här.

Den 13 november. Denna dag flög halva gruppen till Jayapura på West Papua, medan övriga startade hemresan mot Sverige. I Jayapura hämtades vi av våra värdar i Nimbokrang. På vägen dit gjorde vi ett stopp i ett område med fuktiga ängar. Här såg vi en rad arter, de flesta nya; *Black-billed Coucal*, *Channel-billed Cuckoo*, *Buff-banded Rail*, *White-browed Crake*, *Pacific Golden Plover*, *Little Black Cormorant* (överflygande flock om ca 50 ex), *Rufous-bellied Kookaburra*, *Rainbow Bee-eater*, *White-*


shouldered Fairywren, New Guinea Friarbird, Willie Wagtail, Glossy-mantled Manucode, Golden-headed Cisticola, Pied Bush-chat samt Great-billed, Hooded och Chestnut-breasted Mannikin.




Ännu en skicklig "pole-dancer", men med en twist; han inte bara dansar på "stången", kommer en hona i närheten använder han sina tolv stjärtspröt att kittla honan med – och vilken hona kan motstå en sådan uppvaktning?

Twelve-wired Bird-of-Paradise

Den 14 november. Vi inledde med en lång vandring genom regnskog till ett område där det skulle spela både *Magnificent Riflebird*, *Magnificent Bird-of-paradise* samt *Lesser Bird-of-paradise*. Tyvärr försiggick spelet inte längre i de vanliga träden, utan fåglarna satt i närheten och lät, men var mycket svåra att se. Detta gällde särskilt *Magnificent Riflebird*, men även *Lesser Bird-of-paradise*. Oka glömde tyvärr att ta oss till platsen för *Magnificent Bird-of-paradise*... Medan vi spanade efter paradisfåglarna passerade eller hördes en del andra tättingar, men även de var svåra att få bra obsar på. *Meyer's Friarbird*, *Yellow-billed Longbill*, *Yellow-breasted Boatbill*, *Golden Cuckoshrike*, *Arafura Shrikethrush*, *Northern Sooty Thicket* och *Rufous-backed Fantail* samt *Spot-winged* och *Hooded Monarch* noterades, men i de flesta fall av bara någon enstaka observatör, oftast Oka eller Bengt. *Collared Brushturkey* hördes.



Blyth's Hornbill finns bara på Halmahera och Nya Guinea




King Bird-of-Paradise i Nimbokrang.

En art som i alla fall syntes hyfsat var *Blue-black Kingfisher*, hanne och hona. *Wompo Fruit Dove* och *Papuan King Parrot* var andra fåglar vi noterade. Vi gick sedan en runda i skogen för att få se *King Bird-of-paradise*. Vi hörde en fågel, men bara Bengt fick se den. Sedan utbröt ett skyfall som gjorde oss helt blöta innan vi nådde bilarna. Denna morgon var alltså inget vidare och fler än jag började nog tvivla på det kloka i att åka till West Papua denna årstid. På återvägen till inkvarteringen och lunchen sågs två *Pinon's Imperial Pigeons* i ett träd invid vägen.

Efter lunch förbättrades våra humör en del när vi kring hotellet blev visade på såväl tre *Papuan Frogmouths* som en *Victoria Crowned Pigeon*. Den sistnämnda var visserligen den enda kvarvarande av åtta fåglar som fångats ute i bushen och frisläppts här, men det förtog inte nöjet av att studera och fota den fantastiska fågeln på närhåll.



Victorian Crowned Pigeon



En bjässe som kan bli över ½ m. lång – Papuan Frogmouth

På eftermiddagen skådade vi i en öppen buskmark med en hydda av *Fawn-breasted Bowerbird* som huvudmål. Vi såg både den och fåglarna själva. I samma område fann vi också bl.a. *Mimic Honeyeater*, *Singing Starling*, *Crimson Finch* och *Great-billed Mannikin*, de senare talrika. I närheten observerade vi en stor samling *Papuan Spine-tailed Swifts*.

Vi skulle sedan söka lyssna efter nattfågel, men hörde bara *Papuan Frogmouth* och såg ett större antal *Fruit Bats* sp.

Den 15 november. Vi startade som vanligt när det var mörkt och parkerade efter ett tag på en sandig nybyggd väg in i regnskogen. Längs denna vandrade vi ett stycke in i skogen och placerade oss i en liten glänta. Minst två *Marbled Frogmouths* lockades fram, men tyvärr fick vi inte se dem. När det blev ljust dök vår främsta målart upp. En hanne och en hona av *Twelve-wired Bird-of-paradise* satt helt öppet och spelade på några tunna kala grenar i toppen av ett högt träd.

Efter att under en lång stund ha avnjutit de fantastiska fåglarna gick vi tillbaka till den breda grusvägen för mer skådning. Här var det bra aktivitet och lätt att se många fåglar. Vi noterade bl.a. *Little Bronze Cuckoo*, *Coronated Fruit Dove*, *Zoe's Imperial Pigeon*, *Yellow-billed Kingfisher* (hörd), *Sulphur-crested Cockatoo*, *Buff-faced Pygmy Parrot* (sedd av någon), *Eclectus Parrot*, *Black-capped Lory* (hörd), *Coconut Lorikeet*, *Pale-billed Sicklebill*, *Emperor Fairywren* och *Black-browed Triller*.

Vi tog oss sedan till en plats där vi kunde se en hanne och två honor av *King Bird-of-paradise*. I närheten hördes både *Papuan* och *Hooded Pitta*, men det var lögn att få se någon av dem i den täta markvegetationen.

Slutligen letade vi efter fler ex av *Buff-faced Pygmy Parrot*, men fanns bara *Shining Flycatcher* och *Yellow-faced Myna*.

Eftermiddagspasset innebar en timslång vandring med första halvan av sträckan i ankeldjupt vatten som dock åtminstone vi som hade kängor klarade bra. *White-bellied Thicket Fantail* sågs och *Black-sided Robin* hördes längs vägen. Målet var ett nytt spel av *Lesser Bird-of-Paradise*. När vi kom fram till platsen, en liten kulle i skogen, hördes många fåglar, men på en timme fick vi bara en bra observation

av en spelande hanne. Det var dock tillräckligt för att vi skulle känna oss revancherade efter den dåliga gårdagen.



Lesser Bird-of-Paradise



Emperor Fairy-wren

Den 16 november. Denna dag kördes vi till flygplatsen i Jayapura och möttes där av beskedet att vårt bokade flyg till Sorong var inställt. Vi fick istället ta ett annat plan som innebar fem timmars väntan på flygplatsen och därmed missad båt till Waigeo. Bengt och Oka sökte förhandla oss till att flygbolaget skulle bjuda på en chartrad båt dit, tyvärr utan framgång. Oka bjöd dock på ett lyxhotell i Sorong samt en god middag på en kinesisk restaurang i staden.



Vår enkla boning på Waigeo – men det är ju läget, läget, läget...



Lesser Frigatebird - juvenil

Den 17 november. Vi startade med en tidig morgontur längs en väg utanför Sorong. Men det rädde tyvärr dimma och fågelaktiviteten var låg. Vi noterade dock *Collared Brushturkey* (hörd), *Chestnut-breasted Cuckoo* (hörd), *Wompoo* och *Pink-spotted Fruit Dove* (hörda), *Orange-bellied Fruit Dove*, *Blyth's Hornbill*, *Lowland Peltops*, *Boyer's Cuckooshrike* samt *Grey Crow*. Efter frukost skjutsades vi ned till hamnen och tog 10-båten till ön Waigeo, en färd på ca två timmar. I hamnen och strax utanför den syntes en subadult *White-bellied Sea Eagle* samt åtskilliga *Greater Crested Terns* och *Lesser Frigatebirds*. Sedan blev det förvånansvärt lite fågel ända tills vi kom inom ca en halvtimmes gång från Waigeo. Där sågs flera större flockar av *Streaked Shearwaters* samt ett dussin mindre och mörka lirlikande fåglar. Vi bedömde dem som *Wedge-tailed Shearwaters*, den art som enligt boken skulle finnas här, men då Bengt senare lade ut bilderna på Facebook blev den samstämmiga bedömningen *Bulwer's Petrel*. En art som enligt boken skulle vara en "vagrant" här. I samma område som havsfåglarna var det också gott om tärnor; *Greater Crested*, *Bridled* och *Black-naped*.



Att kunna se 100-tals simsnäppor i sitt övervintrings-område, mitt ute i oceanen, var en upplevelse.

Smalnäbbad simsnäppa



Vi hade lite problem med att artbestämma denna. Genom Facebook gick det. Tydligt regelbunden i dessa vatten.

Bulwer's Petrel



Det kan ha funnits ett tusental migrerande liror runt båten.

Streaked Shearwater (vithuvad lira)



Labb, labb ropade Bengt, brelle, brelle skrek Stickan. Vi kände oss som hemma vid Sebybadet, Öland

Bredstjärtad labb

Väl ilandstigna kördes vi med bilar till vår inkvartering vid en strand några mil åt väster. Här fick vi bo i rum som stod på pålar längs en brygga ut i vattnet. Nästan omgående visade sig här en *Beach Kingfisher*.

Efter en snabb lunch körde vi ut igen och parkerade där en brant stig gick upp genom regnskogen. Vi följde denna i kuperad terräng i 2,5 kilometer (8258 steg och 61 våningar enligt stegräknaren i iphonen) tills vi kom till en kulle där det fanns ett stort gömsle för *Red Bird-of-paradise*. Först var det oroande lite av lätesytringar från dessa, men ganska snart kom de igång med tidvisa spel i högt ganska kallt träd. Det rörde sig om minst sex fåglar, men enligt uppgift är det nio som håller till här. Det var en fantastisk upplevelse som det var svårt att slita sig från. Andra fåglar under eftermiddagen var *Great Cuckoo Dove* (hörd), *Blyth's Hornbill*, *Yellow-billed Kingfisher* (hörd), *Sulphur-crested Cockatoo* och *Torresian Crow*.

Den 18 november. Tidigt på morgonen var det dags för öns andra endemiska paradisfågel. *Wilson's Bird-of-paradise*. Vi körde då till samma ställe varifrån vi vandrat dagen innan, men istället för att gå uppåt fortsatte vi i samma nivå i vägens förlängning och nådde då ett nytt gömsle efter bara några hundra meter. Här lade vår lokale guide ut en massa små löv på marken framför gömslet. Det dröjde då inte länge förrän den kanske märkligaste fågel jag någonsin sett dök upp och frenetiskt började städa bort löven. Fågeln såg närmast ut som en jättelik skalbagge med ryggsköld och huvud med lysande och till synes upphöjda färgfält av rött, gult ock blått. Från stjärtfjädrarna stack det ut två spröt som böjde sig i spiraler. Städningen syftade uppenbarligen till att locka till sig en hona och det gjorde nog också beteendet att då och då sätta sig på en låg kvist och vissla ihärdigt. Den satt oftast med bröstet mot oss och såg då alldeles grön ut. Trots de engagerade försöken dök ingen hona upp, i alla fall inte innan vi bröt upp efter ungefär en timme.

Resten av förmiddagen tillbringade vi på två platser med vidsträckt utsikt. Särskilt på den aadra var det mycket gott om fågel. Vi noterade bl.a. de för resan nya arterna *Eastern Osprey*, *Oriental*

Dollarbird, *Palm Cockatoo* (sågs dåligt av bara några i gruppen), *Raja Ampat Pitohui* samt *Olive-crowned Flowerpecker*. *Eclectus Parrots* var påfallande allmänna.

Vid vår lodge såg vi *Beautiful* och *Claret-breasted Fruit Dove*, också de nya för resan.

På eftermiddagen gick vi från vår inkvartering, först på stora vägen, sedan längs en slinga mot bergssidan i norr. Kvällens fågel blev nu *Palm Cockatoo*, världens största kakadua, som nu alla fick se fint. Minst fyra exemplar syntes, både flygande och sittande. Andra nya arter under vandringen var *Long-tailed Honey Buzzard* samt *Hooded Butcherbird*, den senare talrik.



Red Bird-of-Paradise, Waigeo

Den 19 november. Detta var sista dagen på Waigeo och därtill sista skådardagen på hela resan. Vi startade som vanligt tidigt för att kunna stå vid gårdagens fina utkiksplats så länge som möjligt. Nya arter var *Raja Shelduck* (två överflygande), *Pacific Baza* (ett par), *Grey-headed Goshawk* samt *Orange-fronted Hanging Parrot*. Den sistnämnda gjorde Oka mer än överlycklig; tydligen svår att hitta.

Vi embarkerade sedan färjan och spanade intensivt efter sjöfågel under hela resan. Nu blev det precis tvärtom mot under ditfärden; i stort sett alla fåglar var koncentrerade till ett område inte så långt utanför Sorong. Vi noterade nu 10+ *Brown Noddies*, två *Gull-billed Terns*, en *Little Tern*, 30+ *Bridled Terns*, 40+ *Black-naped Terns*, 5 + *Pomarine Jaegers* (som tävlade med ett betydligt större gäng Lesser Frigate Birds att plåga tärnor), 300+ *Streaked Shearwaters*, 200+ *Lesser Frigatebirds*, två *Brown Boobies* och 40+ *Red-necked Phalaropes*. Väl ilandkomna kördes vi för lunch på den utmärkta kinarestaurang vi tidigare besökt och därefter till flygplatsen i Sorong för vidare befordran till Manado. Här tog vi in på samma hotell som förra gången. Ganska lyxigt, men vi begick ett stort misstag då vi p.g.a. en av resenärernas trötthet valde att äta här istället för på den fina fiskrestaurangen i hamnen. För det första fick vi vänta i över en timme på maten trots att restaurangen i övrigt var tom så när som på talrik personal. För det andra fanns det inte ens en avlägsen likhet mellan menuns New Zealand Tenderloin Steak och den köttbit som Kjell och jag till sist fick på våra tallrikar. Något av det sämsta jag någonsin fått på en restaurang. Särskilt i förhållande till det höga priset.

Nåväl, förutom detta och det inställda flyget till Sorong, var detta en väldigt bra resa. Förtjänsten av detta ska främst tillskrivas arrangören Bengt Legnell och våra utmärkta guider, särskilt Theo, Samuel och Oka. Samt vår stora tur att nästan slippa regn. Hemfärden via Singapore gick utan missöden.

Lite "överblivna" foton från resan.




Mynor finns över hela Asien. Men ingenting liknar de fyra endemiska arterna på Sulawesi. På fotot en Grosbeak Myna




Sulawesi – eller Long-tailed Honey Buzzard sågs ett flertal gånger, bl.a. i Tangkoko's skogar



Den drygt ½ meter långa Sulawesi Malkoha är en jätte i jämförelse med andra asiatiska malkohor.



Geokichla-trastar finns i olika arter på de flesta öarna i området. Här Sulawesi-endemen Red-backed Thrush, Tangkoko



Det finns ca. 16 arter Imperial Pigeons i Wallacea, nästan alla endemer. Cinnamon-bellied I.P. från Halmahera.



Silverwinged Imperial Pigeon är en endem för Sulawesi



Theo, vår guide på Sulawesi & Halmahera såg till att vi fick se de allra flesta av våra målararter under besöket.



Vy från Halmahera ut mot Ternate. De flesta vulkanerna på dessa öar är fortfarande aktiva men har inte haft några utbrott på länge. Notera dock den lilla rökstrimman från toppen!




Blue-and White Kingfisher, en endem för Halmahera





Här syns hur denna märkliga fågel delvis har höjt sköldarna på ryggen. Wilson's Bird-of- Paradise, Waigeo.



Pole-dancing verkar ju fungera! Man kanske skulle pröva...funderar lite på vad hanens bakdel liknar...12-wired BoP

Artlista fåglar Sulawesi – Halmahera.

Listan följer HBW, men även IOC-namnen är med.

y/z y = antal obsdagar, z = antal individer

Maleo *Macrocephalon maleo*

S

H

1/4

Philippine Scrubfowl <i>Megapodius cumingii</i>	1/2	
Dusky Scrubfowl <i>Megapodius freycinet</i>		2/5+
Wandering Whistling-duck <i>Dendrocygna arcuate</i>	2/100+	
Sunda Teal <i>Anas gibberifrons</i>	2/50+	
Rock Dove <i>Columba livia</i>	2/x	4/x
Red Turtle-dove <i>Streptopelia tranquebarica</i>	1/2	
Eastern Spotted Dove <i>Spilopelia chinensis</i>	2/5+	
Slender-billed Cuckoo-dove <i>Macropygia amboinensis</i>	6/20+	3/10+
IOC Sultan`s C-d <i>M. doreya</i> .		
White-faced Cuckoo-dove <i>Turacoena manadensis</i>	6/15+	
Great Cuckoo-dove <i>Reinwardtoena reinwardti</i>	2/3	
Zebra Dove <i>Geopelia striata</i>	1/5+	
Grey-capped Emerald Dove <i>Chalcophaps indica</i>		1/1
IOC Common E D.		
Stephan's Dove <i>Chalcophaps stephani</i>	2/2	
Grey-cheeked Green-pigeon <i>Treron griseicauda</i>	4/85+	
White-bellied Imperial-pigeon <i>Ducula forsteni</i>	1/h	
Green Imperial-pigeon <i>Ducula aenea</i>	6/40+	
Spectacled Imperial-pigeon <i>Ducula perspicillata</i>		4/10
Cinnamon-bellied Imperial-pigeon <i>Ducula basilica</i>		3/6
Pied Imperial-pigeon <i>Ducula bicolor</i>	1/10	2/20+
White Imperial-pigeon <i>Ducula luctuosa</i>	6/40+	
IOC Silver-tipped I-p.		
Scarlet-breasted Fruit-dove <i>Megaloprepia formosa</i>		2/8
Maroon-chinned Fruit-dove <i>Ramphiculus epius</i>	2/3	
IOC Oberholzers F-d.		
Black-naped Fruit-dove <i>Ptilinopus melanospilus</i>	7/15+	
Eastern Superb Fruit-dove <i>Ptilinopus superbus</i>	1/5	2/2h
Grey-headed Fruit-dove <i>Ptilinopus hyogastrus</i>	3/10+	
Blue-capped Fruit-dove <i>Ptilinopus monacha</i>	3/10	
Great Eared-nightjar <i>Lyncornis macrotis</i>	2/2	

Large-tailed Nightjar <i>Caprimulgus macrurus</i>	2/2h	
Sulawesi Nightjar <i>Caprimulgus celebensis</i>	2/4	
Moluccan Owlet-nightjar <i>Aegotheles crinifrons</i>		1/3
Grey-rumped Treeswift <i>Hemiprocne longipennis</i>	4/20+	
Moustached Treeswift <i>Hemiprocne mystacea</i>	3/10	
White-throated Needletail <i>Hirundapus caudacutus</i>	1/150+	
Purple Needletail <i>Hirundapus celebensis</i>	1/15+	
Glossy Swiftlet <i>Collocalia esculenta</i>	8/x	
Moluccan Swiftlet <i>Aerodramus infuscatus</i>		
IOC splittad i Halmahera och Sulawesi S.	2/x	5/x
Uniform Swiftlet <i>Aerodramus vanikorensis</i>	4/25+	
House Swift <i>Apus nipalensis</i>	1/1	
Bay Coucal <i>Centropus celebensis</i>	4/6	
Goliath Coucal <i>Centropus goliath</i>		5/15+
Lesser Coucal <i>Centropus bengalensis</i>	1/1	
Yellow-billed Malkoha <i>Rhamphococcyx calyphorhynchus</i>	4/10+	
Eastern Koel <i>Eudynamus orientalis</i>	7/x	
IOC Black-billed Koel E. <i>melanorhynchus</i>		
Little Bronze-cuckoo <i>Chalcites minutillus</i>	2/2	
Brush Cuckoo <i>Cacomantis variolosus</i>	1/5	3/4
IOC Splittad som Rusty-breasted Cuckoo. <i>C. sepulchralis</i>		
Drummer Rail <i>Habroptila wallacii</i>		1/1h
IOC Invisible R		
Barred Rail <i>Hypotaenidia torquata</i>	5/11	
Buff-banded Rail <i>Hypotaenidia philippensis</i>	1/1	
Isabelline Bush-hen <i>Amaurornis isabellina</i>	2/3+	
White-breasted Waterhen <i>Amaurornis phoenicurus</i>	1/3+	
Purple Swampphen <i>Porphyrio porphyrio</i>	1/2	
IOC Splittad som Australasian S <i>P melanotus</i>		
Dusky Moorhen <i>Gallinula tenebrosa</i>	1/1	
Yellow Bittern <i>Ixobrychus sinensis</i>	1/1	

Black-crowned Night-heron <i>Nycticorax nycticorax</i>	1/20+	
Green-backed Heron <i>Butorides striata</i>	1/5+	1/1
IOC Striated H.		
Javan Pond-heron <i>Ardeola speciosa</i>	2/10+	
Cattle Egret <i>Bubulcus ibis</i>	6/x	4/x
IOC Splittad som Eastern C E <i>B. coromandus</i>		
Purple Heron <i>Ardea purpurea</i>	4/10+	
Great White Egret <i>Ardea alba</i>		1/5+
Intermediate Egret <i>Ardea intermedia</i>	1/10+	2/x
Enligt HBW ska IE splittas i IE och Plumed Egret <i>Ardea plumifera</i> . Dock oklart med gränserna mellan arterna.		
Little Egret <i>Egretta garzetta</i>	3/x	4/x
Pacific Reef-egret <i>Egretta sacra</i>	1/5+	
Lesser Frigatebird <i>Fregata ariel</i>		4/200+
Black-winged Stilt <i>Himantopus himantopus</i>	2/35+	
IOC Splittad som Pied Stilt <i>H. leucocephalu</i>		
Pacific Golden Plover <i>Pluvialis fulva</i>	2/30+	
Little Ringed Plover <i>Charadrius dubius</i>	1/1	
Whimbrel <i>Numenius phaeopus</i>	1/5	
Swinhoe's Snipe <i>Gallinago megala</i>	1/1	
Red-necked Phalarope <i>Phalaropus lobatus</i>	1/10	
Common Sandpiper <i>Actitis hypoleucos</i>	4/15+	
Grey-tailed Tattler <i>Tringa brevipes</i>	1/2	
Common Greenshank <i>Tringa nebularia</i>	1/5	
Wood Sandpiper <i>Tringa glareola</i>	3/60+	
Red-backed Buttonquail <i>Turnix maculosus</i>	1/2	
Little Tern <i>Sternula albifrons</i>		1/2
Whiskered Tern <i>Chlidonias hybrida</i>		1/1
Black-naped Tern <i>Sterna sumatrana</i>	1/2	
Lesser Crested Tern <i>Thalasseus bengalensis</i>	1/2	
Greater Crested Tern <i>Thalasseus bergii</i>	1/2	2/5+
Sulawesi Masked-owl <i>Tyto rosenbergii</i>	1/1	

Ochre-bellied Boobook <i>Ninox ochracea</i>	1/2	
Halmahera Boobook <i>Ninox hypogramma</i>		1/1
Sulawesi Scops-owl <i>Otus manadensis</i>	6/5	
Moluccan Scops-owl <i>Otus magicus</i>		3/2
Sulawesi Honey-buzzard <i>Pernis celebensis</i>	3/3	
IOC Barred H-b.		
Sulawesi Serpent-eagle <i>Spilornis rufipectus</i>	2/2	
Sulawesi Hawk-eagle <i>Nisaetus lanceolatus</i>	3/3	
Rufous-bellied Eagle <i>Lophotriorchis kienerii</i>	1/1	
Black Eagle <i>Ictinaetus malaiensis</i>	1/1	
Gurney's Eagle <i>Aquila gurneyi</i>		1/2
Pygmy Eagle <i>Hieraaetus weiskei</i>		1/1
Sulawesi Goshawk <i>Accipiter griseiceps</i>	1/1	
Chinese Sparrowhawk <i>Accipiter soloensis</i>	3/6	2/2
Spot-tailed Goshawk <i>Accipiter trinotatus</i>	1/1	
Variable Goshawk <i>Accipiter hiogaster</i>		2/3
Moluccan Goshawk <i>Accipiter henicogrammus</i>	2/2	
Dwarf Sparrowhawk <i>Accipiter nanus</i>	1/1	
Vinous-breasted Sparrowhawk <i>Accipiter rhodogaster</i>	1/1	
Brahminy Kite <i>Haliastur indus</i>	5/20+	4/15
Black Kite <i>Milvus migrans</i>	2/15+	
Sulawesi Hornbill <i>Rhabdotorrhinus exarhatus</i>	2/7+	
Knobbed Hornbill <i>Rhyticeros cassidix</i>	5/30+	
Papuan Hornbill <i>Rhyticeros plicatus</i>		5/50+
IOC Blyth's H.		
Purple-winged Roller <i>Coracias temminckii</i>	2/8	
Azure Dollarbird <i>Eurystomus azureus</i>		2/2
Sulawesi Dwarf-kingfisher <i>Ceyx fallax</i>	2/2	
Moluccan Dwarf-kingfisher <i>Ceyx lepidus</i>		1/1
Common Kingfisher <i>Alcedo atthis</i>	1/2	
Black-billed Kingfisher <i>Pelargopsis melanorhyncha</i>	2/3	

IOC Great-billed K.

Ruddy Kingfisher *Halcyon coromanda* 3/5

Blue-headed Kingfisher *Actenoides monachus* 4/6

IOC Green-backed K

Scaly-breasted Kingfisher *Actenoides princeps* 1/2

Blue-and-white Kingfisher *Todiramphus diops* 5/10

Sombre Kingfisher *Todiramphus funebris* 1/1

Collared Kingfisher *Todiramphus chloris* 4/10+

Beach Kingfisher *Todiramphus saurophagus* 1/1

Sulawesi Lilac Kingfisher *Cittura cyanotis* 2/3

Common Paradise-kingfisher *Tanysiptera galatea* 2/5h

Ashy Woodpecker *Mulleripicus fulvus* 2/5

Sulawesi Pygmy Woodpecker *Picoides temminckii* 3/5

Spotted Kestrel *Falco moluccensis* 1/2 1/1

Oriental Hobby *Falco severus* 1/1

White Cockatoo *Cacatua alba* 5/15+

Red-flanked Lorikeet *Charmosyna placensis* 4/45+

Chattering Lory *Lorius garrulus* 3/20+

Violet-necked Lory *Eos squamata* 2/4

Ornate Lorikeet *Trichoglossus ornatus* 3/6+

Sulawesi Hanging-parrot *Loriculus stigmatus* 3/10+

IOC Great H-p.

Moluccan Hanging-parrot *Loriculus amabilis* 3/15

Pygmy Hanging-parrot *Loriculus exilis* 2/4

Moluccan King-parrot *Alisterus amboinensis* 1/5+

Golden-mantled Racquet-tail *Prioniturus platurus* 3/8+

Yellowish-breasted Racquet-tail *Prioniturus flavicans* 1/2

Eclectus Parrot *Eclectus roratus* 4/15

Red-cheeked Parrot *Geoffroyus geoffroyi* 3/x

Great-billed Parrot *Tanygnathus megalorynchos* 2/2

Blue-backed Parrot *Tanygnathus sumatranus* 5/x

Sulawesi Pitta <i>Erythropitta celebensis</i>	3/5	
North Moluccan Pitta <i>Erythropitta rufiventris</i>	1/1h	
Ivory-breasted Pitta <i>Pitta maxima</i>		3/4
White-streaked Friarbird <i>Melitograis gilolensis</i>		3/5
Moluckan Myzomela <i>Myzomela simplex</i> .		4/15+
Splittad från IOC's Dusky M. <i>M. obscurus</i>		
Sulawesi Myzomela <i>Myzomela chloroptera</i>	1/5	
Golden-bellied Gerygone <i>Gerygone sulphurea</i>	1/1h	
Halmahera Oriole <i>Oriolus phaeochromus</i>		2/7+
IOC Dusky-brown O.		
Black-naped Oriole <i>Oriolus chinensis</i>	7/x	
Sulphur-bellied Whistler <i>Pachycephala sulfuriventer</i>	1/5	
IOC Sulphur-vented W.		
Drab Whistler <i>Pachycephala griseonota</i>		1/1
Black-chinned Whistler <i>Pachycephala mentalis</i>		5/6+
Pied Cuckooshrike <i>Coracina bicolor</i>	2/3	
White-rumped Cuckooshrike <i>Coracina leucopygia</i>	1/2	
White-bellied Cuckooshrike <i>Coracina papuensis</i>		1/1
Moluccan Cuckooshrike <i>Coracina atriceps</i>	2/2	
Sulawesi Cicadabird <i>Edolisoma morio</i>	1/2	
Slender-billed Cicadabird <i>Edolisoma tenuirostre</i>		3/5+
IOC Common C.		
Halmahera Cicadabird <i>Edolisoma parvulum</i>	1/5	
IOC H. Cuckooshrike		
Rufous-bellied Triller <i>Lalage aurea</i>		5/15'+
White-rumped Triller <i>Lalage leucopygialis</i>	2/5	
White-breasted Woodswallow <i>Artamus leucorhyn</i>	4/x	
Ivory-backed Woodswallow <i>Artamus monachus</i>	2/10+	
Willie Wagtail <i>Rhipidura leucophrys</i>	4/20+	
Hair-crested Drongo <i>Dicrurus hottentottus</i>	8/x	
Sulawesi Drongo <i>Dicrurus montanus</i>	1/1	

Spangled Drongo <i>Dicrurus bracteatus</i>		4/8
Moluccan Flycatcher <i>Myiagra galeata</i>		2/5
IOC M. Monarch.		
Shining Flycatcher <i>Myiagra alecto</i>		1/1
White-naped Monarch <i>Carterornis pileatus</i>	1/1	
Pale-blue Monarch <i>Hypothymis puella</i>	3/10	
Slender-billed Crow <i>Corvus enca</i>	7/x	
Long-billed Crow <i>Corvus validus</i>		5/45+
Halmahera Paradise-crow <i>Lycocorax pyrrhopterus</i>		3/5+
Standardwing Bird-of-paradise <i>Semioptera wallacii</i>		3/8+
Citrine Canary-flycatcher <i>Culicicapa helianthea</i>	1/10	
Zitting Cisticola <i>Cisticola juncidis</i>	3/3	
Gray's Grasshopper-warbler <i>Locustella fasciolata</i>		1/3
House Swallow <i>Hirundo javanica</i>	2/5	
IOC splittar till Pacific Swallow <i>H tahitica</i>	5/x	5/x
Barn Swallow <i>Hirundo rustica</i>	2/100+	4/x
Sooty-headed Bulbul <i>Pycnonotus aurigaster</i>	6/x	
Halmahera Golden Bulbul <i>Thapsinillas chloris</i>	5/x	
IOC Northern Golden Bulbul		
Sulawesi Leaf-warbler <i>Phylloscopus sarasinorum</i>	1/3	
Mountain Tailorbird <i>Phyllergates cucullatus</i>	1/1	
Streak-headed White-eye <i>Heleia squamiceps</i>	1/3	
Cream-throated White-eye <i>Zosterops atriceps</i>	3/5	
Mountain White-eye <i>Zosterops montanus</i>	1/x	
IOC Warbling Whiteye		
Black-crowned White-eye <i>Zosterops atrifrons</i>	3/5+	
Sulawesi Babbler <i>Trichastoma celebense</i>	5/10	
Southern White-necked Myna <i>Streptocitta albigollis</i>	6/8	
Javan Myna <i>Acridotheres javanicus</i>	1/2	
Grosbeak Starling <i>Scissirostrum dubium</i>	6/x	
Metallic Starling <i>Aplonis metallica</i>		3/30+

Moluccan Starling <i>Aplonis mysolensis</i>		1/10+
Red-backed Thrush <i>Geokichla erythronota</i>	2/2	
Grey-streaked Flycatcher <i>Muscicapa griseisticta</i>	1/2	4/9
Turquoise Flycatcher <i>Eumyias panayensis</i>	1/3	
Sulawesi Blue-flycatcher <i>Cyornis omissus</i>	1/3	
Yellow-sided Flowerpecker <i>Dicaeum aureolimbatus</i>	7/12+	
Crimson-crowned Flowerpecker <i>Dicaeum nehrkorni</i>	1/4	
Halmahera Flowerpecker <i>Dicaeum schistaceiceps</i>		1/2
Grey-sided Flowerpecker <i>Dicaeum celebicum</i>	4/5+	
Brown-throated Sunbird <i>Anthreptes malacensis</i>	4/5	
Black Sunbird <i>Leptocoma aspasia</i>	4/8	4/x
Olive-backed Sunbird <i>Cinnyris jugularis</i>	8/x	4/x
Crimson Sunbird <i>Aethopyga siparaja</i>	1/1	
Black-faced Munia <i>Lonchura molucca</i>	2/8	2/15
Scaly-breasted Munia <i>Lonchura punctulata</i>	3/50+	
Chestnut Munia <i>Lonchura atricapilla</i>	5/55+	
Eurasian Tree Sparrow <i>Passer montanus</i>	5/x	5/x
Grey Wagtail <i>Motacilla cinerea</i>	2/4	
Eastern Yellow Wagtail <i>Motacilla tschutschensis</i>	3/25+	2/3

Artlista fåglar West Papua

Listan följer HBW, men även IOC-namnen är med.

Collared Brush-turkey <i>Talegalla jobiensis</i>	2/2h	
Brown Quail <i>Synoicus ypsilophorus</i>	1/1	
Asian Blue Quail <i>Synoicus chinensis</i>	1/1	IOC King Quail
Radjah Shelduck <i>Radjah radjah</i>	1/2	
Rock Dove <i>Columba livia</i>	2/x	
Eastern Spotted Dove <i>Spilopelia chinensis</i>	3/5	
Great Cuckoo-dove <i>Reinwardtoena reinwardti</i>	2/2	
Victoria Crowned-pigeon <i>Goura victoria</i>	1/1	
Stephan's Dove <i>Chalcophaps stephani</i>	1/1	

Pinon's Imperial-pigeon <i>Ducula pinon</i>	5/25
Zoe's Imperial-pigeon <i>Ducula zoeae</i>	1/2
Pied Imperial-pigeon <i>Ducula bicolor</i>	2/25+
Wompoo Fruit-dove <i>Megaloprepia magnifica</i>	3/3
Pink-spotted Fruit-dove <i>Ptilinopus perlatus</i>	1/1h
Orange-bellied Fruit-dove <i>Ptilinopus iozonus</i>	2/4
Claret-breasted Fruit-dove <i>Ptilinopus viridis</i>	2/10+
Beautiful Fruit-dove <i>Ptilinopus pulchellus</i>	1/2
Coroneted Fruit-dove <i>Ptilinopus coronulatus</i>	2/4
Marbled Frogmouth <i>Podargus ocellatus</i>	1/2h
Papuan Frogmouth <i>Podargus papuensis</i>	4/10
Moustached Treeswift <i>Hemiprocne mystacea</i>	3/10
Papuan Spinetail <i>Mearnsia novaeguineae</i>	1/30+
Glossy Swiftlet <i>Collocalia esculenta</i>	3/x
Black-billed Coucal <i>Centropus bernsteini</i>	2/2
Channel-billed Cuckoo <i>Scythrops novaehollandiae</i>	5/6
Little Bronze-cuckoo <i>Chalcites minutillus</i>	1/1
Chestnut-breasted Cuckoo <i>Cacomantis castaneiventris</i>	3/3
Brush Cuckoo <i>Cacomantis variolosus</i>	2/2
Buff-banded Rail <i>Hypotaenidia philippensis</i>	2/2h
White-browed Crake <i>Amaurornis cinereal</i>	2/2h
Streaked Shearwater <i>Calonectris leucomelas</i>	2/400+
Bulwer's Petrel <i>Bulweria bulwerii</i>	2/10+
Cattle Egret <i>Bubulcus ibis</i>	2/x IOC Splittad som Eastern CE <i>B. coromandus</i>
Little Egret <i>Egretta garzetta</i>	1/1
Lesser Frigatebird <i>Fregata ariel</i>	3/500+
Brown Booby <i>Sula leucogaster</i>	1/2
Little Black Cormorant <i>Phalacrocorax sulcirostris</i>	1/50
Pacific Golden Plover <i>Pluvialis fulva</i>	2/35+
Whimbrel <i>Numenius phaeopus</i>	1/1
Red-necked Phalarope <i>Phalaropus lobatus</i>	1/40+

Common Sandpiper <i>Actitis hypoleucos</i>	1/1	
Brown Noddy <i>Anous stolidus</i>	1/10+	
Bridled Tern <i>Onychoprion anaethetus</i>	2/60+	
Little Tern <i>Sternula albifrons</i>	1/1	
Common Gull-billed Tern <i>Gelochelidon nilotica</i>	1/2	
Whiskered Tern <i>Chlidonias hybrida</i>	1/2	
Black-naped Tern <i>Sterna sumatrana</i>	2/70+	
Greater Crested Tern <i>Thalasseus bergii</i>	1/50+	
Pomarine Jaeger <i>Stercorarius pomarinus</i>	1/5+	
Osprey <i>Pandion haliaetus</i>	1/1	IOC Splittad som Eastern O. <i>P. cristatus</i> .
Long-tailed Honey-buzzard <i>Henicopernis longicauda</i>	1/1	
Pacific Baza <i>Aviceda subcristata</i>	1/2	
Variable Goshawk <i>Accipiter hiogaster</i>	1/1	
Grey-headed Goshawk <i>Accipiter poliocephalus</i>	1/2	
White-bellied Sea-eagle <i>Haliaeetus leucogaster</i>	1/1	
Brahminy Kite <i>Haliastur indus</i>	3/10+	
Papuan Hornbill <i>Rhyticeros plicatus</i> IOC Blyht's H	5/50+	
Oriental Dollarbird <i>Eurystomus orientalis</i>	2/7+	
Rainbow Bee-eater <i>Merops ornatus</i>	1/5	
Yellow-billed Kingfisher <i>Syma torotoro</i>	4/4h	
Blue-black Kingfisher <i>Todiramphus nigrocyaneus</i>	1/2	
Beach Kingfisher <i>Todiramphus saurophagus</i>	3/1	
Rufous-bellied Kookaburra <i>Dacelo gaudichaud</i>	6/10+	
Palm Cockatoo <i>Probosciger aterrimus</i>	2/6	
Sulphur-crested Cockatoo <i>Cacatua galerita</i>	5/30+	
Black-capped Lory <i>Lorius lory</i>	2/2	
Coconut Lorikeet <i>Trichoglossus haematodus</i>	4/40+	
Orange-fronted Hanging-parrot <i>Loriculus aurantiifrons</i>	1/1	
Papuan King-parrot <i>Alisterus chloropterus</i>	1/2	
Eclectus Parrot <i>Eclectus roratus</i>	4/50+	
Red-cheeked Parrot <i>Geoffroyus geoffroyi</i>	4/15	

Great-billed Parrot <i>Tanygnathus megalorynchos</i>	1/1	
Buff-faced Pygmy-parrot <i>Micropsitta pusio</i>	1/1h	
Papuan Pitta <i>Erythropitta macklotii</i>	2/2h	
Eastern Hooded Pitta <i>Pitta novaeguineae</i>	1/2h	
Fawn-breasted Bowerbird <i>Chlamydera cerviniventris</i>	1/5	
Emperor Fairy-wren <i>Malurus cyanocephalus</i>	1/3	
White-shouldered Fairy-wren <i>Malurus lboscapulatus</i>	1/3	
Meyer's Friarbird <i>Philemon meyeri</i>	1/2+	
Helmeted Friarbird <i>Philemon buceroides</i>	6/40+	IOC splittad som New Guinea F.P. <i>novaeguinea</i>
Mimic Honeyeater <i>Microptilotis analogus</i>	1/5+	
Waigeo Pitohui <i>Pitohui cerviniventris</i>	2/8+	IOC Raja Ampat P.
Little Shrike-thrush <i>Colluricincla megarhyncha</i>	2/2	IOC Arafura S-t.
Boyer's Cuckooshrike <i>Coracina boyeri</i>	1/2	
Golden Cuckooshrike <i>Campochaera sloetii</i>	1/1	
Black-browed Triller <i>Lalage atrovirens</i>	1/2	
Lowland Peltops <i>Peltops blainvillii</i>	4/4	
Hooded Butcherbird <i>Cracticus cassicus</i>	1/30+	
White-breasted Woodswallow <i>Artamus leucorhyn</i>	1/5+	
Yellow-breasted Boatbill <i>Machaerirhynchus flaviventer</i>	1/1h	
Northern Fantail <i>Rhipidura isura</i>	2/3	
Sooty Thicket-fantail <i>Rhipidura threnothorax</i>	1/1	
White-bellied Thicket-fantail <i>Rhipidura leucothorax</i>	1/1	
Willie Wagtail <i>Rhipidura leucophrys</i>	5/x	
Rufous-backed Fantail <i>Rhipidura rufidorsa</i>	1/1	
Spangled Drongo <i>Dicrurus bracteatus</i>	4/4+	
Shining Flycatcher <i>Myiagra alecto</i>	1/2	
Spot-winged Monarch <i>Symposiachrus guttula</i>	1/2	
Hooded Monarch <i>Symposiachrus manadensis</i>	1/2	
Grey Crow <i>Corvus tristis</i>	2/3+	
Torresian Crow <i>Corvus orru</i>	2/7+	
Glossy-mantled Manucode <i>Manucodia ater</i>	3/7	

Twelve-wired Bird-of-paradise	<i>Seleucidis melanoleucus</i>	1/2	
Pale-billed Sickbill	<i>Drepanornis bruijnii</i>	1/2+	
Magnificent Riflebird	<i>Lophorina magnifica</i>	1/5+	
King Bird-of-paradise	<i>Cicinnurus regius</i>	2/5+	
Wilson's Bird-of-paradise	<i>Cicinnurus respublica</i>	1/2+	
Red Bird-of-paradise	<i>Paradisaea rubra</i>	3/15+	
Lesser Bird-of-paradise	<i>Paradisaea minor</i>	2/10+	
Yellow-bellied Longbill	<i>Toxorhamphus novaeguineae</i>	3/3	
Black-sided Robin	<i>Poecilodryas hypoleuca</i>	2/2	
Golden-headed Cisticola	<i>Cisticola exilis</i>	2/10+	
House Swallow	<i>Hirundo javanica</i>	6/x	IOC Splittad som Pacific Swallow <i>H.tahitica</i>
Sooty-headed Bulbul	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	2/x	
Yellow-faced Myna	<i>Mino dumontii</i>	4/25+	
Metallic Starling	<i>Aplonis metallica</i>	2/4	
Singing Starling	<i>Aplonis cantoroides</i>	2/10+	
Grey-streaked Flycatcher	<i>Muscicapa griseisticta</i>	1/2	
Pied Bushchat	<i>Saxicola caprata</i>	1/2	
Olive-crowned Flowerpecker	<i>Dicaeum pectoral</i>	2/5+	
Red-capped Flowerpecker	<i>Dicaeum Geelvinkianum</i>	1/1h	
Black Sunbird	<i>Leptocoma Aspasia</i>	2/2	
Olive-backed Sunbird	<i>Cinnyris jugularis</i>	3/4	
Great-billed Mannikin	<i>Lonchura grandis</i>	2/12+	
Hooded Mannikin	<i>Lonchura spectabilis</i>	2/20+	
Chestnut-breasted Mannikin	<i>Lonchura Castaneothorax</i>	1/20+	
White-bellied Crimson Finch	<i>Neochmia evangelinae</i>	1/10+	IOC Crimson Finch. <i>N.phaeton</i> .
Eurasian Tree Sparrow	<i>Passer montanus</i>	5/x	

Deltagare

Mats Bergman, Sjöbo. Ej West Papua

Stig Holmstedt, Gysinge. Medarrangör

Henrik Hultén, Malmö. Ej West Papua

Bengt Legnell, Ekerö. Arrangör och reseledare

Gert Ljungqvist, Sjöbo. Ej West Papua

Tommy Löfgren, Älvkarleby. Ej West Papua.

Hans Lövgren, Bromma.

Gunilla Olsson, Bromma.

Kjell Sahlberg, Spånga.

Guider

Theo. Sulawesi och Halmahera

Oka. West Papua

För ytterligare information, kontakta Bengt på: **legnell@hotmail.com**
eller Stikkan på: **stig.holmstedt@gmail.com**

